



BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III

1.

XXXIV

B

1

NAPOLI



**NOUVEAUX ELEMENS
DE
GEOMETRIE,**

CONTENANT

**Des Moyens de faire voir quelles
Lignes sont incommensurables :**

De nouvelles mesures des Angles, dont on ne
s'étoit point encore avisé : Et de nouvelles Ma-
nières de trouver & de démontrer la propor-
tion des Lignes ; avec de nouvelles demonstra-
tions des Propositions les plus communes.



Par Messrs. de P O R T - R O Y A L.

NOUVELLE EDITION.

*Augmenté d'un nouveau Traité des Proportions,
& beaucoup d'autres changemens con-
siderables,*



A LA HAYE,

Chez JEAN VAN DUREN, Marchand
Libraire dans le Poote, près du Plyn...

M. DCCXI.


Cur. Bonino, Hà Tiên Phức

THE
LIBRARY OF THE
CONGRESS
WASHINGTON, D. C.
20540



THE
LIBRARY OF THE
CONGRESS
WASHINGTON, D. C.
20540

NOUVELE EDITION
1870-1871
The Library of the Congress
Washington, D. C.
20540



THE
LIBRARY OF THE
CONGRESS
WASHINGTON, D. C.
20540



AVERTISSEMENT

Sur cette seconde Edition.



La Geometrie est d'une si grande utilité, & il est si necessaire de bien connoître les rapports qui se rencontrent entre diverses Grandeurs: qu'il est presque impossible de faire aucun progrès considerable dans les Arts liberaux, sans avoir quelque teinture de cette Science. Il seroit à desirer que l'on s'y appliquât plus qu'on ne fait, & que cette connoissance devint plus commune. Car outre l'usage continuel qu'on en peut faire dans tous les Arts avec un très grand avantage: un Esprit Geometrique est plus juste que celui qui ne l'est pas, & beaucoup moins sujet à prendre la vrai-semblance pour la verité. C'est pourquoi l'on est redevable à ceux qui travaillent à rendre cette Science facile, & en particulier à l'Auteur; non seulement de nous avoir donné ces



nouveaux Elemens, sans lesquels plusieurs personnes n'auroient jamais eu de goût pour une connoissance qui demande tant d'application : mais aussi de ce qu'il a pris la peine de les corriger, & d'y faire plusieurs changemens considerables. La matiere qui y est traitée, principalement dans les quatre premiers Livres, est d'elle même si abstraite, qu'il ne faut pas s'étonner si plusieurs se sont aisément rebutez dès l'entrée, & s'ils ont été obligez très souvent de commencer par le cinquième Livre. C'est dans le dessein de lever cette difficulté que l'Autheur y a changé beaucoup de choses, & qu'il a refait entierement le second & le troisième Livre : où il explique la nature des Raisons & des Proportions Geometriques, soit simples, soit composées, avec beaucoup plus de netteté & d'ordre qu'il n'avoit fait dans la premiere Edition. Et l'on peut dire que la maniere dont il se sert ne paroitra pas si difficile à ceux qui voudront s'y appliquer un peu. Il y auroit ici assez de fondement de s'étendre sur la bonté de cet Ouvrage, qui fut reçu dès la premiere fois avec tant d'applaudissement. Mais il est plus à propos de ne point prevenir les Lecteurs ; & l'on doit esperer que l'avancement que feront dans la Geometrie ceux qui se serviront de ces Elemens, en sera une preuve plus seure que tout ce qu'on en pourroit dire.

PRE-



P R E F A C E.



UOI que j'aye quelque sorte de liberté de parler avantageusement de ces Nouveaux Elemens de Geometrie , puisque je n'y ay point d'autre part que celle de les avoir tirez des mains de l'Autheur pour les donner au Public ; mon dessein n'est pas néanmoins d'en faire voir icy l'excellence , ny de les proposer au monde comme un ouvrage fort considerable. Je serois plutôt porté à diminuer l'idée trop haute que quelques personnes en pouvoient avoir , étant très persuadé qu'il est beaucoup plus dangereux d'estimer trop ces sortes de choses, que de ne les pas estimer assez.

La nature de toutes les Sciences humaines, & principalement de celles qui entrent peu dans le commerce de la vie, est d'être mêlées d'utilitez & d'inutilitez : & je ne sçay si l'on ne peut point dire qu'elles sont toutes inutiles en elles-mêmes, & qu'elles devroient passer pour un amusement entierement vain & indigne de personnes sages, si elles ne pouvoient servir d'instrumens & de preparations à d'autres connoissances vraiment utiles. Ainsi ceux qui s'y attachent pour elles-mêmes comme à quelque chose de grand & de relevé, n'en connoissent pas le vray usage ; & cette ignorance est en eux un beaucoup plus grand défaut, que s'ils ignorent absolument ces Sciences.

P R E F A C E.

Ce n'est pas un grand mal que de n'être pas Geometre; mais c'en est un considerable que de croire que la Geometrie est une chose fort estimable, & de s'estimer soy-même pour s'être rempli la tête de Lignes, d'Angles, de Cercles, de proportions. C'est une ignorance très blâmable que de ne pas sçavoir que toutes ces speculations steriles ne contribuent rien à nous rendre heureux; qu'elles ne soulagent point nos miseres; qu'elles ne guerissent point nos maux; qu'elles ne nous peuvent donner aucun contentement réel & solide; que l'Homme n'est point fait pour cela, & que bien loin que ces Sciences lui donnent sujet de s'élever en lui-même, elles sont au contraire des preuves de la bassesse de son esprit; puisqu'il est si vain & si vuide de vray bien, qu'il est capable de s'occuper tout-entier à des choses si vaines & si inutiles.

Cependant on ne voit que trop par experience, que ces sortes de connoissances sont d'ordinaire jointes à l'ignorance de leur prix & de leur usage. On les recherche pour elles-mêmes; on s'y applique comme à des choses fort importantes; on en fait sa principale profession; on se glorifie des découvertes que l'on y fait; on croit fort obliger le monde si l'on veut bien luy en faire part; & l'on s'imagine meriter par là un rang fort considerable entre les Sçavans & les grands Esprits.

Si cet Ouvrage n'a rien de ce qui merite la reputation de grand Geometre au jugement de ces personnes, en quoy il est très juste de les en croire; au moins on peut dire avec verité que celui qui l'a composé est exempt du défaut de la souhaiter, & que quoy qu'il estime beaucoup le genie de plusieurs personnes qui se mêlent de cette
Scien-

P R E F A C E.

Science, il n'a qu'une estime très médiocre pour la Geometrie en elle même. Néanmoins comme il est impossible de se passer absolument d'une Science qui sert de fondement à tant d'Arts nécessaires à la vie humaine : il peut y avoir quelque utilité à montrer aux Hommes de quelle sorte ils en doivent user, & de leur rendre cette étude la plus avantageuse qu'il est possible.

C'est l'unique vue qu'a eue l'Auteur de ces nouveaux Elemens. Il n'a pas tant considéré la Geometrie, quel usage qu'on en pouvoit faire ; & il a cru qu'en évitant ces défauts qui n'en sont pas inseparables, on s'en pouvoit très-utilement servir pour former les jeunes gens, non seulement à la justesse de l'esprit, mais même en quelque sorte à la pieté & au reglement des mœurs.

Pour comprendre les avantages qu'on en peut tirer, il faut considerer que dans les premières années de l'enfance, l'Âme de l'Homme est comme toute plongée & toute ensevelie dans les sens, & qu'elle n'a que des perceptions obscures & confuses des objets qui font impression sur son corps. Elle sort à la verité de cet état à mesure que ses organes se dégagent & se fortifient par l'âge, & elle acquiert quelque liberté de former des pensées plus claires & plus distinctes, & même de les tirer les unes des autres, ce que l'on appelle raisonnement. Mais l'amour des choses sensibles & exterieures lui étant devenu comme naturel, & par la corruption de son origine & par l'accoûtumance qu'elle a contractée durant l'enfance : les choses exterieures sont toujours le principal objet de son plaisir & de sa pente. Ainsi non seulement les jeunes

P R E F A C E.

gens ne se plaisent gueres que dans les choses sensuelles ; mais même entre les personnes avancées en âge il y en a peu qui soient capables de trouver du goût dans une vérité purement spirituelle , & où les sens n'ayent aucune part. Toute leur application est toujours aux manieres agreables ; ils n'ont de l'intelligence & de la delicatessé que pour cela , & ils ne se servent de leur esprit que pour étudier l'agrément & l'art de plaire , par les choses qui flattent la concupiscence & les sens

Il me seroit aisé de montrer que cette disposition d'esprit est non seulement un très grand défaut ; mais que c'est la source des plus grands desordres & des plus grands vices. Il est vray qu'il n'y a que la Grace & les exercices de pieté qui puissent la guerir veritablement : mais entre les exercices humains qui peuvent le plus servir à la diminuer , & à disposer même l'Esprit à recevoir les veritez Chrétiennes avec moins d'opposition & de dégout , il semble qu'il n'y en ait gueres de plus propre que l'étude de la Geometrie. Car rien n'est plus capable de détacher l'Ame de cette application aux sens , qu'une autre application à un objet qui n'a rien d'agreable selon les sens ; & c'est ce qui se rencontre parfaitement dans cette Science. Elle n'a rien du tout qui puisse favoriser tant soit peu la pente de l'Ame vers les sens ; son objet n'a aucune liaison avec la concupiscence ; elle est incapable d'éloquence & d'agrément dans le langage ; rien n'y excite les passions ; elle n'a rien du tout d'aimable que la vérité , & elle la presente à l'Ame toute nue & détachée de tout ce que l'on aime le plus dans les autres choses.

Que

P R E F A C E.

Que si les veritez qu'elle propose ne sont pas fort utiles ny fort importantes, si l'on en demeure là; il est néanmoins très utile & très important de s'accoutumer à aimer la verité, à la goûter, à en sentir la beauté. Et Dieu se fert souvent de cette disposition d'esprit, pour nous faire entrer dans l'amour & dans la pratique des veritez qui conduisent au salut, pour nous faire voir l'illusion de tout ce qui plaît dans les choses sensibles & exterieures, & pour nous rendre justes & équitables dans toute la conduite de nôtre vie; cét esprit d'équité consistant principalement dans le discernement & dans l'amour de la verité en toutes les affaires que nous traitons.

Mais la Geometrie ne sert pas seulement à détacher l'Esprit des choses sensibles, & à inspirer le goût de la verité; elle apprend aussi à la reconnoître & à ne se laisser pas tromper par quantité de maximes obscures & incertaines, qui servent de principes aux faux raisonnemens dont les discours des Hommes sont tout remplis. Car si l'on y prend garde, ce qui nous jette ordinairement dans l'erreur & nous fait prendre le faux pour le vrai, n'est pas le défaut de la liaison des conséquences avec les principes, en quoy consiste ce qu'on appelle la forme des argumens; mais c'est l'obscurité des principes mêmes, qui n'étant pas exactement vrais, & n'étant pas aussi évidemment faux, presentent à l'Esprit une lumière confuse où la verité & la fausseté sont mêlées; ce qui cause à plusieurs un espece d'éblouissement qui leur fait approuver ces principes sans les examiner davantage.

Il est vrai que la Logique nous donne deux

P R E F A C E.

excellentes regles pour éviter cette illusion , qui sont de définir tous les mots équivoques , & de ne recevoir jamais que des principes clairs & certains. Mais ces regles ne suffisent pas pour nous garantir d'erreur. Premièrement, parce qu'on se trompe souvent dans la notion même de l'évidence , en prenant pour évident ce qui ne l'est pas. Et en second lieu, parce que quoy qu'on sçache ces regles, on n'est pas toujours appliqué à les pratiquer. Il n'y a donc que la Geometrie qui remédie en effet à l'un & à l'autre de ces défauts. Car d'une part en fournissant des principes vraiment clairs, elle nous donne le modèle de la clarté & de l'évidence pour discerner ceux qui l'ont de ceux qui ne l'ont pas : & de l'autre, comme elle ne se dispense jamais de l'observation de ces deux regles, elle accoutume l'Esprit à les pratiquer, & à être toujours en garde contre les équivoques des mots & contre les principes confus, qui sont les deux sources les plus communes des mauvais raisonnemens.

Il ne faut pas dissimuler néanmoins, que cette coutume même de rejeter tout ce qui n'est pas entierement clair, peut engager dans un défaut très considerable, qui est de vouloir pratiquer cette exactitude en toute sorte de matieres, & de contredire tout ce qui n'est pas proposé avec l'évidence Geometrique. Cependant il y a une infinité de choses dont on ne doit pas juger en cette maniere, & qui ne peuvent pas être reduites à des demonstrations methodiques. Et la raison en est, qu'elles ne dépendent pas d'un certain nombre de principes grossiers & certains, comme les veritez Mathematiques; mais d'un grand nombre de preuves & de circonstances

ces

P R E F A C E.

ces qu'il faut que l'Esprit voye tout d'un coup, & qui n'étant pas convaincantes séparément, ne laissent pas de persuader avec raison, lorsqu'elles sont jointes & unies ensemble. La plupart des matieres morales & humaines sont de ce nombre; & il y a même des veritez de la Religion qui se prouvent beaucoup mieux par la lumiere de plusieurs principes qui s'entr'aident & se soutiennent les uns les autres, que par des raisonnemens semblables aux demonitrations Geometriques.

C'est donc sans doute un fort grand défaut que de ne faire pas distinction des matieres; d'exiger par tout cette suite methodique de propositions que l'on voit dans la Geometrie; de faire difficulté sur tout, & de croire avoir droit de rejeter absolument un principe, lors qu'on juge qu'il peut recevoir quelque exception en quelque rencontre.

Mais si ce défaut est assez ordinaire à quelques Geometres, il ne naît pas néanmoins de la Geometrie même. Cette Science étant toute veritable ne peut pas autoriser une conduite qui n'est fondée que sur des principes d'erreur. Car il n'est pas ~~way~~ qu'un principe qui ne prouve pas absolument ne prouve rien; & que ne prouvant pas tout-seul, il ne prouve pas étant joint à d'autres. Il y a differens degrez de preuves. Il y en a dont on conclud la certitude, & d'autres dont on conclud l'apparence; & de plusieurs apparences jointes ensemble on conclud quelquefois une certitude à laquelle tous les Esprits raisonnables se doivent rendre. Il n'est pas absolument certain que l'on doive voir le Soleil quelque'un des jours de l'Année qui vient, je le dois néanmoins croi-

P R E F A C E.

re ; & je serois ridicule d'en douter , quoy qu'il soit impossible de le démontrer. La Raison ne doit donc pas prétendre de démontrer Geometriquement ces choses ; mais elle peut prouver Geometriquement que c'est une sottise de ne les pas croire : & c'est en cette maniere qu'on se peut servir de la Geometrie même dans ces sortes de matieres , pour faire voir plus clairement la force de la vrai-semblance qui nous les doit faire croire.

Outre ces utilitez que l'on peut tirer de la Geometrie , on en peut encore remarquer deux autres qui ne sont pas moins considerables. Il y a des veritez importantes pour la conduite de la vie & pour le salut , qui ne laissent pas d'être difficiles à comprendre , & qui ont besoin d'une attention pénible ; Dieu ayant voulu , comme dit S. Augustin , que le pain de l'Ame se gagnast avec quelque sorte de travail aussi bien que le pain du Corps. Et il arrive de là que plusieurs personnes s'en rebutent par une certaine paresse , ou plutôt par une delicatessé d'esprit qui leur donne du dégoust de tout ce qui demande quelque effort & quelque sorte de contention. Or l'étude de la Geometrie est encore un remede à ce défaut ; car en appliquant l'Esprit à des veritez abstraites & difficiles , elle lui rend faciles toutes celles qui demandent moins d'application ; comme en accoutumant le corps à porter des fardeaux pezens , on fait qu'il ne sent presque plus le poids de ceux qui sont plus legers.

Non seulement elle ouvre l'Esprit & le fortifie pour concevoir tout avec moins de peine ; mais elle fait aussi qu'il devient plus étendu

du

P R E F A C E.

du & plus capable de comprendre plusieurs choses à la fois. Car les veritez Geometriques ont cela de propre qu'elles dépendent d'un long enchainement de principes qu'il faut suivre pour arriver à la conclusion ; & comme cette conclusion tire sa lumiere de ces principes, il faut que l'Esprit voye en même temps, & ce qui éclaire & ce qui est éclairé : ce qu'il ne peut faire sans s'étendre , & sans porter sa veuë plus loin que dans ses actions ordinaires.

Cette étendue d'esprit , qui paroît dans la Geometrie , est non seulement très - utile pour tous les sujets qui ont besoin de raisonnement : mais elle est aussi très admirable en elle-même ; & il n'y a gueres de qualité de nôtre Ame qui en fasse mieux voir la grandeur , & qui détruise davantage les imaginations basses & grossieres de ceux qui voudroient la faire passer pour une matiere. Car le moyen de s'imaginer qu'un Corps, c'est à dire, un Estre où nous ne concevons qu'une étendue figurée & mobile, puisse penetrer ce grand nombre de principes tout spirituels qu'il faut lier ensemble pour la preuve des propositions que la Geometrie nous démontre, & qu'il porte même sa veuë jusques dans l'Infiny pour en assurer ou en tirer plusieurs choses avec une certitude entiere ? Elle nous fait voir par exemple , que la Diagonale & le côté d'un Quarré n'ont nulle mesure commune ; c'est à dire , que l'Esprit voit que dans l'infinité des parties de differente grandeur qu'on y peut choisir, il n'y en a aucune qui puisse mesurer exactement l'une & l'autre de ces deux lignes.

P R E F A C E.

On peut dire que toutes les propositions Geometriques sont de même infinies en étendue; parce que l'on n'y conclud pas ce qu'on démontre d'une seule Ligne, d'un seul Angle, d'un seul Cercle, d'un seul Triangle: mais de toutes les Lignes, de tous les Angles, de tous les Cercles, de tous les Triangles; & qu'ainsi l'Esprit les renferme & les comprend tous en quelque sorte, quelque infinis qu'ils soient. Or que tout cela se puisse faire par le bouleversement d'une matiere, & qu'en la remuant elle devienne capable de comprendre des objets spirituels, & d'en comprendre même une infinité: c'est ce que personne ne scauroit croire ny penser, pourvu qu'il veuille de bonne foy songer à ce qu'il dit.

Ce sont ces reflexions qui ont fait juger à l'Autheur de ces Elemens, qu'on pouvoit faire un bon usage de la Goemetrie; mais ce n'est pas néanmoins ce qui l'a porté à travailler à en faire de nouveaux, puisqu'on peut tirer tous ces avantages des livres ordinaires qui en traitent. Ils portent tous à aimer la verité; ils apprennent à la discerner; ils fortifient la Raison; ils étendent la veüe de l'Esprit, & ils donnent lieu d'admirer la grandeur de l'Ame de l'Homme, & de reconnoistre qu'elle ne peut être autre que spirituelle & immortelle.

Ce qui lui a donc fait croire qu'il étoit utile de donner une nouvelle forme à cette Science, est, qu'étant persuadé que c'étoit une chose fort avantageuse de s'accoutumer à reduire ses pensées à un ordre naturel, cet ordre étant comme une lumiere qui les éclaircit toutes les unes par les autres: il a toujours eu quelque peine

P R E F A C E.

peine de ce que les Elemens d'Euclide étoient tellement confus & broüillez , que bien loin de pouvoir donner à l'Esprit l'idée & le goust du veritable ordre , ils ne pouvoient au contraire que l'accoûter au desordre & à la confusion.

Ce défaut lui paroissoit considerable dans une Science dont la principale utilité est de perfectionner la Raison ; mais il n'eust pas pensé néanmoins à y remedier , sans la rencontre que je vai dire qui l'y engagea insensiblement. Un des plus grands Esprits de ce siecle , & des plus celebres par l'ouverture admirable qu'il avoit pour les Mathematiques , avoit fait en quelques jours un Essay d'Elemens de Geometrie ; & comme il n'avoit pas cette veüe de l'ordre , il s'étoit contenté de changer plusieurs des démonstrations d'Euclide , pour en substituer d'autres plus nettes & plus naturelles. Ce petit Ouvrage étant tombé entre les mains de celui qui a depuis composé ces Elemens , il s'étonna qu'un si grand Esprit n'eust pas été frappé de la confusion qu'il avoit laissée pour ce qui est de la methode , & cette pensée luy ouvrit en même temps une maniere naturelle de disposer toute la Geometrie ; les démonstrations s'arrangerent d'elles mêmes dans son Esprit , & tout le corps de l'Ouvrage que nous donnons maintenant au Public se forma dans son idée.

Cela luy fit dire en riant à quelques-uns de ses amis , que s'il avoit le loisir , il luy seroit facile de faire des Elemens de Geometrie mieux ordonnez que ceux que l'on luy avoit montrez ; mais ce n'étoit encore qu'un projet
en

P R E F A C E.

en l'air qu'il avoit peu d'esperance de pouvoir executer, quoi que quelques personnes l'en priaissent; parce qu'il auroit fait scrupule d'y employer un temps où il auroit été en état de faire quelqu'autre chose.

Il est arrivé néanmoins depuis que diverses rencontres luy ont donné le loisir dont il avoit besoin pour cela. Il fut une fois obligé par une indisposition de quitter ses occupations ordinaires, & il trouva son soulagement en se déchargeant d'une partie de ce qu'il avoit dans l'Esprit sur cette matiere. Une autrefois il se trouva quatre ou cinq jours dans une maison de Campagne sans aucun livre, & il remplit encore ce vuide en composant quelque partie de ce Traité. Enfin en ménageant ainsi quelques petits temps, il a achevé ce qu'il avoit dessein de faire de cét Ouvrage, s'étant borné d'abord à la Geometrie des Plans, comme pouvant suffire au commun du monde.

Quelques personnes se sont étonnez qu'en écrivant d'une matiere si étendue, & qui a été traitée par un si grand nombre d'habiles gens, il ne leût pour cela aucun livre de Geometrie, n'en ayant point même dans sa Bibliotheque: mais il leur répondoit, que l'ordre le conduisoit tellement, qu'il ne croyoit pas pouvoir rien oublier de considerable. Il ajoûtoit même que cét ordre ne servoit pas seulement à faciliter l'intelligence & à soulager la memoire: mais qu'il donnoit lieu de trouver des principes plus seconds, & des demonstrations plus nettes que celles dont on se sert d'ordinaire. Et en effet il n'y a presque dans ces nouveaux Elements

P R E F A C E.

mens que des démonstrations toutes nouvelles, qui naissent d'elles-mêmes des principes qui y sont établis, & qui comprennent un assez grand nombre de nouvelles propositions.

On voit assez par là qu'il n'étoit pas fort difficile à l'Autheur de la nouvelle Logique ou Art de penser, qui avoit veu quelque chose de cette Geometrie, de remarquer, comme il a fait dans la IV.^e Partie, les défauts de la methode d'Euclide, & d'avancer qu'on pourroit digerer la Geometrie dans un meilleur ordre. C'étoit deviner les choses passées. Mais cette avance qu'il avoit faite, sans se hasarder beaucoup, a depuis servi d'engagement à produire ce petit Ouvrage, à quoy l'on n'auroit peut-être jamais pensé. Car tant de personnes ont demandé au Libraire une nouvelle Geometrie, qu'on n'a pas pû la refuser aux instances qu'il a faites de leur part pour l'obtenir, n'étant pas juste de se faire beaucoup prier pour si peu de chose.

On s'est donc resolu de la donner au Public, & de le rendre juge de l'utilité qu'on en peut tirer. On croit seulement devoir avertir le monde qu'il y aura peut-être quelques personnes qui pourront trouver les IV. premiers Livres un peu difficiles, parce qu'on s'y est servi de démonstrations d'Algebre, auxquelles on a quelque peine d'abord à s'accoutûmer. La raison qui a obligé d'en user ainsi, est, que traitant des Grandeurs en general, entant que ce mot comprend toutes les especes de quantité, on ne pouvoit pas se servir de figures pour aider l'Imagination; outre que l'on jugeoit qu'il étoit utile de se rompre d'abord à cette methode,

P R E F A C E.

de, qui est la plus feconde & la plus Geometrique ; mais ceux néanmoins à qui elle feroit trop de peine ont moyen de s'en exempter, en commençant par le V.^e Livre, & en supposant prouvées quelques Propositions qui dépendent des quatre premiers. Ce remede est aisé ; & il ne les privera pas du fruit qu'ils pourront tirer de la methode de ces Elemens, lors qu'en une seconde lecture ils les liront tous de suite.

Pour les autres jugemens qu'on peut faire de cet Ouvrage, comme il est facile de les prévoir, il semble aussi qu'on n'ait pas sujet de s'en mettre en peine. Car s'il se trouve des personnes qui le méprisent par des principes plus élevez, & par un éloignement de toutes ces sortes de sciences, peut-être ne seront-ils pas fort éloignez du sentiment de l'Auteur. S'il y en a qui le blâment comme Geometres en y remarquant de veritables fautes, ils seront encore d'accord avec lui, parce qu'il sera toujours tout-prest de les corriger. Enfin ceux qui le reprendront comme Geometres, mais en se trompant, ne peuvent pas lui être fort incommodes, parce que c'est une matiere où les veritez sont si claires, qu'elles n'ont gueres besoin d'apologie contre les injustes accusations.

DEFINITIONS DE QUELQUES
mots dont on s'est servi dans ces Ele-
mens sans les definir , parce qu'ils
sont plù-tôt de Logique que de Geo-
metrie.

AXIOME. On appelle ainsi une propo-
sition si claire qu'elle n'a pas besoin de
preuve : comme , *Que le tout est plus*
grand que sa partie. Voyez la Logique
IV. Part. Chap. VI.

DEMANDE. On se sert de ce mot quand
on a quelque chose à faire , qui est si facile
qu'on n'a pas besoin de preuve pour démon-
trer qu'on a fait ce que l'on vouloit faire :
comme , *Décrire un Cercle d'un intervalle donné.*

DEFINITION. Ce qu'on appelle de ce
nom en Geometrie , est la determination d'un
mot qui pourroit former diverses idées , à une
idée si claire & si distincte , qu'elle revienne
toujours dans l'Esprit lorsqu'on se sert de ce
mot : comme , *On appelle Parallelogramme une*
figure dont les côtez opposez sont paralleles.
Voyez l'Art de penser. I. Part. Chap. XI.

THEOREME. On nomme ainsi une propo-
sition dont il faut démontrer la verité : com-
me , *que le quarré de la base d'un Angle droit est*
égal aux quarréz des deux côtez.

PROBLEME. C'est aussi une proposition
qu'il faut démontrer ; mais dans laquelle il
s'agit de faire quelque chose , & de prouver
qu'on a fait ce qu'on avoit proposé de faire :
comme , *Faire passer par un point donné une*
ligne parallele à une ligne donnée.

LEMME.

LEMME. C'est une proposition qui n'est au lieu où elle est , que pour servir de preuve à d'autres qui suivent. On en peut voir des exemples au commencement des Livres VI. X. & XI.

COROLLAIRE. C'est une proposition qui n'est qu'une suite d'une autre précédente ; on en peut voir un grand nombre dans le Livre IX.

Mais il faut remarquer , que pour mieux faire voir la dépendance qu'avoient plusieurs propositions d'une seule qui en étoit comme le principe & le fondement , on a quelquefois mis en Corollaire ce qu'on auroit pu mettre en Théorème , si on avoit voulu.

Et pour la même raison , il y a de certains Théorèmes à qui on a donné le nom de *Proposition fondamentale* ; parce que toutes les Propositions d'une certaine matière en dépendent. On en peut voir des exemples dans les Livres VI. VIII. X. XI.

Explication de quelques Notes.

QUOI que ces Notes soient expliquées chacune en son lieu : néanmoins on a crû les devoir encore mettre ici , afin de les faire mieux entendre.

+ *Plus* ; ainsi $9+3$, c'est à dire , neuf plus trois.

— *Moins* ; ainsi $14-2$, c'est à dire , quatorze moins deux.

= *Marque de l'égalité* ; ainsi $9+3 = 14-2$, c'est à dire , neuf plus trois est égal à quatorze moins deux.

:: Ces quatre points entre deux termes devant ,

vant , & deux termes après , marquent que ces quatre termes sont proportionels ou Arithmetiquement , ou Geometriquement.

Ainsi, Arithmetiquement , $7. 3. :: 13. 9.$

Et Geometriquement , $6. 2. :: 12. 4.$

∴ Ces mêmes quatre points avec une ligne qui les coupe , marquent la Proportion continuë ; ainsi $\frac{3}{9} = \frac{27}{81}$. c'est à dire , 3 est à 9 : comme 9 est à 27.

Deux lettres ensemble comme *bd* , marquent quelquefois une Grandeur de deux dimensions , comme un *Plan* dont la longueur soit *b* & la largeur *d*. Mais d'autres fois ce n'est qu'une ligne dont ces deux lettres marquent les deux extremités ; ce qu'il est aisé de discerner par le sujet que l'on traite.

Les Livres sont divisez en Nombres par des chiffres qui sont en marge : & c'est seulement à cela qu'on a égard dans les citations & les renvois à quelques points des Livres precedens ; le premier chiffre , qui est Romain marquant le Livre ; & le second qui est Arabe , marquant le Nombre de ce Livre. Ainsi *V. 29.* veut dire *le vingt-neuvième Nombre du Livre cinquième.*

Que si l'endroit où l'on renvoie est du même Livre , on cite quelquefois un tel Theorème , ou un tel Lemme , ou bien le Nombre precedent avec cette marque *S.* qui veut dire *suprà* ; comme *S. 15.* c'est à dire , *cy-dessus* , Nombre 15.

T A B L E

*De ce qui est traité dans chaque
Livre.*

On pourroit dire beaucoup de choses sur l'ordre qu'on a suivi dans ces Élemens , & pour faire voir qu'il est beaucoup plus naturel qu'aucun autre ait jamais observé dans ces matieres. Mais on aime mieux en laisser le jugement à ceux qui les liront , & l'on se contente d'en représenter le plan , en faisant voir de suite ce qui est traité dans chaque Livre.

LIVRE PREMIER. Des grandeurs en General , & des quatre Operations , Ajoûter , Soustraire , Multiplier , Diviser , tant qu'elles se peuvent appliquer à toutes sortes de grandeurs. Page 1

LIVRE II. De la Raison & Proportion Geometriques. Page 29

LIVRE III. De la Raison composée , où l'on fait voir aussi comment on peut faire sur les Raisons les quatre Operations communes , Ajoûter , Soustraire , Multiplier , Diviser. Page 72

LIVRE IV. Des grandeurs commensurables & incommensurables. Page 90

LIVRE V. De l'Etendue. De la Ligne droite & circulaire. Des droites perpendiculaires & obliques. Page 145

LIVRE VI. Des Lignes paralleles. Page 174
LI.

LIVRE VII. Des Lignes terminées à une circonférence ; où il est parlé, Des Sinus , & de la proportion des arcs de divers Cercles à leurs circonférences , & du parallélisme des Lignes circulaires.

Page 195

LIVRE VIII. Des Angles rectilignes. Page 223

LIVRE IX. Des Angles qui ont leur sommet hors le centre du Cercle , dont les arcs ne laissent pas de les mesurer.

Page 245

LIVRE X. Des Lignes proportionnelles.

Page 282

LIVRE XI. Des Lignes reciproques. Page 306

LIVRE XII. Des Figures en general considérées selon leurs angles & leurs côtes. Page 356

LIVRE XIII. Des Triangles & Quadrilatères considerez selon leurs côtes & leurs angles.

Page 380

LIVRE XIV. Des Figures planes considérées selon leur aire ; c'est à aire selon la grandeur des surfaces qu'elles contiennent. Es premierement des Rectangles.

Page 406

LIVRE XV. De la mesure de l'aire des Parallelogrammes , des Triangles & autres Polygones.

Page 437

SOLUTION

d'un Problème d'Arithmetique appellé

LES QUARREZ MAGIQUES. Page 463

AVER-

AVERTISSEMENT

Sur cette nouvelle Edition.

LA seconde Edition de Paris, qui est la dernière, & sur laquelle on a fait celle-ci, est si viciée, qu'on y a compté plusieurs centaines de fautes essentielles; & entr'autres un grand nombre de citations fausses. On a donc pris soin de tout corriger: on a même éclairci certains endroits qui sembloient un peu obscurs & ajouté les figures qui manquoient. Cependant quelque précaution que l'on y ait apportée, on n'a pu si bien faire, qu'il n'ait échappé aussi les fautes suivantes.

FAUTES A CORRIGER.

Pag. 31. lign. 9. Raison (lisez) Grandeur

Pag. 40. lign. 8. $\frac{D}{B}$ (lisez) $\frac{B}{D}$

Pag. 73. lign. 3. N. 47. (lisez) II. 47.

Pag. 76. lign. 15. de $\frac{ca}{bm}$, (lisez) de $\frac{cm}{bn}$,

Pag. 84. lign. 15. $\frac{2}{4} :: \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{18}$. (lisez) $\frac{5}{4} :: \frac{3}{2} \cdot \frac{15}{8}$.

Pag. 88. lign. 3. $:: b. c.$ (lisez) $:: b. e;$ & $b. c.$

Pag. 140. lign. penult. membre l'équation (lisez) mem-
del'équation

Pag. 185. lign. 26. (par le 6.^e Lemme.) lisez (par
la 2.^{de} Proposition.)

NOU-



NOUVEAUX ELEMENS DE GEOMETRIE.

LIVRE PREMIER.

DES GRANDEURS EN GENERAL; ET DES QUATRE OPERATIONS,

Ajouter, Soustraire, Multiplier, Diviser, entant qu'elles se peuvent appliquer à toutes sortes de grandeurs.

SUPPOSITIONS GENERALES.



TOUTES les Sciences supposent des connoissances naturelles, & elles ne consistent proprement qu'à étendre plus loin ce que nous s'avons naturellement.

Ainsi quoi qu'il semble que ce soit contre le
A vrai

2 NOUVEAUX ELEMENS

vrai ordre des sciences de supposer dans les supérieures, ce qui ne se doit traiter que dans les inférieures, comme qui supposerois dans la Géométrie, ce qui ne s'apprendroit que dans l'Astronomie; néanmoins ce n'est point contre cet ordre que de supposer dans une science supérieure ce qui regarde l'objet de l'inférieure, lors que nous ne supposons que ce qui se peut savoir par la seule lumière naturelle sans l'aide d'aucune science.

C'EST POURQUOI aiant entrepris de traiter icy de la quantité ou grandeur en general, entant que ce mot comprend l'étendue, le nombre, le temps, les degrez de vitesse, & généralement tout ce qui se peut augmenter en ajoutant ou multipliant; & diminuer en soustrayant ou divisant, &c. je ne ferai point de difficulté de supposer qu'on sçait de certaines choses qui semblent appartenir à la science des nombres qu'on appelle Arithmétique, ou à la science de l'étendue qu'on appelle Géométrie; parce que je ne supposerai rien qu'on ne puisse sçavoir sans l'aide de l'Arithmétique ou de la Géométrie pour peu d'attention qu'on y fasse, ou qu'on y ait déjà fait.

PREMIERE SUPPOSITION.

- II. Je suppose donc premièrement qu'on sçache ajouter & multiplier de petits nombres, comme que 4 & 5 font 9, que 3 fois 5 font 15, &c.

SECONDE SUPPOSITION.

- III. SECONDEMENT qu'on sçache que c'est la même chose dans la multiplication de commencer par lequel on veut des deux nombres que l'on multiplie: comme que 3 fois 5 est la même chose que 5 fois 3; que 4 fois 6 est la même chose que 6 fois 4.

TROIS-

TROISIÈME SUPPOSITION.

Je suppose en troisièm^e lieu, que l'on sçache
 que ce qu'on appelle corps, espace, étenduë,
 (car tout cela signifie la même chose) a trois
 dimensions, longueur, largeur, & profondeur. Et
 que quand on les considère toutes trois, c'est alors
 que cette sorte de grandeur s'appelle proprement
Corps ou *Solide*. Que quand on n'en considère que
 deux, sçavoir la longueur & la largeur, on l'appelle
 alors *Surface*. Et que quand on n'en considère
 qu'une, sçavoir la longueur, on l'appelle alors *Ligne*.



QUATRIÈME SUPPOSITION.

Je suppose en quatrièm^e lieu, que la multipli-
 cation & la division se peuvent appliquer à toutes
 grandeurs, & non seulement aux nombres. Car
 par exemple dans l'étenduë on appelle multiplier la
 longueur par la largeur, lors qu'ayant un morceau
 de terre de 4 perches de longueur & 3 de largeur,
 on dit que ce morceau de terre a 12 perches de sur-
 face. Et au contraire ; on appelle diviser, lors
 que sçachant par exemple quel est le contenu d'un
 morceau de terre, comme qu'il est de 12 perches,
 & sçachant aussi quelle en est la longueur, comme
 de 4 perches, on en cherche la largeur qui se trou-
 vera être de 3 perches. On pourroit encore donner
 une autre notion de la multiplication & de la division
 par rapport à l'unité ; mais celle-là suffit pour ce que
 nous avons à faire, & l'autre ne se pourroit bien
 expliquer qu'en supposant des choses dont nous ne
 parlerons que dans la suite.



CINQUIÈME SUPPOSITION.

VI. JE suppose en cinquième lieu, que l'on se puisse mettre dans l'esprit que ce qu'on appelle les trois dimensions dans les corps s'applique par accommodation à toutes les autres grandeurs, & même aux nombres.

CAR on les considère quelquefois comme n'ayant qu'une dimension, lors qu'on ne suppose point qu'on les ait multipliés par une autre grandeur. Et alors on les peut appeler *grandeurs linéaires*: comme est par exemple le nombre de 7, qu'on ne considère que comme étant composé de sept unités.

Et quelquefois on les considère comme ayant deux dimensions, lorsqu'on suppose qu'une grandeur est née de la multiplication de deux linéaires; & alors on les peut appeler *grandeurs planes*. Comme est par exemple le nombre de 12, lors qu'on le considère comme étant né de la multiplication de 3 par 4.

. . . .

Et enfin on les considère comme ayant trois dimensions, lors qu'on suppose qu'une grandeur est née de la multiplication de trois grandeurs linéaires, ou d'une plane qui en a déjà deux, par une linéaire. Et alors on peut appeler ces *grandeurs solides*. Comme est par exemple le nombre de 24, quand on le considère comme né de la multiplication de ces trois nombres 2, 3, 4; parce que 2 fois 3 font 6, & 4 fois 6 font 24.

SIXIÈME

SIXIÈME SUPPOSITION.

Je suppose enfin qu'on s'accoutume à concevoir généralement les choses en les marquant par des lettres sans se mettre en peine de ce qu'elles signifient, puis qu'on ne s'en sert que pour conclure que b est b , que c est c : ou (ce qui est pris pour la même chose en matière de grandeur, sur tout en general) que b est égal à b , & c à c : ou que b multiplié par c est égal à b multiplié par c , ou, selon la 2.^e Supposition, à c multiplié par b .

VII.

CETTE remarque est de grande importance. Car on ne feroit que se broûiller, si dans ces commencemens, qui doivent être très-simples, on vouloit appliquer ce qu'on traite généralement à des exemples particuliers dont la connoissance dépendroit d'autres principes. Et de plus, l'une des plus grandes utilitez de ce traité, est d'accoutumer l'esprit à concevoir les choses d'une manière spirituelle sans l'aide d'aucunes images sensibles, ce qui sert beaucoup à nous rendre capables de la connoissance de Dieu & de nôtre ame.

PRINCIPES GENERAUX.

DU TOUT ET DES PARTIES.

TOUTE grandeur est considérée comme divisible en ses parties.

VIII.

La grandeur est appelée *tout* au regard de ses parties.

IX.

Lors qu'une partie de la grandeur est contenue précisément tant de fois dans son tout, comme 2 fois, 3 fois, 4 fois, &c. elle s'appelle *partie aliquote*, ou simplement *aliquote*.

X.

On dit aussi qu'elle en est *la mesure*; parce qu'elle la mesure justement étant prise autant de fois qu'il faut.

XI.

A 3

Ainsi

NOUVEAUX ELEMENS

Ainsi 3 est partie aliquote de 9, parce qu'il y est trois fois; 5, partie aliquote de 20, parce qu'il y est 4 fois.

XII. Quand les parties aliquotes d'une grandeur sont autant de fois dans leur tout que les parties aliquotes d'une autre grandeur dans le leur, elles sont appelées *aliquotes pareilles*. Ainsi 3 & 4, sont les aliquotes pareilles de 9 & de 12; parce que 3 est autant de fois dans 9, que 4 dans 12, l'un & l'autre y étant 3 fois.

XIII. Le tout est mesure à soi-même, parce que toute grandeur est contenuë une fois dans soi-même.

XIV. On appelle *portion* toute partie aliquote ou non aliquote. Ainsi 4 est une portion de 13; 5 de 7.

AXIOMES.

DE L'EGALITÉ ET INÉGALITÉ.

XV. Le tout est plus grand que sa partie.
XVI. Le tout est égal à toutes ses parties prises ensemble.

XVII. Les grandeurs égales à une même grandeur sont égales entr'elles.

XVIII. Si à grandeurs égales on en ajoute d'égales, les tous sont égaux.

XIX. Si de grandeurs égales on en ôte d'égales, les restes seront égaux.

XX. Si de grandeurs inégales on en ôte d'égales, les restes seront inégaux.

XXI. Si à grandeurs inégales on en ajoute d'égales, les tous seront inégaux.

XXII. Les aliquotes pareilles de grandeurs égales sont égales. Par exemple, si b est égal à c , le tiers de b sera égal au tiers de c , cela est manifeste.

XXIII. Et par la même raison deux grandeurs sont égales

DE GEOMETRIE. LIV. I. 7

les quand leurs aliquotes pareilles sont égales. Si le tiers de b est égal au tiers de c , b est égal à c ; car b est égal à ses trois tiers, & c aux trois siens. Or si un tiers est égal à un tiers, les trois tiers sont égaux aux trois tiers : puis que ce n'est qu'ajouter choses égales à choses égales. Donc &c.

On peut marquer ainsi qu'une grandeur est égale à une autre, comme que b est égal à c , XXIV.
 $b = c$.

DES QUATRE OPERATIONS, AJOUTER, &c.

ADDITION.

Ajouter, ou *Addition*, c'est mettre deux ou plusieurs grandeurs ensemble, & en faire comme un tout qui s'appelle *somme*. XXV.

Cela s'exprime ainsi b plus c , & se marque ainsi $b + c$.

SOUSTRACTION.

Soustraire, ou *Soustraction*, c'est retrancher une moindre grandeur d'une plus grande. Et ce qui résulte de là s'appelle *reste* ou *différence*. Car ce qui reste de la plus grande est ce en quoi la plus grande surpassoit la plus petite. Si de 5 je retranche 3, reste 2, & 2 est la différence de 5 à 3. XXVI.

La Soustraction s'exprime ainsi, b moins c , & se marque ainsi $b - c$.

MULTIPLICATION.

Multiplier ou *Multiplikation*, c'est quand aiant deux grandeurs comme b & c , je fais que ce que l'unité est à l'une des deux, l'autre l'est à ce qui résulte XXVII.

A 4

résulte

8 NOUVEAUX ELEMENTS

resulte de la Multiplication , qu'on appelle *produit*.

Une toise est à 3 toises , ce que 4 toises sont à 12 ; Et ainsi 12 toises est le *produit* de 3 toises multipliées par 4.

XXVIII. Cela s'exprime ainsi quand on ne se sert que de lettres , b en c , ou b par c ; Il y en a qui le marquent ainsi $b \times c$; mais il est plus court de les mettre seulement ensemble bc , & nous ne nous servirons que de ce dernier.

Il faut remarquer qu'une grandeur marquée par un seul caractère comme b , ou c , s'appelle *grandeur lineaire*, selon la 3^e Supposition. Que quand on les joint ensemble en mettant bc , cela ne veut pas dire que l'une soit ajoutée à l'autre (ce qu'il faudroit marquer par $b + c$, b plus c ,) mais que l'une est multipliée par l'autre, d'où naît ce qu'on appelle *produit*.

XXIX. Que s'il ny a eu que deux grandeurs lineaires qui aient été multipliées l'une par l'autre, ce produit s'appelle *grandeur plane* ou *plan*.

XXX. Et les deux grandeurs lineaires d'où ce plan a été produit, s'appellent *ses deux dimensions*, ou *ses deux côtés*.

XXXI. Et si c'est la même grandeur lineaire qui a été multipliée par soi-même, comme si b en b a fait b^2 , ce plan s'appelle *quarré*. Et cette grandeur lineaire *sa racine*. On marque quelquefois le quarré ainsi bq . c'est à dire b quarré ou b^2 . c'est à dire b de deux dimensions.

XXXII. Que si trois grandeurs lineaires sont multipliées l'une par l'autre, comme b en c , & bc en d , ce qui fait bcd ; ou (ce qui est la même chose) si une grandeur plane, comme bc , est multipliée par une lineaire, comme par d , ce qui fait aussi bcd : ce produit s'appelle *solide*, ou *une grandeur de 3 dimensions*.

XXXIII. Et si c'est une même grandeur qui est multipliée 2 fois.

DE GEOMETRIE. LIV. I. 9

fois par elle-même, comme b en b , & $b b$ en b : ou (ce qui est la même chose) si un quarré, comme $b b$, est encore une fois multiplié par b la racine, ce qui fait $b b b$: ce solide s'appelle *cube*, & b la racine de ce cube.

On marque quelquefois le cube ainsi b^3 . c'est à dire b cube, ou b^3 . c'est à dire b de trois dimensions.

DIVISION.

Diviser ou *division*, c'est lors qu'ayant une grandeur qui s'appelle *diviseur*, parce qu'elle en doit diviser une autre qui s'appelle *dividende*: on fait que comme le *diviseur* est au *dividende*, l'unité soit à ce qui naît de la division, qu'on appelle *quotient*.

Afin que 3 divise 12, il faut que je trouve un nombre à qui l'unité soit comme 3 est à 12, & ce nombre est 4; car 3 est quatre fois dans 12, comme l'unité est quatre fois dans 4.

La division s'exprime ainsi b divisé par p , & se marque ainsi $\frac{b}{p}$, & cela s'appelle *quotient*, comme j'ai déjà dit; & la grandeur de dessus est le *dividende* ou *grandeur à diviser*, & celle de dessous est le *diviseur*.

C'est presque toujours une grandeur de plusieurs dimensions qu'on divise par une grandeur de moins de dimensions. Car la division est opposée à la multiplication, comme la soustraction à l'addition; d'où vient que la multiplication du diviseur & du quotient fait une grandeur égale à la grandeur à diviser, parce que la multiplication refait ce que la division avoit défait. Et d'où vient aussi par la même raison que si on veut multiplier une grandeur divisée par le diviseur même, on n'a qu'à ôter le diviseur, & la grandeur à diviser demeure

A 5

meurant

10 NOUVEAUX ELEMENS

meurant seule , fera le produit. Ainsi le produit de $\frac{b}{c}$ en g est $b c$.

xxxv. La division est de peu d'usage dans le traité de la grandeur en general ; parce qu'on ne sçauroit d'ordinaire déterminer un quotient qu'en descendant à quelque espece de grandeur , comme l'étenduë ou le nombre.

Il n'y a qu'une rencontre où on le peut , qui est lors que le même caractere se trouve dans la grandeur à diviser & dans le diviseur. Car alors ostant ce caractere de l'un & de l'autre , ce qui restera sera le quotient.

Ainsi aiant $\frac{b}{c}$ le quotient sera c .

Aiant $\frac{b}{c} d$ le quotient sera d .

Aiant $\frac{b}{c} d$ le quotient sera $c d$.

DES GRANDEURS

INCOMPLEXES ET COMPLEXES.

xxxvi. Outre ce que nous avons remarqué que l'on pouvoit considerer les grandeurs comme n'ayant qu'une dimension , ou en aiant plusieurs : on peut encore considerer toutes ces sortes de grandeurs lineaires , planes , ou solides , comme complexes , ou comme complexes.

xxxvii. Je les appelle *incomplexes* quand on considere une grandeur d'une ou de plusieurs dimensions à part , comme b , ou $c d$, ou $m n o$, sans y rien ajoûter ou en rien oster.

xxxviii. Et je les appelle *complexes* quand on y enjoint d'autres de même genre par un *plus* ou un *moins* , ou qu'on marque par un chiffre que la même grandeur se doit prendre plusieurs fois , comme $b + c$, ou $b + c + d$, ou $b + f - g$, ou $b c + f g$, ou $b c + f g - m n$.

Ou par des chiffres , comme $3 b$.

Or

DE GEOMETRIE. LIV. I. M

Or comme il y a quelque difficulté un peu plus grande pour faire les operations dont nous venons de parler sur les grandeurs complexes, nous en donnerons les principes & les regles.

PRINCIPES

POUR FAIRE LES QUATRE OPERATIONS SUR LES GRANDEURS COMPLEXES.

1. CHAQUE grandeur in complexe dont la complexé est composée se peut appeller *terme*. XXXIX.

2. LE plus & le moins sont appellez *signes*. XL.

LE plus \rightarrow *signe affirmatif*; le moins, --- *signe negatif*.

3. PAR tout où n'est point le signe negatif, l'affirmatif est sous-entendu. Ainsi $b \rightarrow c$, vaut $\rightarrow b \rightarrow c$. Mais il seroit inutile de marquer le plus au commencement. XLII.

4. LE plus & le moins d'une même grandeur ou terme sont égaux à rien, ou valent zero. Car l'un ostant ce que l'autre a mis, il ne demeure rien. Ainsi $b \text{---} b$, ce n'est rien; $b \rightarrow c \text{---} c$ ne vaut que b . Cela est aussi important que facile. XLIII.

5. LORS que le même terme est plusieurs fois repeté dans une grandeur complexe, si c'est toujours avec le même signe, soit affirmatif, soit negatif, on peut ne le mettre qu'une fois avec son même signe, en marquant par un chiffre combien il doit être pris de fois. Ainsi pour $b \rightarrow c \rightarrow c \rightarrow c$, on peut mettre b plus 3 c , ou $b \rightarrow 3 c$: au lieu de $b \text{---} g \text{---} g \text{---} g$, on peut mettre b moins 3 g , ou $b \text{---} 3 g$. XLIIII.

6. MAIS si la même grandeur ou terme est avec des signes divers, on peut alors selon le principe 4. oster ce terme de la grandeur complexe XLV.

12 NOUVEAUX ELEMENS

autant de fois qu'il est avec un plus & avec un moins. Ainsi $b + c + c - c - c$, ne vaut que b , parce que c est autant de fois ôté que mis, & ainsi il ne reste rien. Que s'il y avoit un *plus* davantage, comme $b + c + c - c$, alors il le faudroit laisser une fois avec *plus* ainsi : $b + c$, & de même s'il y avoit un *moins* davantage.

ADDITION

DES GRANDEURS COMPLEXES

XLV. POUR ajouter une grandeur complexe, comme $b + c$, à une autre grandeur ou complexe comme $m + c$, ou incomplexue comme m : il ne faut qu'y joindre la grandeur qu'on veut ajouter & en conserver tous les signes ; en observant toujours que le signe affirmatif est sous-entendu où il n'y en a point.

A $b + c$. } Somme $b + c + m + n$.
ajouter $m + n$.

A $b + c$. } Somme $b + c + m - n$.
ajouter $m - n$.

XLVI. Que s'il y a des chiffres, il les faut laisser comme on les trouve.

A $2b + 3c$. } Somme $2b + 3c + m + 4n$.
ajouter $3m + 4n$.

XLVII. La somme étant trouvée, si le même terme s'y trouve plusieurs fois, on peut pratiquer ce qui a été dit dans le principe 5.^e & 6.^e Ce qui soit dit une seule fois pour toutes les autres opérations.

SOUSTRACTION

DES GRANDEURS COMPLEXES.

XLVIII. POUR soustraire une grandeur complexe d'une autre grandeur ou complexe ou incomplexue, il ne faut que l'y joindre en changeant tous les signes de

DE GEOMETRIE. LIV. I. 13

de la grandeur qu'on soustrait , & observant toujours que le signe affirmatif est sous-entendu où il n'y en a point.

De $b + c$. } reste $b + c - m - n$.
 ôter $m + n$ }

De $b + c$. } reste $b + c - m + n - o$.
 ôter $m - n + o$ }

IL n'est pas difficile de juger pourquoy on change le *plus* sous-entendu en *moins* dans le premier terme de la grandeur à soustraire : car c'est en cela même que consiste la soustraction. Mais d'abord on est surpris de ce qu'il faut changer les signes de *moins* en *plus* ; car au lieu que la Soustraction doit faire la grandeur moindre qu'elle n'étoit , on la rend plus grande par là.

Cela est facile à comprendre quand ce que l'on doit soustraire , a d'abord un *plus* & puis un *moins*. Comme si de b je veux ôter $p - n$; car $p - n$ étant moins que p : en ôtant p j'ôte trop ; & ainsi aiant ôté p , parce qu'on a trop ôté , il faut ajouter n , qui est ce qu'on a ôté de trop.

Mais quand il n'y auroit dans ce qu'on veut ôter qu'une grandeur avec le signe de *moins* : il faut toujours la mettre par le signe de *plus* ; comme si de b , j'en voulois ôter $-n$, je devois mettre $b + n$.

Car ce qui trompe en cela , c'est qu'ajouter *moins* , c'est ôter ; & retrancher *moins* , c'est ajouter. Ajouter au bien d'un homme une dette passive de mille francs , qu'il croit avoir payée , ce n'est pas augmenter son bien , c'est le diminuer de mille livres ; & en retrancher une dette passive de la même somme en la payant pour lui , ce n'est pas diminuer son bien , c'est l'augmenter de mille francs. Il ne faut donc pas s'étonner si dans l'Addition à b , ajoutant $-n$, je ne change point le *moins* en *plus* , mais le laissant comme il étoit , cela fait $b - n$: de sorte que la somme est moindre que

14 NOUVEAUX ELEMENS

n'étoit ce à quoi je l'ai ajouté , parce que je n'ai ajouté qu'en apparence , mais j'ai retranché en effet.

Et au contraire dans la Soustraction , si de b je retranche n , il faut que changeant le signe de *moins* en *plus* , je mette $b + n$; ce qui fait un reste plus grand que ce dont j'ai retranché ; parceque retrancher un *moins*, c'est ne retrancher qu'en apparence, & ajouter en effet. On en peut apporter une preuve bien sensible dans les nombres. Je veux de 7 retrancher moins 2 , au lieu de 7 je prends $9 - 2$, qui lui est égal. Il faut donc qu'il reste la même chose , si de l'un ou l'autre je retranche 2 . Or si de $9 - 2$, je retranche 2 , je le pourrai faire, ou effaçant 2 de $9 - 2$, ou en mettant $+ 2$ après $9 - 2$; c'est à dire en mettant $9 - 2 + 2$. Or de l'une ou de l'autre maniere il restera 9 ; car 2 étant par *plus* & par *moins* se réduit à zero. Il faut donc qu'il reste la même chose lors que de 7 on ôte 2 . Et cela ne peut être qu'en changeant le *moins* en *plus* , & mettant $7 + 2$; ce qui fait 9.

MULTIPLICATION

DES GRANDEURS COMPLEXES.

XLIX. Pour multiplier une grandeur complexe par une autre complexe ou incomplexe , il faut faire autant de multiplications particulieres que chaque terme de la grandeur complexe peut être comparé avec chaque terme de l'autre grandeur.

DE sorte que multipliant le nombre des termes d'une grandeur à multiplier , avec le nombre des termes de l'autre , on a le nombre des multiplications partiales qu'il faut faire pour avoir la multiplication totale , ou le produit total.

L. AINSI lors qu'une des deux grandeurs n'a qu'un terme & que l'autre en a deux , parce qu'une fois deux ne font que deux , il ne faudra faire que deux

DE GEOMETRIE. LIV. I. 15

deux multiplications partiales de chacun des deux termes d'une grandeur par le terme unique de l'autre.

$\begin{matrix} b. \\ \text{En } c \rightarrow d. \end{matrix} \} \text{ produit } e b \rightarrow d b.$

LORS que les deux grandeurs ont chacune deux termes, parce que deux fois deux sont 4, il faudra faire 4 multiplications partiales pour avoir le produit total.

L I.

$\begin{matrix} b \rightarrow c. \\ \text{En } p \rightarrow q. \end{matrix} \} \text{ produit } p b \rightarrow p c \rightarrow q b \rightarrow q c.$

LORS que chacune a trois termes, parce que trois fois trois sont neuf, il faudra faire neuf multiplications, qu'on pourra disposer trois à trois en cette sorte:

L I I.

$\begin{matrix} b \rightarrow c \rightarrow d. \\ \text{En } p \rightarrow q \rightarrow r. \end{matrix} \} \begin{matrix} p b \rightarrow p c \rightarrow p d. \\ \rightarrow q b \rightarrow q c \rightarrow q d. \\ \rightarrow r b \rightarrow r c \rightarrow r d. \end{matrix}$

& ainsi à l'infini.

LA même chose se fait quand on multiplie des grandeurs planes par des grandeurs lineaires, d'où naissent des grandeurs solides.

L I I I.

$\begin{matrix} b d \rightarrow p q. \\ \text{En } f \rightarrow r. \end{matrix} \} \text{ produit } f b d \rightarrow f p q \rightarrow r b d \rightarrow r p q.$

L I V.

VOILA ce qu'il faut observer generalement dans toute multiplication des grandeurs complexes. Mais il y a une difficulté particuliere pour sçavoir quand il faut mettre les signes de *plus* ou de *moins* avant les produits des multiplications partiales. C'est ce qu'on apprendra par ces trois Regles:

PREMIERE REGLE.

PLUS en *plus* fait *plus*; c'est à dire que la multiplication de deux termes qui ont chacun un *plus* exprimé ou sous-entendu, donne un produit qui doit avoir le signe de *plus*. Cela est sans difficulté, & les exemples qu'on a proposez le font assez voir.

L V.

S E.

16 NOUVEAUX ELEMENS

SECONDE REGLE.

- XVI.** Plus en *moins*, ou *moins* en *plus* donne *moins*.
C'est à dire que la multiplication de deux termes dont l'un a *plus* & l'autre *moins*, donne un produit qui doit avoir le signe de *moins*.

$$\begin{array}{l} b \cdot \quad \quad \quad \} p b - q b, \text{ parce que } q \text{ a moins \& } b \text{ plus} \\ \text{En } p - q. \quad \quad \} \text{ sous-entendu.} \end{array}$$

TROISIÈME REGLE.

- XVII.** *Moins* en *moins* donne *plus*; C'est à dire que la multiplication de deux termes qui ont tous deux *moins* donne un produit qui doit avoir le signe de *plus*.

$$\begin{array}{l} b - d \quad \quad \quad \} b p - p d - b q + d q. \\ \text{En } p - q. \quad \quad \} \end{array}$$

RAISON DE CES TROIS REGLFS.

Ce que nous avons dit pour montrer que dans l'addition on laissoit le *moins* comme on le trouvoit, au lieu que dans la soustraction on changeoit le *moins* en *plus*, donnera un grand jour pour l'intelligence de ces trois regles, & sur tout de la dernière qui paroît d'abord fort étrange.

Supposons que les deux grandeurs que l'on veut multiplier soient 5, & 3.

On en prend une, laquelle on veut, qu'on appelle le multipliant, & l'autre est le multiplié. Supposons que 5 soit le multipliant, & 3 le multiplié.

Chacune peut avoir l'un des deux signes, le *plus* & le *moins* (+ ou —) ce qui fait 4 cas.

Le 1.^{er} cas est quand le multipliant a *plus*, & le multiplié a aussi *plus*; c'est à dire quand par + 5. je multiplie + 3.

Le 2.^d cas, est quand le multipliant a *plus*, & que

que le multiplié a *moins* ; c'est à dire quand par $+$ je multiplie—3.

Le 3.^e cas, est quand le multipliant a *moins*, & que le multiplié a *plus* ; c'est à dire quand par—5 je multiplie—3.

Le 4.^e cas, est quand le multipliant a *moins*, & que le multiplié a *moins* aussi ; c'est à dire quand par—5 je multiplie—3.

Il est question de sçavoir quel signe doit avoir le produit qui sera toujours 15 ; c'est à dire quand ce sera $+$ 15 ou—15.

Or voyez ce me semble des remarques qui feront voir que dans le 1.^{re} cas qui appartient à la 1.^{re} règle, & dans le 4.^e qui appartient à la 3.^e règle, le produit aura *plus* ; c'est à dire que ce sera $+$ 15 : Et que dans le 2.^e cas, & dans le 3.^e qui appartiennent tous deux à la 2.^e règle, le produit sera par *moins*, c'est à dire que ce sera—15.

La 1.^{re} remarque est, que quand le multipliant a *plus*, comme dans les deux premiers cas, c'est multiplier par *plus*, & qu'alors la multiplication se fait par voie d'addition ; c'est à dire en ajoutant le multiplié, (quel qu'il soit, affirmatif ou négatif) autant de fois qu'il y a d'unités dans le multipliant.

Et que quand le multipliant a *moins*, comme dans les deux derniers cas, c'est multiplier par *moins*, & qu'alors la multiplication se fait par voie de soustraction ; c'est à dire en ôtant le multiplié, quel qu'il soit, autant de fois qu'il y a d'unités, quoi que négativement dans le multipliant.

La 2.^{de} remarque est, que c'est le multiplié qui détermine en quelque sorte le signe du produit ; c'est à dire que le signe que doit avoir le multiplié dans la multiplication, soit en conservant celui qu'il avoit auparavant, soit en le changeant en son opposé, sera celui du produit.

La 3.^e qui est la suite & l'application de ces deux-
là,

18 NOUVEAUX ELEMENS

là : que quand la multiplication se fait par voie d'addition, comme dans les deux premiers cas où le multipliant a *plus* : il faut observer pour le multiplié ce qui s'observe dans l'addition, qui est de lui conserver son signe. Et ainsi dans les deux premiers cas, le produit doit avoir le même signe qu'avait le multiplié avant la multiplication. D'où il s'ensuit que dans le premier cas où le multiplié a *plus*, le produit a *plus* aussi. C'est pourquoi si par $+ 5$ je multiplie $+ 3$ le produit sera $+ 15$. Et que dans le 2.^d cas où le multiplié a *moins*, le produit doit aussi avoir *moins*. Et c'est pourquoi, si par $+ 5$ je multiplie $- 3$, le produit sera $- 15$. Ce qui revient à ce qui a été dit que si à 5 j'ajoute $- 3$, la somme sera $5 - 3$; ce qui ne fait que 2.

Mais quand la multiplication se fait par voie de soustraction, comme dans les deux derniers cas, où le multipliant a *moins* : il faut observer pour le multiplié ce qui s'observe dans la soustraction pour la grandeur positive ou négative qu'on veut retrancher, qui est de changer son signe dans le signe opposé. Et ainsi dans ces deux derniers cas le produit doit avoir le signe opposé à celui qu'avait le multiplié avant la multiplication. D'où il s'ensuit que dans le 3.^e cas où le multiplié a *plus*, le produit doit avoir *moins* ; c'est à dire que si par $- 5$ je multiplie $+ 3$ le produit sera $- 15$. Et que de même dans le 4.^e cas où le multiplié a *moins*, le produit doit avoir *plus* ; c'est à dire que si par $- 5$ je multiplie $- 3$ le produit sera $+ 15$; Car la multiplication se faisant par voie de soustraction : multiplier $- 3$ par $- 5$, c'est ôter 5 fois $- 3$. Or ôter une fois $- 3$, c'est mettre $+ 3$, comme il a été dit sur le sujet de la soustraction ; donc l'ôter 5 fois, c'est mettre $+ 15$; ce qu'il falloit prouver.

L V I I I. Cette maniere de concevoir la multiplication de moins en moins, en la considerant comme faite par voye de

de soustraction, m'a donné moi-même de résoudre la plus grande difficulté qu'on puisse, comme je croi, faire sur cela, & m'avoit fait croire que ce n'étoit que par accident, que moins par moins donnoit plus. C'est que je ne pouvois ajuster à cette sorte de multiplication, la notion la plus naturelle de la multiplication en general; qui est, quel unité (où déterminée dans les nombres; ou arbitraire comme dans l'étendue) doit être au multipliant, comme le multiplié est au produit. Car cela est visiblement faux dans la multiplication de moins en moins; puisqu'il ne peut être vrai que l'unité soit à — 5, comme — 3 est à + 15; parce qu'il faudroit pour cela que le second terme étant plus petit que le 1.^{er} le 4.^e fût aussi plus petit que le 3.^e au lieu qu'il est beaucoup plus grand. Je ne voi point d'autre réponse à cela que de dire que la multiplication de moins par moins se faisant par voie de soustraction, au lieu que toutes les autres se font par voie d'addition: il n'est pas étrange que la notion des multiplications ordinaires ne convienne pas à cette sorte de multiplication qui est d'une autre genre que les autres, sans qu'il soit besoin d'en excepter la multiplication des fractions, comme de $\frac{2}{3}$ par $\frac{5}{7}$. Car en quoi celle-là est différente de celle des entiers, c'est que pour avoir le produit, il faut faire deux multiplications, celle du 1.^{er} Numérateur par le 2.^e ce qui donne 10 pour numérateur du produit, & celle du 1.^{er} dénominateur par le 2.^e, ce qui donne 21 pour le dénominateur du produit. Mais l'une & l'autre se fait par voie d'addition; car on prend le 2.^e numérateur autant de fois qu'il y a d'unités dans le premier; c'est à dire qu'on prend 5 deux fois, ce qui fait 10. Et on prend aussi le 2.^e dénominateur autant de fois qu'il y a d'unités dans le premier; c'est à dire qu'on prend 7 trois fois, ce qui fait 21. Et c'est par là qu'il arrive que l'unité, ou $\frac{3}{3}$, est à $\frac{2}{3}$: comme $\frac{5}{7}$ est à $\frac{10}{21}$.

COROL-

10 NOUVEAUX ELEMENS

COROLLAIRE DE LA TROISIÈME REGLE.

111. C'EST sur la 3.^e règle qu'est fondée une invention fort aisée de trouver les multiplications des nombres depuis 5 jusqu'à 10.

Il ne faut que baisser les 10 doigts, puis relever d'une main autant de doigts qu'il s'en faut que l'un des nombres qu'on veut multiplier n'aille jusqu'à 10 ; comme si ce nombre est 8, en relever 2, & de l'autre de même autant qu'il s'en faut que l'autre nombre n'aille jusqu'à dix ; comme si ce nombre est 7, en relever 3 : cela fait, il faut compter autant de dizaines qu'il y a de doigts baissés, & multiplier les doigts levez d'une main par ceux de l'autre, en ne les prenant que pour des unités, & on aura le nombre qu'il faut. La raison de cela est qu'on ne fait en cela que multiplier

$$\begin{array}{r} 10. \overline{\quad} 2. \\ \text{par} \quad \text{X} \\ 10. \overline{\quad} 3. \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} 10. \overline{\quad} 2. \\ \text{par} \quad \text{X} \\ 10. \overline{\quad} 3. \end{array}} \right\} 100 - 20 - 30 = 6. \text{ somme } 56.$$

Car en baissant les doigts, on fait la première multiplication partielle qui donne dix dizaines.

En levant deux doigts d'une main on fait ce que doit faire la seconde multiplication partielle, qui est de + 10. par — 2, ce qui donne — 20 : car en levant deux doigts on ôte deux dizaines.

En levant 3 doigts de l'autre main on fait encore ce que doit faire la troisième multiplication partielle, qui est de + 10 par — 3, ce qui donne — 30 : car en levant 3 doigts on ôte trois dizaines.

Et enfin en multipliant les doigts levez d'une main par ceux de l'autre, on multiplie — 2 par — 3, ce qui donne + 6 par la raison que nous avons dite.

Qua-

QUATRIÈME REGLE.

QUAND les termes se trouvent avec des nombres, il faut multiplier les nombres, par les nombres, & les termes par les termes pour en avoir les multiplications partiales, en gardant les regles precedentes pour ce qui est des *plus* & des *moins*.

LX.

$$\left. \begin{array}{l} 3b \\ 5d \end{array} \right\} 15bd. \quad \left. \begin{array}{l} 3b \\ d \end{array} \right\} 3bd.$$

$$\left. \begin{array}{l} 3b + 2d \\ 4p + 3q \end{array} \right\} 12bp + 8pd + 9bq + 6dq.$$

DIVISION.

Elle n'a rien de particulier, sinon lorsque l'une des grandeurs incomplexes du *diviseur* se trouve dans toutes les grandeurs incomplexes du *dividende*; Car alors il la faudra effacer dans le diviseur & dans toutes les grandeurs incomplexes du *dividende*.

LXI.

Exemple $\frac{ba+ca+da}{fa}$ le quotient plus abrégé sera $\frac{b+c+d}{f}$

AVERTISSEMENT.

Comme ces 4 operations sur les grandeurs complexes marquées par lettres, sont une espece de jargon qui embarrasse quand on n'y est pas accoutumé: il est utile d'en proposer plusieurs exemples, où on observera les regles qu'on a données aux nombres 42, 43, 44.

EXEMPLES DE L'ADDITION.
SOMMES.

$$\begin{array}{l} A \\ \text{Ajouter } c \end{array} \left. \begin{array}{l} b + e \\ \end{array} \right\} b + 2c.$$

A

22 NOUVEAUX ELEMENTS

$$\begin{array}{l}
 A \quad b + d \} \\
 \text{Ajouter } b + c \} \quad 2b + d + c, \\
 A \quad b - c \} \\
 \text{Ajouter } d + c \} \quad b + d. \\
 A \quad b - c + d \} \\
 \text{Ajouter } d + c + g \} \quad b + 2d + g. \\
 A \quad -b + c - m \} \\
 \text{Ajouter } d - m - c \} \quad d - b - 2m. \\
 A \quad b + 7a \} \\
 \text{Ajouter } -9a \} \quad b - 2a. \\
 A \quad b + 7a \} \\
 \text{Ajouter } +9a \} \quad b + 16a. \\
 A \quad b + 9a \} \\
 \text{Ajouter } b - 7a \} \quad 2b + 2a.
 \end{array}$$

EXEMPLES DE LA SOUSTRACTION. RESTES.

$$\begin{array}{l}
 \text{De } b + d \} \\
 \text{Oster } b - m \} \quad d + m. \\
 \text{De } b + d \} \\
 \text{Oster } -c \} \quad b + d + c. \\
 \text{De } b + d \} \\
 \text{Oster } c + d \} \quad b - c. \\
 \text{De } s - o \} \\
 \text{Oster } s - a \} \quad -o + a \text{ (ou) } a - o. \\
 \text{De } b + c - d \} \\
 \text{Oster } b + m + d \} \quad c - m - 2d. \\
 \text{De } bb + cc + cb \} \\
 \text{Oster } bb + cc - cb \} \quad 2cb. \\
 \text{De } b + d \} \\
 \text{Oster } b - d \} \quad 2d. \\
 \text{De } b + 7a \} \\
 \text{Oster } +9a \} \quad b - 2a. \\
 \text{De } b + 9a \} \\
 \text{Oster } b - 7a \} \quad +16a.
 \end{array}$$

De

$$\begin{array}{l} \text{De } d + b \\ \text{Oster } b + d \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} d + b \\ b + d \end{array}} \right\} 0.$$

EXEMPLES DE LA MULTIPLICATION.
PRODUITS

$$\begin{array}{l} \text{Par } b + c \\ \text{Mult. } b + c \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} b + c \\ b + c \end{array}} \right\} bb + cc + 2bc.$$

$$\begin{array}{l} \text{Par } b - c \\ \text{Mult. } b - c \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} b - c \\ b - c \end{array}} \right\} bb - cc.$$

$$\begin{array}{l} \text{Par } b - c \\ \text{Mult. } b + c \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} b - c \\ b + c \end{array}} \right\} bb + cc - 2bc.$$

$$\begin{array}{l} \text{Par } b + c + d \\ \text{Mult. } m \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} b + c + d \\ m \end{array}} \right\} bm + cm + dm.$$

$$\begin{array}{l} \text{Par } b + c + d \\ \text{Mult. } b \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} b + c + d \\ b \end{array}} \right\} bb + bc + bd.$$

$$\begin{array}{l} \text{Par } b + c - d \\ \text{Mult. } b - c \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} b + c - d \\ b - c \end{array}} \right\} bb - cc - bd + cd.$$

$$\begin{array}{l} \text{Par } b + c - d \\ \text{Mult. } b - c + d \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} b + c - d \\ b - c + d \end{array}} \right\} bb - cc - dd + 2dc.$$

EXEMPLES DE LA DIVISION.
QUOTIENTS.

$$\begin{array}{l} \text{Dividende } bbcc \\ \text{Diviseur } cc \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} bbcc \\ cc \end{array}} \right\} bb.$$

$$\begin{array}{l} \text{Divid. } bcd \\ \text{Diviseur } cf \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} bcd \\ cf \end{array}} \right\} bd.$$

$$\begin{array}{l} \text{Divid. } ba + ca + da \\ \text{Diviseur } b + c + d \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} ba + ca + da \\ b + c + d \end{array}} \right\} a.$$

$$\begin{array}{l} \text{Divid. } bb - aa \\ \text{Diviseur } b - a \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} bb - aa \\ b - a \end{array}} \right\} b + a.$$

$$\begin{array}{l} \text{Divid. } ba + ca + da \\ \text{Diviseur } a \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} ba + ca + da \\ a \end{array}} \right\} b + c + d.$$

$$\begin{array}{l} \text{Divid. } bb + aa + 2ba \\ \text{Diviseur } b + a \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} bb + aa + 2ba \\ b + a \end{array}} \right\} b + a.$$

Di-

Divid. $b \overline{b-a} a$ } $b-a$.
 Diviseur. $b-a$

DES EQUATIONS.

EXII. TOUTE égalité entre deux grandeurs se peut appeller *équation* : mais pour l'ordinaire on donne ce nom à l'égalité de deux grandeurs complexes, comme $b p + f g = m n + f t$.

Ou au moins dont l'une est complexe, comme $b + c = d$.

Chacune de ces grandeurs égales peut être appelée *membre de l'équation*.

EXIII. IL est souvent très-utile de trouver des équations, & l'un des plus grands secrets pour les trouver est de pouvoir donner à une même grandeur diverses dénominations ; parce que souvent une dénomination en fait voir l'égalité avec une autre grandeur qu'une autre dénomination n'auroit pas fait voir.

Ainsi aiant une grandeur comme b partagée en deux portions, comme c & d , on peut nommer chaque portion ou par son propre caractère, comme c , ou par le caractère du tout moins l'autre partie. Car il est bien visible que b étant égal à $c + d$ chaque partie est égale au tout moins l'autre partie, & qu'ainsi $c = b - d$. Et $d = b - c$.

Or il y a beaucoup de rencontres où il est plus avantageux de nommer une partie du nom du tout moins l'autre partie que de luy donner un nom propre. Comme au contraire il est quelquefois plus utile de donner un nom propre à ce qui est marqué par une grandeur moins quelque chose.

THEOREME.

EXIV. LA plus importante observation touchant les Equations est celle-cy :

On

On peut transférer chaque terme d'un des membres d'une équation en l'autre sans en troubler l'égalité, pourveu qu'on en change les signes, c'est à dire que l'ôtant d'un des membres où il étoit avec *plus*, on le mette dans l'autre avec *moins* ou au contraire. Par exemple,

$$b + d = f.$$

Je puis transporter *d* en l'autre membre en changeant de signe & mettant

$$b = f - d.$$

Et si au contraire on avoit.

$$b - d = g.$$

On pourroit mettre.

$$b = g + d.$$

Que si on transportoit tous les termes d'un membre dans l'autre membre en les changeant chacun de signe, le membre où on auroit transporté tous les signes seroit égal à rien, comme seroit celui d'où on les auroit transportez. Car si

$$b + d - f = p + q - r.$$

$$b + d - f - p - q + r = \text{à zero.}$$

Et si on ne laisse d'un côté qu'un terme avec un *moins*, cela fera que le membre où on aura transporté les autres termes sera égal à zero moins ce terme-là.

$$b + d = f - g.$$

$$b + d - f = -g.$$

C'est à dire sera moins que rien. Ce qui semble impossible à concevoir, quoi que cela ne soit pas sans exemple dans le langage commun, puis qu'on dit d'un homme endetté qu'il s'en faut vingt mille écus qu'il n'ait un sou :

La raison de tout cela n'est autre que les deux maximes de l'égalité :

Si à grandeurs égales on en ajoute d'égales, les tous seront égaux.

Si de grandeurs égales on en ôte d'égales, les restes seront égaux.

B

Car

Car si $b - d = g$.

En ajoutant d de côté & d'autre ils demeureront égaux.

Or pour ajouter d au membre où il est avec *moins*, je n'ay qu'à le retrancher ; puis qu'aussi bien si je l'avois ajouté en disant,

$$b - d + d.$$

$-d$ & $+d$. ne feroient rien par le 4.^e principe.

Et pour ajouter d à l'autre membre où il n'est point du tout, il faut que je l'y mette avec *plus* en disant $g + d$.

Et par conséquent ce transport d'un terme d'un membre en un autre en changeant le *moins* en *plus* ne fait qu'ajouter choses égales à choses égales, ce qui ne trouble point l'égalité.

Et si j'avois $b + d = f$.

En retranchant d de côté & d'autre ils demeureront égaux.

Or pour retrancher d du membre où il est avec un *plus* je n'ay qu'à l'oster tout à fait, puis qu'on ne peut pas mieux le retrancher qu'en le supprimant.

Et pour le retrancher du membre où il n'étoit point du tout, il faut l'y mettre avec un *moins*, en disant $f - d$.

Et par conséquent ce transport d'un terme d'un membre à un autre en changeant le *plus* en *moins*, ne fait qu'oster choses égales de choses égales, ce qui ne trouble point l'égalité.

EXEMPLES.

DE LA SOLUTION D'UN PROBLÈME PAR EQUATIONS.

LXVI. ON feint qu'une Mule allant avec une Asnesse se plaignoit d'être trop chargée, & que la Mule lui dit ; Si je t'avois donné un de mes sacs, nous en aurions

au.

DE GEOMETRIE. LIV. I. 27

autant l'une que l'autre : & si tu m'en avois donné un des tiens, j'en aurois le double de toy.

On demande combien chacune portoit de sacs. Et on le trouve ainsi.

Le nombre inconnu des sacs de la Mule soit appelé A . & de l'Asne B .

Par la premiere hypothese

$$A - 1 = B + 1.$$

Donc ajoutant 1 de part & d'autre

$$A = B + 2.$$

Par l'autre hypothese.

$A + 1$ est égal à deux fois $B - 1$, c'est à dire à $2B - 2$.

Donc en mettant au lieu d' A , $B + 2$ qui lui est égal:

$$B + 3 = 2B - 2.$$

Donc ajoutant 2 de part & d'autre

$$B + 5 = 2B.$$

Donc ôtant un B de part & d'autre

$$5 = B.$$

C'est à dire que B , le nombre des sacs de l'Asne, est 5, & 7 celui des sacs de la Mule.

SECOND EXEMPLE.

AYANT rencontré des pauvres & leur voulant LXXVII.
donner à chacun 5 sols, j'ai trouvé que j'en avois un de trop peu. Et ainsi ne leur ayant donné qu'à chacun 4, il m'en est resté 6. Combien y avoit-il de pauvres, & combien avois-je de sols?

Soit le nombre des pauvres appelé A .

Par l'hypothese

$$5A - 1 = 4A + 6.$$

Donc ajoutant 1 de part & d'autre

$$5A = 4A + 7.$$

Donc ôtant $4A$ de part & d'autre

Donc il y avoit 7 pauvres. Et j'avois 34 sols.

TROISIÈME EXEMPLE.

LXVIII. N'AIANT que des Carolus de 10 derniers & des pièces de 3 blancs de 15 derniers, faire 20 sols en 20 pièces.

Soient appelez le sol A .

Le Carolus $B \equiv A - 2$ den.

La pièce de trois blancs $C \equiv A + 3$ den.

Multipliant B par la différence de C à A , c'est à dire prenant 3 B ; & C par la différence de B à A , c'est à dire prenant 2 C :

Je dis que 3 $B + 2 C$ valent 5 A .

Car 3 $B \equiv 3 A - 6$ den.

Et 2 $C \equiv 2 A + 6$ den.

Or plus & moins valent zero. Donc, &c.

Or 4 fois 5 valent 20.

Donc 4 fois 3 B , c'est à dire 12 B , & 4 fois 2 C , c'est à dire 8 C valent 20 A . Ce que l'on cherche.

Cette équation est le fondement d'une regle d'Arithmetique qu'on appelle la regle d'alliage.





NOUVEAUX ELEMENS DE GEOMETRIE.

LIVRE SECOND.

DE LA RAISON ET PRO- PORTION GEOMETRI- QUES.

RIEN n'a jamais été moins bien éclair-
ci dans toute la Geometrie, que la na-
ture de ce qu'on appelle Raison : &
l'Auteur de ces Elemens n'a jamais été
fort satisfait de ce qu'il en a dit dans la
premiere Edition de ce Livre. Mais un Gentilhomme
Flamand nommé M. de Nonancourt, qui a beaucoup
de lumieres, non seulement dans ces sortes de Scien-
ces, mais aussi dans la Philosophie & dans la Theo-
logie, lui ayant fait voir un petit Traité Latin intitulé
Euclides Logisticus, seu de Ratione Euclidæ; il
avoue que cela lui a ouvert les yeux, & lui a fait

30 NOUVEAUX ELEMENS

concevoir des Notions beaucoup plus nettes touchant cette Matière, qu'il n'en avoit auparavant : & c'est pourquoi on trouvera que ce second Livre & le troisième sont presque tous changez.

PLAN GENERAL

DES PROPORTIONS.

ON peut comparer ensemble deux grandeurs en deux différentes manieres.

L'UN est, en considerant de combien l'une surpasse l'autre quand elles sont inégales, ce qui s'appelle *Difference* : comme si je dis que 2 est la difference de 7 à 5.

L'AUTRE est, en considerant un autre rapport qui s'appelle *Raison*, que nous expliquerons plus bas.

QU' si deux grandeurs ont entr'elles ou même difference, on même raison que deux autres, cela s'appelle *Proportion* ; mais quand c'est une égalité de difference, cela s'appelle *Proportion Arithmetique*.

ET quand c'est une égalité de Raisons, *Proportion Geometrique*.

MAIS parce qu'on n'a point d'égard dans la Geometrie à la Proportion Arithmetique, & que quand on parle absolument de Proportion on entend toujours la *Geometrique*, cest à celle-là que nous nous arrêterons ; & nous tâcherons d'expliquer plus clairement que l'on ne fait d'ordinaire ce que c'est que Raison, qui est le fondement de la Proportion Geometrique.

SECTION PREMIERE.

DE LA RAISON.

DEFINITIONS.

LA quantité relative d'une grandeur comparée à une autre, est ce qu'on appelle *Raison*.

LA quantité relative de 12 à 8, est la *Raison* de 12 à 8.

DE B à C, est la *Raison* de B à C.

LA *Raison* que l'on compare s'appelle *antecedent*, & celle avec qui on la compare, *consequent*.

Remarques pour mieux faire comprendre la nature de la Raison.

QUAND on considère une grandeur seule, on n'y considère que sa grandeur absolue : ainsi en comptant tous les Soldats d'une Armée de 10000 hommes, en y trouvant 10000, je dis que c'est une Armée de 10000 hommes : Mais si je compare cette Armée avec une autre de 100000 ou de 4000, la notion de sa grandeur change ; car je la trouve petite comparée avec la première, & grande comparée avec la seconde. Or c'est ce que j'appelle *Quantité relative*, en quoi consiste ce que les Geomètres appellent *Raison*.

QUOI que toute *Raison* demande deux termes, néanmoins la *Quantité relative* en quoi la *raison* consiste, convient proprement à l'*antecedent*, & non pas au *consequent* ; comme encore que la Paternité suppose le Pere & le Fils, néanmoins elle ne convient qu'au Pere, & non au Fils ; & la Filiation ne convient qu'au Fils, & non au Pere.

COMME la *Raison* est une quantité, quoi que relative, toutes les propriétés de la quantité lui conviennent ; c'est pourquoi une *raison* est égale, ou plus grande, ou plus petite qu'une autre *raison*.

32 NOUVEAUX ELEMENS.

2 V.

RIEN ne peut mieux faire comprendre ce que c'est que Raison, que les fractions ou nombres rompus, qui se marquent par deux chiffres, avec une ligne entre-deux, dont le plus haut, qui s'appelle *numérateur*, est comme l'antecedent; & le plus bas, qui s'appelle *dénominateur*, est comme le consequent: car les nombres entiers signifient une quantité absolüe, en ce que 3, par exemple, signifie trois unitez, 4 quatre unitez, &c. au lieu que dans les fractions le numérateur ne signifie que par rapport au dénominateur; de sorte que si de trois fractions qui ont toutes le nombre 2 pour numérateur, on en cache le dénominateur, on ne sçait ce que ce 2 veut dire; mais si on le découvre, & que ce soient $\frac{2}{3}, \frac{2}{5}, \frac{2}{7}$ dans la première il signifiera deux tiers, dans la seconde deux cinquièmes, dans la troisième deux septièmes; & il faut remarquer que plus ce dénominateur est un petit nombre, plus la fraction est grande, & au contraire; car au lieu que 3 est un moindre nombre que 5, & 5 que 7, deux tiers est plus que deux cinquièmes, & deux cinquièmes plus que deux septièmes; ce que nous dirons dans la suite être la même chose dans les Raisons; celles qui ont un même antecedent & divers consequens étant d'autant plus grandes que leur consequent est plus petit.

PREMIÈRE DIVISION.

V.

TOUTE Raison est d'*égalité* ou d'*inégalité*. On appelle Raison d'*égalité*, quand l'antecedent est égal au consequent, comme la Raison de B à B, de 12 à 12, d'1 à 1; d'*inégalité*, quand l'antecedent est plus grand ou plus petit que le consequent, comme la Raison de 12 à 8, ou de 8 à 12.

AVERTISSEMENT.

V I.

Il ne faut pas confondre la Raison d'égalité avec l'égalité

DE GEOMETRIE. LIV. II. 33

l'égalité des Raisons ; car deux Raisons peuvent être égales entr'elles , quoi que chacune soit une Raison d'inégalité.

SECONDE DIVISION.

LA Raison d'inégalité se divise encore en celle qu'on appelle *Raison de nombre à nombre*, & celle qu'on appelle *Raison sourde*.

VII.

ON dit que deux grandeurs ont entr'elles une Raison de nombre à nombre, ou quand l'une est précisément contenuë tant de fois dans l'autre ; comme la Raison du pied à la toise, la Raison de 4 à 12 ; ou au moins, quand quelques aliquotes de l'antecedent sont précisément un certain nombr. de fois dans le consequent, comme la raison d'une aulne à une toise ; parce que le pouce, qui est la 44.^e partie d'une aulne, est 72 fois dans la toise.

QUAND les grandeurs ont entr'elles une raison de nombre à nombre, on dit qu'elles sont *commensurables* ; parce qu'elles ont quelque partie qui peut servir de commune mesure à l'une & à l'autre.

C'EST ce qui convient à tous les nombres qui ont tous au moins l'unité pour mesure commune.

ET c'est aussi ce qui a fait que l'on appelle cette raison *de nombre à nombre*.

ET le plus court aussi est d'exprimer ces raisons par les moindres nombres qui en ont une semblable, comme de dire que l'aulne est à la toise comme 44 à 72 ; c'est à dire comme 11 à 18.

LA Raison sourde, qui est opposée à celle-là, est quand deux grandeurs ont une certaine Raison entre elles, qui ne peut être marquée par aucun nombre ; parce que chacune aiant des parties aliquotes de plus petites en plus petites, à l'infini : Il ne peut néanmoins arriver qu'aucune, quelque petite qu'on la prenne, mesure justement l'autre grandeur, c'est à dire qu'elle y soit précisément,

B 5,

mais.

34 NOUVEAUX ELEMENS

mais il y aura toujours quelque reste plus petit que cette aliquote.

Cela paroît d'abord incroyable, & néanmoins il y a démonstration qu'il y a des lignes qui sont incommensurables à d'autres lignes, comme le côté du quarré à la diagonale.

DE LA COMPOSITION DES RAISONS.

VIII. COMME la Raison est une quantité ou grandeur, quoi que relative : tout ce qui convient à la quantité ou grandeur en general convient aussi à la Raison.

Et ainsi comme deux grandeurs peuvent être comparées ensemble, deux raisons le peuvent être aussi ; & alors, comme il y a quatre termes dans cette comparaison : le premier & le quatrième, qui sont l'antecedent de la premiere Raison & le consequent de la deuxième, s'appellent *extrêmes* ; & le deuxième & le troisième qui sont le consequent de la premiere Raison & l'antecedent de la seconde, s'appellent *moyens*.

Quoiqu'il y ait plusieurs Raisons, si le consequent de la precedente est toujours le même que l'antecedent de la suivante : ces Raisons peuvent être appellées *continues*.

Mais ce qu'il y a de plus remarquable dans cette comparaison de Raisons, est, que comme une grandeur comparée à une autre lui est égale ou inégale, & quand elle est inégale qu'elle est plus grande ou plus petite : Il faut aussi qu'une Raison comparée à une autre lui soit égale ou inégale ; & quand elle est inégale qu'elle lui soit plus grande ou plus petite.

Et comme c'est dans cette comparaison de deux grandeurs que consiste la Raison d'égalité ou d'inégalité : il est clair encore, que deux Raisons étant comparées ensemble, en sorte que l'une soit l'antecedent

cedent & l'autre le consequent de cette comparai-
son, elles ont entr'elles une nouvelle Raison, ou
d'égalité si elles sont égales, ou d'inégalité si elles
sont inégales.

OR quand c'est la Raison d'égalité qui est en-
tre deux Raisons, c'est à dire quand deux Rai-
sons sont égales, cela s'appelle *Proportion*, ou *Pro-
portion Geometrique* :

DEFINITION

DE LA PROPORTION GEOMETRIQUE.

AINSI ce qu'on entend par la *Proportion Geome-
trique*, ou par le mot de *Proportion* quand on n'y
ajoute rien, n'est autre chose que l'égalité de deux
Raisons; qui consiste en ce que la quantité relative
d'un antecédent comparé à son consequent, est éga-
le à la quantité relative d'un autre antecédent com-
paré aussi à son consequent.

IX.

LA Proportion s'explique en diverses manieres,
c'est à dire qu'il y a diverses façons de parler pour
signifier que quatre grandeurs, comme B, C, F, G,
sont proportionnelles. On dit premierement que
la premiere est à la seconde comme la troisième
à la quatrième; que B est à C, comme F à G.

2. Que la raison de la premiere à la seconde est
égale à la Raison de la troisième à la quatrième.

3. Que la premiere a la même Raison à la secon-
de, que la troisième à la quatrième; & pour abré-
ger on se sert de quatre points :: entre les deux Rai-
sons B, C :: F, G.

DÉFINITION.

NOUS avons déjà dit que comparant ensemble
deux Raisons, l'antecédent de la premiere & le con-
sequent de la seconde s'appellent *extremes*; & l'an-
tecedent de la seconde & le consequent de la premie-

X.

re les moyens : Mais dans les Raisons égales les extremes & les moyens sont dits être reciproques les uns aux autres ; c'est à dire que le premier & le quatrième terme sont reciproques au deuxième & au troisième.

AVERTISSEMENT.

XI.

Nous avons déjà dit que la Raison étant une quantité, quoi que relative, comme deux grandeurs étant comparées l'une à l'autre font une Raison, on peut aussi comparer deux Raisons l'une à l'autre, comme la Raison B à X, à la Raison C à X, & considérer quelles Raisons elles ont entr'elles ; & alors la première Raison (qui a son antecédent & son conséquent) n'est que l'antécédent de cette nouvelle Raison que l'on cherche entre ces deux Raisons, & la seconde Raison en est le conséquent ; & que pour mieux marquer il semble alors à propos de mettre les conséquens de ces Raisons que l'on compare au-dessous de leurs antécédens, avec une petite ligne entre deux, comme on fait dans les Fractions en cette manière :

$$\frac{B}{X}, \frac{C}{X}.$$

Or cela étant ainsi, ces deux Raisons considérées en cette manière peuvent être les deux premiers termes d'une proportion, dont les deux derniers seront ou deux grandeurs absolues, comme si je dis, la Raison de B à X est à la Raison de C à X, comme B est à C :

$$\frac{B}{X}, \frac{C}{X} :: B, C:$$

ou deux autres Raisons, comme si je dis, la Raison d'X à X est à la Raison de B à X, comme la Raison d'X à C, est la Raison de B à C.

X

$$\frac{X}{X}, \frac{B}{X} :: \frac{X}{C}, \frac{B}{C}.$$

PROPORTIONS,

OU RAISONS ÉGALES NATURELLE- MENT CONNUES.

ON ne sçauroit mieux faire comprendre ce que c'est que proportion ou égalité de Raisons, que par des exemples de proportions naturellement connues, qui serviront aussi de principes pour connoître celles qui ne se discernent pas si facilement. XII.

I.
TOUTES les Raisons d'égalité sont égales entr'elles; la Raison de B à B est égale à la Raison de C à C, la Raison d'1 à 1 est égale à la Raison de 3 à 3. XIII.

II.
LA Raison d'une grandeur à son multiple quelconque, est égale à la raison d'une autre grandeur à son équimultiple. La Raison de B au triple de B, est égale à la Raison de C au triple de C. XIV.

La Raison de 2 au triple de 2 (qui est 6) est égale à la Raison de 5 au triple de 5 (qui est 15).

III.
LA Raison d'une grandeur à une autre grandeur est égale à la Raison de leur équimultiple. XV.

La Raison de B à C est égale à la Raison du triple de B au triple de C.

La Raison de 2 à 5 est égale à la Raison de 6 triple de 2 à 15 triple de 5.

IV.
LA Raison des multiples differents de la même grandeur est égale à la Raison des multiples d'une autre XVI.

B 7

autre

38 NOUVEAUX ELEMENS

autre grandeur pareils aux premiers, chacun à chacun & dans le même ordre.

La Raison de 3 B à 5 B, est égale à la Raison de 3 C à 5 C.

V.

La Raison des multiples pareils de deux grandeurs, est égale à la Raison d'autres multiples pareils des mêmes grandeurs.

La Raison de 3 B à 3 C, est égale à la Raison de 5 B à 5 C.

AVERTISSEMENT.

- XVII. *Tout ce qu'on vient de dire des multiples se peut dire aussi des aliquotes n'étant que la même chose sous un autre nom ; car toute grandeur est multiple de ses aliquotes, & aliquote de ses multiples.*

DEFINITION. DIVISION.

- XVIII. La Proportion est ou *discrete*, ou *continue* : On l'appelle *discrete* quand le conséquent de la première Raison est différent de l'antécédent de la seconde, comme dans tous les exemples qu'on a rapportés. B, C. :: F, G.

On l'appelle *continue* quand la même grandeur qui est le conséquent de la première Raison est l'antécédent de la seconde : comme si je disois B est à C, comme C, est à D. B. C. :: C. D. ; ce qu'il se peut aussi marquer ainsi \therefore B. C. D.

DEFINITION.

- XIX. Cette proportion continue s'appelle *Progression*, quand y ayant plusieurs raisons égales de suite, le conséquent de la précédente est toujours l'antécédent de la suivante, comme B est à C, comme C à D, comme D à F, comme F à G, &c. Ce qui se marque ainsi \therefore B. C. D. F. G.

L.

I. AXIÔME.

LA Raïson d'un antecedent à un consequent , a pour parties les Raïsons de chaque partie de l'antecedent à ce même consequent ; & cette raïson est égale à toutes les raïsons partiales prises ensemble de l'antecedent au même consequent. Soit la grandeur T , divisée en plusieurs parties égales , ou inégales , comme M, P, Q; si on compare T à quelque autre quantité comme O , en sorte que T soit l'antecedent , & O le consequent : La raïson de T à O , a pour parties les raïsons de M à O , de P à O , de Q à O , & leur est égale. xx.

$$\frac{T}{O} = \frac{M}{O} + \frac{P}{O} + \frac{Q}{O}.$$

CAR T valant $M + P + Q$, il est visible que $\frac{T}{O}$ est égale à $\frac{M + P + Q}{O}$.

Remarquez que je dis que la Raïson $\frac{T}{O}$ a pour parties les raïsons $\frac{M}{O}, \frac{P}{O}, \frac{Q}{O}$, & non pas qu'elle en est composée , ce qui signifie tout autre chose , comme on verra dans la suite.

II. AXIÔME.

LA Raïson d'un antecedent à un consequent , est égale à la Raïson d'un autre antecedent moindre que le premier au même consequent , plus la Raïson de la grandeur dont un antecedent surpasse l'autre au consequent. Et ainsi la Raïson du plus grand antecedent au consequent est plus grande que la Raïson du plus petit antecedent à ce même consequent. xxi.

C'est une suite de l'Axiôme precedent.

CAR la Raïson du grand antecedent au consequent , a pour parties la Raïson du petit antecedent au xxii.

au

40 NOUVEAUX ELEMENS

au conséquent plus la Raison de la quantité, dont le grand antecédent surpasse le plus petit, à ce même conséquent, & elle leur est égale.

Cette quantité dont une grandeur en surpasse une autre, s'appelle la *différence* qui est entre ces deux grandeurs. Soit B plus grand que C, & la différence de B à C, soit appelée X: en sorte que $C + X$, soit égal à B. $\frac{D}{B}$ est égal à $\frac{C}{D} + \frac{X}{D}$.

1 $\frac{B}{D}$

III. AXIÔME.

XXIII. LA Raison de l'antecedent à une partie du conséquent est plus grande que la raison du même antecédent à tout le conséquent; & ainsi la raison d'un antecédent à un conséquent est une plus grande raison que celle du même antecédent à un autre conséquent plus grand que le premier.

La Raison de B à X partie de D est plus grande que la Raison de B à D; & de même si X est plus petit que Y, la Raison de B à X, sera plus grande que celle de B à Y.

IV. AXIÔME.

XXIV. LES Raisons qui ont un même conséquent sont entr'elles comme leurs antecédens, $\frac{B}{X} : \frac{C}{X} :: B : C$.

C'est une suite du 2.^e Axiôme; car si deux antecédens étant comparez à un même conséquent, la Raison du plus grand antecédent est plus grande que celle du plus petit: il faut que ces raisons soient entr'elles comme les antecédens.

V. AXIÔME.

XXV. LES Raisons qui ont un même antecédent sont entr'elles comme leurs conséquens dans un ordre réciproque ou renversé, c'est à dire que la première est

DE GEOMETRIE. LIV. II. 41

est à la seconde, comme le conséquent de la seconde est au conséquent de la première $\frac{B}{C} :: \frac{A}{E}$: : C, B.

C'est la suite du troisième Axiôme ; car si comparant le même antecédent à differens conséquens, la Raison de cet antecédent à chaque conséquent est plus grande quand le conséquent est plus petit, & plus petite quand le conséquent est plus grand : il est clair que ces raisons doivent être entr'elles comme les conséquens dans un ordre renversé ; puisque si le conséquent de la première est plus grand que le conséquent de la seconde : la première sera plus petite que la seconde, comme le conséquent de la seconde est plus petit que le conséquent de la première.

VI. AXIÔME.

Si deux raisons sont égales à une même raison : **XXVII.**
elles sont égales entr'elles.

B. C. : :
F. G. : : M. N.

Donc B. C. : : F. G.

Et c'est la même chose que si deux raisons étant égales à deux autres raisons chacune à chacune, elles sont égales entr'elles ; si les Raisons I & O étant supposées égales, la Raison A est égale à la Raison I, & la Raison E, égale à la Raison O : A & E seront égales entr'elles.

COROLLAIRE.

Quand plusieurs proportions discrètes consé- **XXVII.**
crées ensemble, sont telles que les deux derniers termes de la précédente sont toujours les deux premiers termes de la suivante : elles peuvent être appelées *continues* en leur manière, ou *discretement continues* ; & alors il est clair que toutes ces raisons de ces diverses proportions sont égales, & qu'ainsi
l'on

42 NOUVEAUX ELEMENS

l'on peut toujours conclure que les deux premiers termes sont entr'eux comme les deux derniers, ce qui serad un grand abregement dans la suite. Exemples dans les nombres :

$$\frac{8}{12} \cdot \frac{15}{21} :: \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7} :: \frac{7}{2} \cdot \frac{5}{2} :: \frac{7}{5} \cdot \frac{3}{2}$$

Donc $\frac{8}{12} \cdot \frac{15}{21} :: \frac{7}{5} \cdot \frac{3}{2}$.

VII. AXIÔME.

XXVIII. Deux grandeurs sont égales lors qu'elles ont même Raison à une même grandeur, ou qu'une même grandeur a même Raison à chacune.

Si B. S. :: D. S.

Ou que S. B. :: S. D.

Donc B est égal à D.

Que si ce sont les grandeurs B & D qu'on suppose égales : elles auront même Raison à une même grandeur, & une même grandeur aura même Raison à chacune. Si B est égale à D : B. S. :: D. S. & S. B. :: S. D.

Le fondement de tout cela, est qu'il est clair qu'en matiere de Raison deux grandeurs égales & une même grandeur deux fois répétée font la même chose.

VIII. AXIÔME.

XXIX. Il peut y avoir trois sortes d'égalitez en 4 termes qui sont deux Raisons.

1. L'égalité des antecedens, qui font le 1.^{er} & le 3.^e des ces 4 termes. 2. L'égalité des consequens, qui font le 2.^d & le 4.^e 3. L'égalité des Raisons mêmes. Et deux de ces égalitez étant données donnent celle qui reste. Soient les 2 Raisons $\frac{B}{S}$ & $\frac{D}{T}$.

Preuve du 1.^{er} & 2.^d cas. Supposé que le 1.^{er} terme

me

DE GEOMETRIE. LIV. II. 43

me soit égal au 3.^e & le 2.^d au 4.^e B à D & S à T ; par ces hypothèses , & le septieme Axiôme , B.S::D.S::D.T ; donc par le v 1.^e Axiôme B.S::D.T.

Preuve du 1.^{er} & 3.^e cas. Supposé que $\frac{B}{S}$ soit égale à $\frac{D}{T}$ & B égal à D ; par ces hypothèses , & le vii.^e Axiôme B.S::D.T :: B.T donc par le vii.^e Axiôme S est égal à T.

C'est la même chose si on suppose que S est égal à T ; on en conclura de la même sorte que B sera égal à D ; ce qui fait le 2.^d & 3.^e cas.

COROLLAIRE.

Il en est de même des Raïsons que des Grandeurs ; xxx.
car 1. considerant ensemble 4 Raïsons , elles seront proportionnelles , si la 1.^{re} est égale à la 3.^e & la 2.^{de} à la 4.^e Ainsi parce que la Raïson de 2 à 3 , est égale à la Raïson de 4 à 6 , & la Raïson de 5 à 7 , égale à celle de 15 à 21 : $\frac{2}{3} :: \frac{4}{6} :: \frac{5}{7} :: \frac{15}{21}$.

2. Supposant que ces 4 Raïsons sont proportionnelles. Si la 1.^{re} est égale à la 3.^e la 2.^{de} le sera à la 4.^e & reciproquement si la 2.^{de} est supposée égale à la 4.^e la 1.^{re} le sera à la 3.^e

IX. AXIÔME.

Quand on a deux proportions , les 4 Raïsons xxxr.
de ces deux proportions sont proportionnelles. La 1.^{re} Raïson de la 1.^{re} Proportion étant à la 1.^{re} Raïson de la 2.^{de} Proportion , comme la 2.^{de} Raïson de la 1.^{re} Proportion est à la 2.^{de} Raïson de la dernière. Si B.C::F.G.& M.N::P.Q $\frac{B}{C} :: \frac{F}{G} :: \frac{M}{N} :: \frac{P}{Q}$.

Car la 1.^{re} Raïson $\frac{B}{C}$ est égale à la 3.^e $\frac{F}{G}$, par ce que ce sont les deux Raïsons de la 1.^{re} Proportion ; & la 2.^{de} est égale à la 4.^e par la même Raïson. Donc par le viii.^e Axiôme , il y a une nouvelle proportion entre ces 4 Raïsons.

X.

X. AXIÔME.

XXXII. ON ne change rien dans une proportion quand on ne fait qu'en transposer les raisons ; car deux choses égales demeureront toujours égales de quelque manière qu'on les dispose. Si donc
 $B. C. :: F. G.$ je dis qu'aussi
 $F. G. :: B. C.$

I. THEORÈME.

XXXIII. Deux Raisons sont égales quand toutes les Aliquotés pareilles de chaque antécédent sont également contenues dans son conséquent.

Soient 4 grandeurs B, C, F, G, & les Aliquotés quelconques de B soient appelées X, & les pareilles de F soient appelées Y. 1. Je dis que $B. C. :: F. G.$ si X & Y sont également contenues dans les conséquents C & G.

Mais cela peut être entendu en deux manières. La première est quand X est précisément autant de fois dans C qu'Y est dans G, & alors il n'y a aucune difficulté, & il suffit même d'avoir examiné une seule Aliquote pareille des antécédens ; car il est visible que si X [$\frac{1}{18}$ de B] est sept fois dans C, & Y [$\frac{1}{15}$ de F] 7 fois dans G. $B. C. :: F. G.$
 $10 X. 7 X. :: 10 Y. 7 Y.$

L'autre manière fait toute la difficulté ; c'est quand une Aliquote quelconque de B, que je nomme X, n'est jamais précisément tant de fois dans C, mais toujours avec quelque reste ; car alors l'Aliquote quelconque pareille de F ne peut être également contenuë dans G, que par ce qu'elle y fera autant de fois que X dans C, mais toujours avec quelque reste ; comme si X [$\frac{1}{18}$ de B] est dans C 7 fois plus R, & Y [$\frac{1}{15}$ de F] est aussi dans G sept fois plus R : je dis que quand on peut sçavoir que cela se trouvera
 gue,

DE GEOMETRIE. LIV. II. 45

généralement dans toutes les aliquotes pareilles des antécédens ; c'est à dire qu'elles seront toutes au moins en cette manière également contenues dans les conséquens : les Raisons $\frac{B}{C}$ & $\frac{F}{G}$ seront égales. Je ne sçai si on le peut mieux prouver qu'en cette manière :

Si les Raisons $\frac{B}{C}$ & $\frac{F}{G}$ n'étoient pas égales : dans cette supposition il faudroit que la première fust plus ou moins grande que la seconde ; & si elle étoit plus grande, en augmentant son conséquent de quelque chose on la diminueroit : & par là on la pourroit rendre égale à $\frac{F}{G}$; comme au contraire ; si elle étoit moins grande : on pourroit ajouter quelque chose au conséquent de la seconde, & par là rendant cette seconde moins grande, on pourroit encore faire que la première lui fust égale.

Or on ne sçauroit augmenter C de quoi que ce soit, qu'on ne rende la Raison $\frac{B}{C}$ plus petite qu'il ne faut pour être égale à $\frac{F}{G}$, ce que l'on peut prouver ainsi : ajoutant Z à C, quand Z ne seroit que la milliême partie de l'épaisseur d'un cheveu, je dis que la Raison $\frac{B}{C+Z}$ seroit plus petite qu'il ne faudroit pour être égale à $\frac{F}{G}$; car si l'on prend l'Aliquote X plus petite que Z, il est manifeste que X sera dans C + Z une fois plus que dans C : de sorte que si X est la $\frac{1}{10000}$ de B & qu'elle soit 8701 dans C, la même X [prise comme il a été dit plus petite que Z] sera dans C + Z, 8702 + R, au lieu que Y qui est aussi la $\frac{1}{10000}$ de F ne sera dans G que 8701 + R.

Or il est clair que la Raison de 10000 X à 8702 X plus R est plus petite que la Raison de 10000 Y à 8701 Y + R.

Donc on ne peut rien ajouter à C qu'on ne rende

46 NOUVEAUX ELEMENS

rende $\frac{B}{C+z}$ plus petite que $\frac{B}{C}$. Il est aisé de voir que l'on prouvera de la même sorte qu'on ne peut rien ajouter à $\frac{B}{C}$ que l'on ne rende la Raison $\frac{B}{C}$ plus grande que $\frac{F}{G}$.

Donc la Raison $\frac{B}{C}$ n'est ni plus ni moins grande que la Raison $\frac{F}{G}$.

Donc elle lui est égale.

II. THEOREME.

XXXIV. Si 4 grandeurs sont proportionnelles: elles le seront encore en les renversant; c'est à dire en comparant le premier consequent au premier antecedent, & le second consequent au 2. antecedent, le 2. terme au premier, le 4. au 3.^e, ce qui s'appelle *Permutando*. Si $B. C. :: F. G.$ je dis que $C. B. :: G. F.$; car $\frac{C}{C} \cdot \frac{B}{C} :: \frac{G}{G} \cdot \frac{F}{G}$, par le Corollaire du 8.^e Axiome, la seconde de ces Raisons étant égale à la 4.^e par l'hypothese, & la premiere & la 3.^e étant des Raisons d'égalité. Or les deux premieres Raisons aiant même consequent sont comme leurs antecedens par le 4.^e Axiome; & il en est de même des deux dernieres, qui ont aussi même consequent. Donc $C. B. :: G. F.$; ce qu'il falloit demontrer.

COROLLAIRE.

XXXV. Si 4 grandeurs sont proportionnelles, elles le seront encore en les prenant à rebours; c'est à dire que la 4.^e sera à la 3.^e comme la 2.^{de} à la 1.^{re} si $B. C. :: F. G.$ je dis que $G. F. :: C. B.$

Car par le precedent Theoreme, la 2.^{de} est à la 1.^{re} comme la 4.^e est à la 3.^e $C. B. :: G. F.$ Donc par le X.^e Axiome en transposant les Raisons, la 4.^e sera à la 3.^e comme la 2.^{de} à la 1.^{re} $G. F. :: C. B.$

Autrement: Par l'hypothese, les Raisons $\frac{F}{G}$ & $\frac{B}{C}$

& $\frac{B}{C}$ sont égales. Donc par le Coroll. du 8.^e Axiôme $\frac{G}{C} \cdot \frac{F}{C} :: \frac{C}{C} \cdot \frac{B}{C}$ donc par le 4.^e Axiôme $G. F. :: C. B.$

III. THEOREME.

Si 4 grandeurs sont proportionnelles, elles le seront encore en les prenant alternativement ; c'est à dire en comparant les antecedens ensemble, & les consequens ensemble, le 1.^{re} terme au 3.^e, & le 2.^d au 4.^e, ce qui s'appelle *Alternando*. Si $B. C. :: F. G.$ Je dis qu'*Alternando* $B. F. :: C. G.$; car $\frac{B}{C} \cdot \frac{F}{C} :: \frac{F}{C} \cdot \frac{F}{C}$, par le 8.^e Axiôme & son Corollaire ; La premiere & la 3.^e Raïson étant égales par l'hypothese ; & la 2.^{de} & la 4.^e étant la même. Or $\frac{B}{C} \cdot \frac{F}{C} :: B. F.$, par le 4.^e Axiôme, & $\frac{F}{C} \cdot \frac{F}{C} :: C. G.$, par le 4.^e Axiôme. Donc $B. F. :: C. G.$ par le 6.^e Axiôme ; ce qu'il falloit démontrer. XXVII.

COROLLAIRE.

XXXVII.

Si 4 grandeurs sont proportionnelles, elles le seront encore en transposant la premiere, & la 4.^e ; c'est à dire que la 4.^e sera à la seconde, comme la 3.^e à la 1.^{re}. si $B. C. :: F. G.$ je dis que $G. C. :: F. B.$; car par le precedent Theorème, la 1.^{re} est à la 3.^e comme la 2.^{de} à la 4.^e $B. F. :: C. G.$ Donc *Permutando*, la 3.^e est à la 1.^{re} comme la 4.^e est à la 2.^{de} $F. B. :: G. C.$; donc par le X.^e Axiôme en transposant les Raïsons : la 4.^e sera à la 2.^{de} comme la 3.^e à la 1.^{re} $G. C. :: F. B.$

Autrement : Par l'hypothese, les Raïsons $\frac{C}{B}$ & $\frac{B}{F}$ sont égales. Donc par le Coroll. du 8.^e Axiôme $\frac{G}{C} \cdot \frac{C}{B} :: \frac{F}{F} \cdot \frac{B}{F}$; donc par le 4.^e Axiôme $G. C. :: F. B.$

HUIT

HUIT DISPOSITIONS.

Dans lesquelles 4 Grandeurs peuvent être proportionnelles.

XXXVIII. IL s'ensuit deux choses de ce que dessus : 1. Que 4 grandeurs étant proportionnelles, elles le sont toujours de quelque manière qu'on les transporte, pourveu que les extrêmes demeurent extrêmes, & les moyens; moyens; ou que les extrêmes deviennent moyens, & les moyens extrêmes.

2. Qu'il y a huit différentes dispositions, ni plus ni moins, dans lesquelles 4 Grandeurs peuvent être proportionnelles. Les voici en les marquant par première, seconde, troisième, & quatrième, selon qu'elles auroient été disposées la 1.^{re} fois :

Hypothese 1. 2 :: 3. 4.	} Première disposition.
10 Axiome 3. 6 :: 1. 2.	} Equivalente.
2 Theoreme 2. 1 :: 4. 3.	} Permutation.
10 Axiome 4. 3 :: 2. 1.	} Equivalente.
3 Theoreme 1. 3 :: 2. 4.	} Alterne.
10 Axiome 2. 4 :: 1. 3.	} Equivalente.
2 Theoreme 3. 1 :: 4. 2.	} Permutation d'Alterne.
10 Axiome 4. 2 :: 3. 1.	} Equivalente.

On peut encore prouver ces 8 dispositions en cette manière : Ayant mis en quarré les 4 Grandeurs proportionnelles : en sorte que dans la première disposition, les antecedens soient au dessus des consequens, ainsi :

$$\begin{array}{cc} B & F \\ \hline C & G \end{array}$$

Elles seront toujours proportionnelles en les prenant deux à deux en même sens de quelque manière que ce soit, pourveu que ce ne soit point de coin en coin. Mais.

1. De haut en bas, par l'Hypothese.
2. De bas en haut, *Permutando*.
3. De gauche à droite, *Alternando*.
4. De droite à gauche, *Permutando*. L'Alterne &c

DE GEOMETRIE. LIV. II. 49

& chacune de ces dispositions est double, parce que l'on peut commencer par laquelle on voudra des deux raisons.

IV. THEOREME.

DES RAISONS PROPORTIONNELLES.

LES deux Theoremes precedens sont vrais, des Raisons proportionnelles aussi-bien que des Grands. XXXII.
 C'est à dire que si 4 Raisons sont proportionnelles, la 1.^e étant à la 2.^d comme la 3.^e à la 4.^e, elles le seront *Permutando* & *Alternando*; c'est à dire que la 2.^e sera à la premiere comme la 4.^e à la 3.^e; & que la premiere sera à la 3.^e comme la 2.^d à la 4.^e. On se contentera de prouver l'Alterne qui est de plus grand usage. Soient les 4 Raisons proportionnelles $\frac{a}{b} :: \frac{c}{d}$, qu'on appellera pour les marquer avec moins d'embarras a. c. :: i. o. Elles ne sont proportionnelles que parce que la Raison qui est entre les deux premieres Raisons [a & c] est égale à la Raison qui est entre les deux dernieres [i & o]; donc $\frac{a}{c} = \frac{i}{o}$; donc comparant chacune de ces Raisons égales entr'elles, avec la Raison qui est entre la 3.^e & la 2.^d; c'est à dire avec $\frac{c}{b}$; il est clair par le Corollaire du 8.^e Axiome que $\frac{a}{c} \cdot \frac{c}{b} :: \frac{i}{o} \cdot \frac{c}{b}$.

Or les deux premieres de ces 4 nouvelles Raisons ayant même consequent, sont comme les antecedens a & i; & les deux dernieres ayant le même antecedent, sont comme les consequens dans un ordre renversé; c'est à dire comme c & o; donc si A. E. :: I. O. A. I. :: E. O.

V. THEOREME.

Si à 4 Grands proportionnelles comme B. XL.
 C.

50 NOUVEAUX ELEMENS

C. :: F. G. on en ajoute deux quelconques, comme M & N: la raison de La 1.^{de} à la 5.^e est à la Raison de la 4.^e à la 6.^e; comme la Raison de la 1.^e à la 5.^e, est à la Raison de la 3.^e à la sixième

$$\frac{C}{M} \cdot \frac{G}{N} :: \frac{B}{M} \cdot \frac{F}{N}$$

Car la 1.^{re} & la 3.^e de ces 4 Raisons ayant même consequent, sont comme les antecedens; c'est à dire comme C est à B. Et il en est de même de la 1.^{de} & de la 4.^e qui sont comme G à F. Or par l'Hypothese & le 2.^d Theorème C.B :: G.F. Donc la premiere de ces Raisons est à la 3.^e, comme la 1.^{de} à la 4.^e; donc *Alternando* la 1.^{re} est à la 2.^{de}, comme la 3.^e à la 4.^e.

VI. THEOREME.

XI.^{le} SI à 4 Grandeurs proportionnelles comme B. C. :: F. G, on en ajoute deux autres quelconques comme M. & N; la Raison de la 1.^{de} à la 5.^e est à la Raison de la 6.^e à la 3.^e comme la Raison de la 1.^{re} à la 5.^e est à la Raison de la 6.^e à la 4.^e

$$\frac{C}{M} \cdot \frac{N}{F} :: \frac{B}{N} \cdot \frac{G}{F}$$

Demonstration. La 1.^{re} & la 3.^e de ces 4 Raisons ayant même consequent, sont comme les antecedens, par le I V.^e Axiôme; c'est à dire comme C. à B. Et la 2.^{de} & la 4.^e ayant même antecedent, sont comme les consequens dans un ordre renversé [par le V.^e Axiôme,] c'est à dire comme G à F. Or par l'Hypothese & le 2.^d Theorème C.B :: G.F; donc la 1.^{re} de ces Raisons est à la 3.^e comme la 2.^{de} à la 4.^e; donc *Alternando* la 1.^{re} est à la 2.^{de} comme la 3.^e à la 4.^e; ce qu'il falloit demontrer.

COROLLAIRE.

XII.^{le} DANS l'une & l'autre de ces deux proportions de

DE GEOMETRIE. LIV. II. 51

de Raisons des deux Theorèmes precedens, si l'on suppose que les deux premieres Raisons sont égales, les deux dernieres le sont aussi; c'est à dire pour 5.^e Theorème: Si C. M. :: G. N; B. M. :: F. N; & pour le VI.^e Theorème: Si C. M. :: N. F; B. M. :: N. G. C'est une suite évidente de ces deux Theorèmes, mais comme on a accoutumé de proposer l'un & l'autre en d'autres termes, nous en ferons le VII.^e & le VIII.^e Theorème.

VII. THEOREME.

Si à 4 Grandeurs proportionnelles comme B. C. :: F. G. On en ajoute deux autres comme M, N, qui soient telles que la 2.^{de} soit à la 5.^e comme la 4.^e à la 6.^e la 1.^{re} sera à la 5.^e comme la 3.^e à la 6.^e. XLIII.

1.^{re} Hypothese, B. C. :: F. G.

2.^{de} Hypothese, C. M. :: G. N.

Conséquence à prouver, B. M. :: F. N

Demonstration. Par la 1.^{re} Hypothese & le 4.^e Axiôme, ces 4 Raisons sont proportionnelles $\frac{B}{M} \cdot \frac{C}{N} :: \frac{F}{N} \cdot \frac{G}{N}$. Or par la 2.^{de} Hypothese, la 2.^{de} Raison & la 4.^e $\left[\frac{C}{M} \& \frac{G}{N} \right]$ sont égales, [car c'est ce que l'on suppose quand on dit que C. M. :: G. N.] Donc par le Corollaire du VIII.^e Axiôme, la 1.^{re} Raison & la 3.^e $\left[\frac{B}{M} \& \frac{F}{N} \right]$ sont égales, c'est à dire que B. M. :: F. N, ce qui est la conséquence à prouver. Ce Theorème, s'appelle *Æqualitas ordinata*.

VIII. THEOREME.

Si à 4 grandeurs proportionnelles comme B. C. :: F. G, on en ajoute deux autres comme X & Y, qui soient telles que la 2.^{de} soit à la 5.^e comme la 6.^e à la 3.^e la premiere sera à la 5.^e comme la 6.^e à la 4.^e. XLIV.

C 2

1 Hy-

52 NOUVEAUX ELEMENS

1.^{re} Hypothese, B. C. :: F. G.

2.^{de} Hypothese, C. X. :: Y. F.

Conséquence à prouver, B. X. :: Y. G.

Demonstration. Par la 1.^{re} Hypothese, & le IV.^e V.^e & Axiôme, $\frac{B}{X} \cdot \frac{C}{X} :: \frac{Y}{G} \cdot \frac{Y}{F}$. Or par la 2.^{de} Hypothese, la seconde & la quatrième Raison $\left[\frac{C}{X} \& \frac{Y}{F} \right]$ sont égales, car c'est ce que l'on suppose quand on dit que C. X :: Y. F; donc par le Corollaire du VIII.^e Axiôme, la 1.^{re} Raison & la 3.^e $\left[\frac{B}{X} \& \frac{Y}{G} \right]$ sont égales aussi, c'est à dire que B. X :: Y. G; ce qui est la conséquence à prouver. Ce Théorème s'appelle *Aequalitas perturbata*.

AVERTISSEMENT.

XLV. ON propose encore ce dernier Théorème d'une autre manière qui revient à la même chose, quoique cela paroisse fort différent.

VIII. THEOREME,

Proposé d'une autre manière.

XLVI. Y ayant 3 Grandeurs d'une part, & 3 de l'autre : Si la 1.^{re} d'une part est à la 2.^{de} comme la 2.^{de} de l'autre part est à la 3.^e; & que la 2.^{de} d'une part soit à la 3.^e comme la 1.^{re} de l'autre part est à la 2.^{de}: la 1.^{re} d'une part sera à la 3.^e, comme la 1.^{re} de l'autre part sera à la 3.^e.

Soient les Grandeurs 3 d'une part B, C, X, & 3 de l'autre Y, F, G,

1.^{re} Hypothese, B. C. :: F. G.

2.^{de} Hypothese, C. X. :: Y. F.

Conséquence à prouver, B. X. :: Y. G.

On voit clairement que ce sont les mêmes Hypotheses & la même conséquence à prouver que dans le VIII.^e Théorème, & qu'ainsi cela se prouvera

vera de la même sorte. Il faudra peut-estre mettre
là les Reciproques.

IX. THEOREME.

Si 4. Grandeurs sont proportionnelles, elles le XLVII.
seront encore en comparant chaque antecedent

plus ou moins son consequent, avec son conse-
quent; c'est à dire, que si la 1.^{re} est à la 2.^{de} com-
me la 3.^e est à la 4.^e; la 1.^{re} plus ou moins la 2.^{de}
fera à la 2.^{de} comme la 3.^e plus ou moins la
4.^e à la 4.^e; ce qui s'appelle ordinairement *Com-*
ponendo, s'il y a plus; & *Dividendo* s'il y a moins,

quoique peut-estre par abus, comme nous le fe-
rons voir plus bas; & il faut remarquer que pour
y avoir moins, chaque antecedent doit estre plus
grand que son consequent. Il faut prouver que si
B.C.:E.G. B plus ou moins C, est à C, com-
me F, plus ou moins G est à G; c'est à dire que
 $B \pm C.C.:F \pm G.G.$ Car $\frac{B}{C}$ & $\frac{F}{G}$ estant égales
par l'hypothese, & $\frac{B}{C} = \frac{F}{G}$, parce que ce sont
deux Raisons d'égalité: $\frac{B}{C} \pm \frac{C}{C}$ est égal à $\frac{F}{G} \pm \frac{G}{G}$.

Or $\frac{B}{C} \pm \frac{C}{C}$ n'est autre chose que $\frac{B \pm C}{C}$; & $\frac{F}{G}$

$\pm \frac{G}{G}$ n'est autre chose que $\frac{F \pm G}{G}$. Donc $\frac{B \pm C}{C}$

est égal à $\frac{F \pm G}{G}$; c'est à dire que la raison de B

plus ou moins C à C, est égale à la Raison de F plus
ou moins G à G; donc $B \pm C.C.:F \pm G.G$; ce
qu'il falloit demontrer.

X. THEOREME.

Si 4. Grandeurs sont proportionnelles, & que XLVIII.
 C 3 cha-

54 NOUVEAUX ELEMENS

châque antecedent soit plus grand que son consequent: le 1.^r antecedent est à la quantité dont il surpasse son consequent, en même Raison que le second antecedent est à la quantité dont il surpasse son consequent. Cette quantité s'appelle la difference de l'antecedent d'avec son consequent, comme nous avons déjà vu. Soit $B. C. :: F. G.$ & que chaque antecedent soit plus grand que le consequent. Je dis que $B. B - C :: F. F - G.$ Pour le montrer, il ne faut que prouver que $B - C. B :: F - G. F$; car si cela est, l'autre sera vray *Termutando*. Or ce dernier est clair; car la Raison de $\frac{B-C}{B}$ est la même chose que $\frac{B}{B}$ moins $\frac{C}{B}$; & $\frac{F-G}{F}$ est la même chose que la Raison $\frac{F}{F}$ moins $\frac{G}{F}$. Or $\frac{B}{B} = \frac{F}{F}$ & $\frac{C}{B} = \frac{G}{F}$; donc $\frac{B-C}{B} = \frac{F-G}{F}$; donc $B - C. B :: F - G. F$, & *Termutando* $B. B - C :: F. F - G$; ce qu'il falloit démontrer.

XI. THEOREME.

XLIX. LORS qu'on a deux proportions que je nommeray A & E: Si 3 termes de l'une sont égaux à 3 termes de l'autre, chacun à chacun, & dans le même ordre [c'est à dire le 1.^r au 1.^r le 2.^d au 2.^d; &c.] Les deux qui resteront de part & d'autre seront aussi égaux entr'eux.

Soit la proportion A. $B. D. :: L. M.$

& la proportion E. $\beta. \delta. :: \lambda. \mu.$ Je dis que si le premier terme d'A est égal au 1.^r terme d'E; & le 2.^d au 2.^d; & le 3.^e au 3.^e; les deux quatrièmes le seront aussi; car par le 9.^e Axiôme, les 2 premières Raisons d'A & d'E sont entr'elles comme les deux dernières.

Or les deux premières sont égales par le 8.^e Axiôme, parce que par l'Hypothèse, les antecedens sont

DE GEOMETRIE. LIV. II. 55

sont égaux, & leurs conséquens aussi. Il faut donc aussi que les deux dernières Raisons soient égales, c'est à dire que $L. M. :: \lambda. \mu.$ Or les deux antécédens de ces deux Raisons qui sont L & λ sont égaux par l'Hypothèse. Donc par le VIII.^e Axiôme, les deux conséquens M & μ le sont aussi; ce qu'il falloit démontrer.

On prouvera sans peine la même chose, si c'est l'égalité d'un autre terme d'A à un semblable d'E, comme du 2.^d au 2.^d qui soit supposé inconnu; car alors l'égalité des deux dernières Raisons qui sera manifeste par l'Hypothèse, prouvera celle des deux premières; & l'égalité des deux premières dont les antécédens sont égaux par l'Hypothèse, prouvera l'égalité des deux conséquens qui seront le 1.^{er} terme d'A, & le 2.^d d'E.

I. COROLLAIRE,

Ce théorème ne laisse pas d'être vrai quand les 3 termes d'une proportion égaux chacun à chacun à 3 termes de l'autre, ne seroient pas dans le même ordre dans l'une & dans l'autre, pourvu que les deux moyens de l'une soient égaux, ou aux deux moyens de l'autre, ou aux 2 extrêmes; car alors il sera aisé en transposant les termes de l'une, de faire que les termes égaux se répondent dans l'une & dans l'autre selon ce qui a été dit.

II COROLLAIRE.

Si deux proportions A & E étoient continuës, les deux moyennes proportionnelles étant égales, l'un des extrêmes d'A, ne pourroit être égal à l'un des extrêmes d'E, que l'autre extrême d'A ne fût égal à l'autre extrême d'E.

XII. THEOREME.

Plusieurs Raisons étant égales, tous les

C 4

21

56 NOUVEAUX ELEMENS

antecedens sont à tous les consequens, comme un des antecedens à son consequent. Comme deux Raisons étant égales, l'antecedent est à l'antecedent, comme le consequent au consequent; ainsi 4 Raisons [ou tant que l'on voudra] étant égales, le premier antecedent est au dernier antecedent, comme le 1.^{er} consequent au dernier; & le 2.^{de} antecedent au dernier antecedent, comme le 2.^{de} consequent au dernier; & ainsi de suite jusqu'au dernier antecedent qui sera à soy-même, comme le dernier consequent à soy-même.

Donc les 4 Raisons de chacun des quatre antecedens au dernier antecedent, sont égales aux 4 Raisons de chacun des 4 consequens au dernier consequent, chacune à chacune; c'est à dire que si ces 4 Raisons égales, sont

B C D F B C D F

—, —, —, —, —, —, —, —, seront égales chacune

A E I O E F F F

A E I O

à chacune à —, —, —, —

O O O O

Or ces Raisons des 4 antecedens au dernier antecedent sont la même chose que la Raison des 4 antecedens, joints avec le signe de plus au dernier antecedent, c'est à dire la même chose que

B + C + D + F

F

Et les 4 Raisons des 4 consequens au dernier consequent, sont la même chose que l'unique Raison A + E + I + O

O

Donc B + C + D + F est à F, comme A + E + I + O est à O.

Donc *Alternando*, les 4 antecedens sont aux 4 consequens, comme F dernier antecedent est à O dernier consequent.

SE-

SECTION DEUXIÈME.

Des Raisons tant d'égalité que d'inégalité qui peuvent être entre diverses Raisons, quand les termes de l'une sont multipliables par ceux de l'autre.

AVERTISSEMENT.

On croit ordinairement que les grandeurs de divers genre qu'on appelle *Heterogenes*, ne se peuvent pas multiplier. Cela ne me paroît pas vray, ou a besoin d'explication; car les nombres sont d'un autre genre que les autres grandeurs comme l'étendue & le tems; & neantmoins il est clair que les nombres multiplient toutes sortes de grandeurs, & que c'est une véritable Multiplication, quand je dis 6 toises ou 6 heures; puisque c'est prendre une toise ou une heure autant de fois qu'il y a d'unités dans 6, en quoy consiste la Multiplication.

LIII.

De plus ce qui ne se peut multiplier par la nature, se peut multiplier par une fiction d'esprit, par laquelle la vérité se découvre aussi certainement que par les Multiplications réelles; ainsi voulant sçavoir quel chemin fera en dix heures celuy qui a fait 24 lieues en 8 heures: je multiplie par une fiction d'esprit 10 heures par 24 lieues, ce qui me donne un produit imaginaire d'heures & de lieues de 240; qui étant divisé par 8 heures me donne 30 lieues. On multiplie aussi par la même fiction d'esprit des surfaces par des surfaces, quoique cela donne pour produit une étendue de 4 dimensions qui ne peut être dans la nature, & neantmoins on ne laisse pas de découvrir beaucoup de vérités par ces sortes de multiplications.

Je sçay bien qu'on dir que c'est parce que ces produits

58 NOUVEAUX ELEMENS

duits imaginaires se peuvent reduire en lignes qui auront même Raison entr' elles que ces produits; mais il n'y a guere d'apparence que la verité de ces fortes de preuves depende de ces lignes, qui sont visiblement étrangères à ces demonstrations. Quoy qu'il en soit ne me voulant brouiller avec personne, chacun prendra ce que je diray des Raisons qui se trouvent entre diverses raisons qu'on ne connoit qu'en multipliant les termes de l'une par ceux de l'autre, selon l'opinion qu'il aura que les termes de certaines raisons, sont ou ne sont pas multipliables les uns par les autres; car ce n'est que dans cette supposition que tout ce que j'en vais dire se doit entendre.

I. L E M M E.

214. ON a déjà vu dans le Livre precedent que deux grandeurs ont été multipliées l'une par l'autre, quand l'unité est à l'une comme l'autre est au Produit, c'est à dire à ce qui s'est fait par cette Multiplication; Ainsi 3 multiplié par 4 donnent 12, parce que $1, 3 :: 4, 12$; & un tiers multiplié par un quart donne un douzième, parce que $1, \frac{1}{3} :: \frac{1}{4}, \frac{1}{12}$. l'unité étant triple du tiers comme le quart est triple du douzième; & de même généralement quand B & X étant multiplié donnent BX, il faut que $1, X :: B, BX$.

II. L E M M E.

215. IL s'ensuit de là que toute Grandeur étant multipliée par un autre, la Grandeur simple est à soy-même multipliée comme l'unité est à l'autre Grandeur par laquelle elle a été multipliée, $B, BX :: 1, X$. Ce n'est que transposer les deux Raisons qui se doivent trouver en toute Multiplication.

III. L E M M E.

III. L E M M E.

DEUX Grandeurs étant multipliées par une même Grandeur : si elles sont égales, leurs Produits seront égaux ; & si les Produits sont égaux, elles seront égales. Soient B & D deux Grandeurs égales : Je dis que B X & D X sont égaux ; car par le premier Lemme

I. X. : $\left\{ \begin{array}{l} B. BX \\ D. DX \end{array} \right.$ donc B. B X :: D. D X. Par le

VI.^e Axiôme. Donc si les Grandeurs B & D sont égales, les Produits B X & D X le sont aussi par le VIII.^e Axiôme ; & si les Produits B X & D X sont égaux, les grandeurs B & D le sont aussi par le même VIII.^e Axiôme.

IV. L E M M E.

L O R S Q U E deux Grandeurs étant multipliées l'une par l'autre font un Produit, & que 2 autres en font une autre, comme par exemple B S & D T : On y peut remarquer 3 sortes d'égalitez. La 1.^{re} & la 2.^{de} les égalitez de chacune des deux Grandeurs d'une part à chacune des Grandeurs de l'autre, de B à D & S à T. la 3.^e l'égalité des deux Produits B S & D T ; or deux de ces égalitez étant données donnent la 3.^e ; c'est à dire que si chacune des deux Grandeurs d'une part est égale à chacune des deux Grandeurs de l'autre, les Produits sont égaux.

2. Et si ce sont les 2 Produits qui sont supposés égaux, & qu'une des Grandeurs d'une part, soit égale à une de l'autre part, les deux autres Grandeurs sont égaux.

Preuve du premier cas. La double Hypothèse de B égal à D, & d'S égal à T, fait voir par le 3.^e Lemme que B S = D S = D T ; donc B S = D T ; ce qu'il falloit démontrer.

NOUVEAUX ELEMENS

Preuve du 2.^d cas. Par la double Hypothese de BS égal à DT, & de B égal à D, en se souvenant du 3.^e Lemme, $BS = DT = BT$; donc $BS = BT$; donc par le 3.^e Lemme $S = T$ ce qu'il falloit demontrer.

I. PROPOSITION GENERALE.

EVIII. Si les deux termes d'une Raïson sont multipliez par une même grandeur, la Raïson des termes simples est égale à celle des termes multipliez, $B.C::B.M. C.M$, ou $\frac{B}{C} = \frac{B.M}{C.M}$

I. DEMONSTRATION.

PAR le 1.^d Lemme $B. B.M. \left. \begin{array}{l} \\ C. C.M. \end{array} \right\} :: I. M$; donc $B. B.M::C. C.M$, donc *Alternando* $B.C::B.M.C.M$.

II. DEMONSTRATION.

TOUTES les Aliquotes pareilles des antecedens B & B M sont également contenues dans les consequens C & C M.

Car soit X, l'Aliquote quelconque de B, & si l'on veut la centième: 100 X feront la même chose que B.

Donc par le 3.^e Lemme ce sera la même chose de multiplier cent X par M que de multiplier B par M; donc B M & 100 fois X M font la même chose; donc X & X M sont les Aliquotes pareilles des antecedens B. & B M.

Supposé maintenant que X soit dans C, ou tant de fois sans reste, ou toujours avec quelque reste; qu'il y soit, par exemple 87 fois précisément, ou 87 fois plus R.

Ce sera la même chose de multiplier C par M, que

DE GEOMETRIE. Liv. II. 61

que de multiplier par M, ou 87 fois X précisément, [ce qui donne 87 X M,] ou 87 X + R [ce qui donne 87 X M + R M.] Donc CM est la même chose que

Ou 87 X M,

Ou 87 X M + R M.

Comme donc il est clair par les proportions naturellement connues, & par le 1.^{re} Theor. que 100 X. 87 X :: 100 X M. 87 X M; ou 100 X. 87 X + R :: 100 X M. 87 X M + R M: il est clair aussi que B [égal à 100 X] est à C [égal à 87 X ou à 87 X + R], comme BM [égal à 100 X M] est à CM [égal à 87 X M ou à 87 X M + R M; c'est à dire que B. C. :: B M. CM; ce qu'il falloit démontrer

COROLLAIRE.

QUAND des Grandeurs de plusieurs dimensions, & qui en ont autant l'une que l'autre, font une Raison: les mêmes lettres qui se trouveront dans l'une & dans l'autre de ces Grandeurs, étant ôtées de part & d'autre une pour une, ce qui restera, donnera la même Raison en termes plus simples. Que s'il ne restoit rien, ces Raisons seroient entr'elles comme 1 à 1. B M. C M :: B. C. B B. B C :: B. C. B C M. B C N :: M. N. D F G. D P G :: F. P. R S T. T R S :: 1. 1.

LIX.

PROBLEME.

AYANT deux Raisons quelconques, faire que demeurant les mêmes, elles aient même conséquent? Il ne faut que multiplier les deux termes de chacune par le conséquent de l'autre.

IX.

Par là elles demeureront chacune de même qu'elles étoient auparavant, par la proposition précédente; & elles auront pour conséquent commun les produits des deux conséquens, $\frac{B M}{C N} :: \frac{B N}{C M}$.

C 7

H. PRO-

II. PROPOSITION GENERALE.

Pour connoître la Raison que des raisons quelconques ont entr'elles.

- LXI.** Deux Raisons quelconques sont entr'elles, comme le Produit des extremes, [c'est à dire du premier antecedent par le 2.^d consequent] est au Produit des moyens, [c'est à dire du 1.^d antecedent par le premier consequent,] $\frac{B}{C} \cdot \frac{M}{N} :: BN. CM.$ Car par le precedent Probleme, on reduit les deux Raisons données à n'avoir qu'un même consequent, en donnant pour antecedent à la premiere le Produit des extremes, & à la seconde le Produit des moyens, & à chacune pour consequent le Produit des consequens.

Donc par le 4.^e Axiôme n'ayant qu'un consequent, elles sont comme les antecedens, & par consequent comme le Produit des extremes qui est l'antecedent de la premiere, au Produit des moyens qui est l'antecedent de la seconde. $\frac{B}{C} \cdot \frac{M}{N} :: \frac{BN}{CM}.$

I. THEOREME.

- LXII.** Deux Raisons quelconques sont entr'elles comme la Raison des antecedens à celle des consequens, $\frac{B}{C} \cdot \frac{M}{N} :: \frac{B}{M} \cdot \frac{C}{N}.$

Car cette nouvelle comparaison laissant les mêmes extremes B & N, ne fait que transposer les moyens C & M; donc ces deux nouvelles Raisons sont encore entr'elles comme le Produit des mêmes extremes au Produit des mêmes moyens.

$$\frac{B}{C} \cdot \frac{M}{N} \left. \vphantom{\frac{B}{C} \cdot \frac{M}{N}} \right\} \dots BN. CM.$$

$$\frac{B}{M} \cdot \frac{C}{N} \left. \vphantom{\frac{B}{M} \cdot \frac{C}{N}} \right\}$$

II. THEOREME.

II. THEORÉME.

DEUX Raïsons quelconques sont entr'elles, comme ces mêmes Raïsons renversées prises dans un ordre renversé. LXIII.

J'appelle Raïsons renversées quand de l'antecedent on en fait le consequent, & du consequent l'antecedent. Je dis donc que $\frac{B}{C} \cdot \frac{M}{N} :: \frac{N}{M} \cdot \frac{C}{B}$ car il faut prendre ces Raïsons renversées dans un ordre renversé, afin que ce soit toujours les mêmes extremes & les mêmes moyens.

$$\begin{array}{l} \frac{B}{C} \cdot \frac{M}{N} \} \\ \frac{N}{M} \cdot \frac{C}{B} \} \end{array} \dots B N . C M .$$

AVERTISSEMENT.

TOUTES les Raïsons d'égalité étant égales, elles ont toutes même raison à quelque raison que ce soit, & ainsi on peut prendre celle que l'on veut à discretion, & les demonstrations pour l'ordinaire en sont plus sensibles, quand on prend celle du consequent au consequent de la Raïson d'inégalité, avec laquelle on compare cette Raïson d'égalité. LXIV.

III. THEORÉME.

LA Raïson d'égalité est à une Raïson quelconque d'inégalité, comme le consequent de la Raïson d'inégalité est à son antecedent. LXV.

1.^{re} Demonstr. $\frac{x}{x} \cdot \frac{n}{c} :: X C . X B :: C . B .$

2.^{de} Demonstr. $\frac{c}{c} \cdot \frac{n}{c} :: C . B .$

Et toute Raïson d'inégalité est à la Raïson d'égalité, comme l'antecedent de la Raïson d'inégalité est à son

son conséquent. $\frac{B}{C} \cdot \frac{x}{x} :: BX. CX :: B. C.$

Autrement $\frac{B}{C} \cdot \frac{C}{C} :: B. C.$

I. COROLLAIRE.

- LXVI.** LA Raison d'égalité est plus grande qu'aucune Raison de moindre inégalité, & plus petite qu'aucune Raison de plus grande inégalité : car elle est à chacune, comme le conséquent de chacune est à son antécédent ; donc la Raison d'égalité est plus grande qu'aucune Raison de moindre inégalité.

On prouvera de la même sorte qu'elle est plus petite qu'aucune Raison de plus grande inégalité, parce que le conséquent de toute Raison de plus grande inégalité est plus petit que son antécédent.

Cela se voit encore plus grossièrement en prenant pour Raison d'égalité celle du conséquent au conséquent de la Raison avec laquelle on la compare ; car il est clair que la Raison de 4 à 4 est plus grande que la Raison de 3 à 4, parce qu'ayant même conséquent celle d'égalité a un plus grand antécédent $\frac{4}{4}, \frac{3}{4}$; & il est clair aussi par le même principe que la Raison de 3 à 3 est plus petite que la Raison de 4 à 3. $\frac{3}{3}, \frac{4}{3}$.

II. COROLLAIRE.

- LXVII.** LA Raison d'égalité est moyenne proportionnelle entre deux Raisons, dont l'une est l'inverse de l'autre, ou l'inverse d'une Raison égale à l'autre. $\frac{B}{C} \cdot \frac{C}{C} :: \frac{B}{B} \cdot \frac{C}{C}$; que si $\frac{P}{Q}$ est égale à $\frac{B}{C}$, $\frac{G}{F}$ sera aussi égale à $\frac{C}{B}$, & par conséquent $\frac{B}{C} \cdot \frac{C}{C} :: \frac{F}{F} \cdot \frac{G}{G}$.

III. COROLLAIRE.

- LXVIII.** LA Raison de moindre inégalité est d'autant plus grande, & la raison de plus grande inégalité est d'autant

DE GEOMETRIE. LIV. II. 65

d'autant plus petite que l'une & l'autre approche plus de la Raison d'égalité. J'en laisse à trouver la démonstration qui se tire sans peine du Theorème precedent.

II. THORÉME.

Si les deux termes d'une Raison sont multipliez par deux nouvelles grandeurs, l'antecedent par l'une, & le consequent par l'autre: LXIX.

La Raison des termes simples, est à la Raison des termes multipliez, comme la Grandeur qui a multiplié le consequent, à celle qui a multiplié l'antecedent. $\frac{b}{c} : \frac{bm}{cm} :: BCN. BMC :: N. M.$

COROLLAIRE.

La Raison des Racines est à la Raison des Quarrez comme la derniere Racine est à la premiere, $\frac{b}{c} : \frac{bb}{cc} :: C. B;$ & la Raison des Quarrez est à celle des Racines, comme la premiere racine est à la derniere, $\frac{bb}{cc} : \frac{b}{c} :: B. C.$ LXX.

AVERTISSEMENT.

ON jugera sans peine par là de ce qu'est la Raison des Racines à la Raison des Cubes. $\frac{b}{c} : \frac{b^3}{c^3} :: CC. BB.$ LXXI.

III. THEORÉME.

Si ayant deux Raisons quelconques, j'en fais une troisième qui ait pour antecedent le produit des antecedens des deux premieres, & pour consequent le produit de leurs consequens: chacune des premieres est à la troisième comme le consequent de l'autre est à son antecedent; c'est à dire que la LXXII.

pre-

68 NOUVEAUX ELEMENS

sont entr'eux comme le produit des antecedens est au produit des consequens. $BB. CC :: BF. CG$;
car $BBCG = CCBF$.

CB étant commun à l'un & à l'autre, & BG du premier étant égal à CF du second.

IV. COROLLAIRE.

LXXVII. 4 Grandeurs étant proportionnelles, leurs Quarrez le sont aussi. Si $B. C :: F. G$.

$BB. CC :: FF. GG$; car $BBGG = CCFF$.
le premier étant le Quarré de BG , & le second de CF .

V. COROLLAIRE.

LXXVIII. QUATRE nombres étant proportionnels, le produit des quatre multipliez l'un par l'autre est nécessairement un nombre quarré, qui a pour sa racine le Produit des extrêmes ou celui des moyens, qui est la même chose ; car le produit des quatre nombres proportionnels, est la même chose que le produit des extrêmes multiplié par le produit des moyens. $2. 3 :: 4. 6$. 2 fois 6 (12) par 3 fois 4 (12) font 12 fois 12 ; c'est à dire 144 ; & c'est absolument la même chose que de dire, 2 fois 3 font 6, 4 fois 6 font 24, 6 fois 24 font 144.

VI. COROLLAIRE.

LXXIX. ON prouve aisément par ce 4.^e Theorème, ce qui a été dit cy-dessus, que quatre grandeurs étant proportionnelles, comme $B. C :: F. G$: si on en ajoute 2 autres quelconques comme M & N , les quatre Raisons suivantes sont proportionnelles $\frac{e}{m}$.

$\frac{n}{f} :: \frac{b}{m} \frac{n}{g}$; car par la proposition generale, les deux premieres Raisons sont entr'elles comme CF & à MN , & les deux dernieres comme BG est à M .

Or

Or par le Théorème précédent $CF = BG$; donc
 $C F . M N :: B G . M N$; donc $\frac{c}{m} \cdot \frac{n}{l} :: \frac{b}{m} \cdot \frac{n}{l}$;
 ce qu'il falloit démontrer.

V. THEOREME.

Si les deux moyens d'une proportion sont égaux LXXX.
 aux deux moyens d'une autre proportion, & que
 l'un des extrêmes de l'une soit égal à l'un des ex-
 trêmes de l'autre: l'autre extrême sera aussi égal
 à l'autre extrême; & il n'importe ni que les deux
 moyens supposés égaux de part & d'autre ne so-
 ient pas placez de même dans ces deux proportions
 [comme si c'est le 1.^{er} des moyens de la pro-
 portion A qui soit égal au 2.^d des moyens de la
 proportion C, & le second d'A au premier de C]
 ni que ce soit le 1.^{er} des extrêmes d'A qui soit
 supposé égal au dernier de C, les deux extrêmes
 d'A & de C n'en seront pas moins égaux.

Démonstr. Les deux moyens d'A étant égaux
 aux deux moyens de C: le produit des moyens
 d'A sera égal au produit des moyens de C, par le
 4.^e Lemme. Or dans chaque proportion le pro-
 duit des moyens est égal au produit des extré-
 mes.

Donc les produits des extrêmes d'A & de C sont
 égaux aussi.

Or par le 4.^e Lemme, supposé que l'un des ex-
 trêmes d'A quel qu'il soit, soit égal à l'un des ex-
 trêmes de C quel qu'il soit aussi: l'autre extre-
 me d'A, sera égal à l'autre extrême de C.

COROLLAIRE.

Si A & C étoient deux proportions continuës, LXXXI.
 les deux moyennes proportionnelles étant égales,
 l'un des extrêmes d'A, ne pourroit être égal à l'un
 des extrêmes de C, que les deux autres extrêmes
 d'A

70 NOUVEAUX ELEMENS
 d'A & de C ne fussent aussi égaux. Ce qui est
 prouvé dans ce Theorème & ce Corollaire, l'a
 déjà été plus haut d'une autre façon.

DES RECIPROQUES.

LXXXII. Deux Grandeurs sont dites être reciproques à
 deux autres, quand les unes sont les extrêmes
 d'une proportion, & que les autres en sont les
 moyens. Ainsi dans la proportion B. C. :: F. G.
 B & G sont reciproques à C & F; & il est clair,
 par ce qui vient d'être dit, que quand deux gran-
 deurs sont reciproques à deux autres, le produit
 des unes est égal au produit des autres. Que s'il
 n'y a que trois Grandeurs dans une proportion,
 parce qu'elle est continuë, celui du milieu qui
 sert de consequent à la premiere Raison, & d'an-
 tecedent à la seconde, est appelé *moyenne propor-
 tionnelle*, & alors le Quarré de cette Grandeur
 est égal au produit des autres Grandeurs. Si B.
 D. :: D. H: $BH = DD$.

VI. THEOREME.

LXXXIII. Si deux Grandeurs chacune de deux dimen-
 sions, sont égales: l'une des dimensions de la pre-
 miere est à l'une des dimensions de la seconde,
 comme l'autre dimension de la seconde est à l'au-
 tre dimension de la premiere. Si B G est égal à
 CF, B sera à C comme F à G; c'est une suite
 manifeste de ce qui vient d'être dit.

VII. THEOREME.

LXXXIV. Si deux Grandeurs d'une part, & deux autres
 d'une autre, sont chacune reciproques à deux au-
 tre Grandeurs, elles seront reciproques entr'elles
 Si B & G sont reciproques à P & Q; [c'est à
 dire

DE GEOMETRIE. LIV. II. 71

dire si $B. P. :: Q. G.$,] & que $S \& T$ soient aussi reciproques à $P \& Q$; [c'est à dire si $S. P. :: Q. T.$] $B \& G$ seront aussi reciproques à $S \& T$; [c'est à dire que $B. S. :: T. G.$] Car le premier ne peut être, que le produit $B G$ ne soit égal au produit $P Q$; & le second ne peut être, que le produit $S T$ ne soit égal au même produit $P Q$, auquel le produit $B G$ étoit égal. Donc les deux produits $B G \& S T$ sont égaux entr'eux, parce qu'ils sont chacun égal à un troisième. Donc les Grandeurs $B \& G$ sont reciproques aux Grandeurs $S \& T$.

COROLLAIRE.

QUATRE Grandeurs étant proportionnelles, LXXXV.
 si la 1.^{re} est à une 5.^e comme une 6.^e est à la 4.^e;
 la 2.^{de} sera aussi à la 5.^e, comme la 6.^e à la 3.^e;
 car il est clair par l'Hypothèse que la 1.^{re} & la 4.^e sont reciproques à la 5.^e & à la 6.^e Or la 2.^{de} & la 3.^e sont aussi reciproques à la 1.^{re} & à la 4.^e: elles le sont donc aussi à la 5.^e & à la 6.^e
 Soient les 4 proportionnelles B, C, E, G , & les deux autres P, Q .
 Si $B. C. :: E. G.$
 & $B. P. :: Q. G.$
 $C. P. :: Q. E.$



NOU-



NOUVEAUX ELEMENS
DE
GEOMETRIE.
LIVRE TROISIE'ME.

DE LA RAISON COMPOSE'E.

Où l'on fait voir aussi comment on peut
faire sur les Raisons les quatre Opera-
tions communes, Ajouter, Soustraire,
Multiplier, Diviser.

L



Nne s'est point encore avisé, que je sça-
che, de faire sur les Raisons les 4 Ope-
rations communes Ajouter, Soustrai-
re, Multiplier & Diviser, que l'on
fait sur les autres Grandeurs; cepen-
dant la maniere dont nous avons expliqué la na-
ture de la Raison dans le Livre precedent, fait
voir que cela se peut faire sans peine, & voicy
comment :

I. L. F. M.

I. L E M M E.

Pour l'Addition & la Soustraction.

Nous avons déjà veû N 47. que quand deux II.
Raisons ont le même conséquent, la Raison qui
a pour antecédent le premier antecédent plus ou
moins le second, & pour conséquent le consé-
quent commun, est, ou la somme des deux Rai-
sons, c'est à dire l'une plus l'autre, ou la diffé-
rence de ces deux Raisons, c'est à dire la premie-
re moins la seconde.

$$\frac{B}{X}, \frac{D}{X}; \frac{B+D}{X}, \frac{B-D}{X} \begin{matrix} 5 & 3 & 4 \\ 7 & 7 \end{matrix}$$

$\frac{5+3}{7}, \frac{5-3}{7}$ delà s'ensuit que

A D D I T I O N.

POUR ajouter ensemble deux Raisons quelcon- III.
ques, il ne faut que les reduire à un même con-
séquent. La Raison des nouveaux antecédens joints
par le signe de Plus au commun conséquent, est
la somme de ces deux Raisons données, ou l'une
ajoutée à l'autre.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{BS}{DT}, \frac{BT}{DT}, \frac{DS}{DT}, \frac{BT+DS}{DT} \\ \frac{74}{59}, \frac{63}{45}, \frac{20}{45}, \frac{63+20}{45} \end{array} \right.$$

Autrement; la Raison qui a pour antecédent le pro-
duit des extrêmes, plus le produit des moyens,
& pour conséquent le produit des conséquens,
est la somme de ces deux Raisons données.

S O U S T R A C T I O N.

POUR soustraire une Raison quelconque d'une IV.
autre qui soit plus grande: Il faut de même les
D re-

74 NOUVEAUX ELEMENS

reduire à un même conséquent; & alors la Raison du plus grand antecédent, moins le plus petit, au conséquent, est la différence de ces deux Raisons, ou la plus grande moins la plus petite

$$\frac{b}{a} : \frac{c}{d} :: \frac{b \cdot d}{a \cdot c} : \frac{b \cdot d}{a \cdot c} ; \frac{b \cdot d}{a \cdot c} = \frac{7 \cdot 4}{3 \cdot 4} = \frac{63}{12} = \frac{21}{4}$$

Autrement; ayant mis la plus grande Raison la première, la Raison qui aura pour antecédent le produit des extremes moins le produit des moyens, & pour conséquent le produit des conséquens, est la différence de ces deux Raisons ou la plus grande moins la plus petite.

AVERTISSEMENT.

On voit par là que ce que les Geomettres appellent *Composition & Division*, quand ils disent que quatre Grandeurs étant proportionnelles: Composendo ou Dividendo, la 1.^{re} plus ou moins la 2.^{de} est à la 2.^{de} comme la 3.^e plus ou moins la 4.^e est à la 4.^e a dû être plutôt appelé *Addition & Soustraction*, & qu'on a dû dire que cela se fait addendo ou subtrahendo; & c'est ainsi que nous avons résolu de l'appeler dans le reste de ces Elements.

II. L E M M E.

V. P O U R la Multiplication & la Division.

Comme dans les Grandeurs absolues, on a multiplié deux Grandeurs l'une par l'autre, quand l'unité est à l'une de ces Grandeurs, comme l'autre est à ce qui est né de cette Multiplication qu'on appelle le *Produit*; & qu'on a divisé une Grandeur par une autre, quand la Grandeur qui divise est à celle à diviser, ce qu'est l'unité à ce qui est né de cette Division qu'on appelle le *Quotient*:

Il faut aussi que dans les Grandeurs relatives qui s'appellent *Raisons*, on ait multiplié deux Raisons l'une par l'autre, quand ce qui tient lieu d'unité dans ces Grandeurs relatives est à l'une des Raisons, comme l'autre est à la Raison qui est née de cette Multiplication; Et

DE GEOMETRIE. LIV. III. 75

Et qu'on ait divisé une Raison par une autre quand la Raison qui a dû diviser est à celle à diviser, comme est ce qui tient lieu d'unité dans ces Grandeurs relatives à la Raison qui est née de cette Division.

Or ce qui tient lieu d'unité dans les Grandeurs relatives, c'est à dire dans les Raisons, ne peut être autre chose que la Raison d'égalité qui est celle où l'antecedent est égal au consequent comme $\frac{6}{3}, \frac{1}{1}$. Cela est clair de soy-même, & se prouve encore par l'analogie des fractions qui ont un parfait rapport aux Raisons comme on l'a déjà souvent observé.

Car dans les fractions, celle dont le numerateur est le même nombre que le dénominateur [ce qui revient entierement à la raison d'égalité] est la même chose que l'unité, deux moitiés $\frac{2}{2}$, trois tiers $\frac{3}{3}$, quatre quarts $\frac{4}{4}$ n'étant que l'unité diversement exprimée.

Cela étant supposé, il est très-facile de multiplier & de diviser les Raisons :

MULTIPLICATION DE DEUX RAISONS.

ON a multiplié deux Raisons quand on a fait une Raison qui a pour antecedent le produit des antecedens & pour consequent le produit des consequens. Ayant les deux Raisons $\frac{b}{c}$ & $\frac{m}{n}$, elles se trouveront multipliées par la Raison de $\frac{bm}{cn}$.

vt.

Pour le prouver il ne faut que montrer que la Raison d'égalité est à la Raison $\frac{b}{c}$ comme la Raison $\frac{m}{n}$ est à la Raison $\frac{bm}{cn}$; c'est à dire que $\frac{c}{b} \cdot \frac{b}{c} :: \frac{m}{n} \cdot \frac{bm}{cn}$.

D 2

Cc

76 NOUVEAUX ELEMENS

Ce qui est facile: Car par II. 24. $\frac{c}{e} \cdot \frac{b}{c} :: c. b.$

& par II. 69. $\frac{m}{n} \cdot \frac{bm}{cn} :: c. b.$

donc $\frac{c}{e} \cdot \frac{b}{c} :: \frac{m}{n} \cdot \frac{bm}{cn}.$

DIVISION D'UNE RAISON PAR UNE AUTRE.

ON a divisé une Raison par une autre, quand ayant mis la premiere celle qui doit diviser l'autre, on a fait une Raison qui a pour antecédent le produit des moyens, c'est à dire le produit du conséquent de la Raison qui tient lieu de diviseur par l'antecédent de l'autre, & pour le conséquent le produit des extremes; ainsi $\frac{b}{c}$ a divisé $\frac{m}{n}$, quand on a la Raison de $\frac{cm}{bn}$. Pour le prouver il faut démontrer que la Raison $\frac{b}{c}$ est à la Raison $\frac{m}{n}$ comme la Raison d'égalité est à la Raison de $\frac{cm}{bm}$, c'est à dire que $\frac{b}{c} \cdot \frac{m}{n} :: \frac{x}{x} \cdot \frac{cm}{bn}$. Or cela est facile: car par II. 61. $\frac{b}{c} \cdot \frac{m}{n} :: bn. cm.$ Or par II. 65. $\frac{x}{x} \cdot \frac{cm}{bn} :: bn. cm.$ donc $\frac{b}{c} \cdot \frac{m}{n} :: \frac{x}{x} \cdot \frac{cm}{bn}.$

PROBLEME.

VII. Ayant trois Raisons quelconques, en trouver une quatrième pour proportionnelle: Soient les trois Raisons quelconques $\frac{b}{c}, \frac{d}{e}, \frac{m}{n}$, les deux du milieu étant multipliées l'une par l'autre, ce qui fait $\frac{dm}{en}$, si on divise cette nouvelle Raison par la premiere, ce qui donne $\frac{c}{b} \cdot \frac{dm}{en}$: cette dernière Raison est la quatrième proportionnelle au regard des trois autres; c'est à dire que $\frac{b}{c} \cdot \frac{d}{e} :: \frac{m}{n} \cdot \frac{c}{b} \cdot \frac{dm}{en}.$ Car $\frac{b}{c} \cdot \frac{d}{e} :: B F. C D,$ par II. 61, & $\frac{m}{n} \cdot \frac{c}{b} \cdot \frac{dm}{en} :: B F. C D.$ par II. 69. O B

OBSERVATION.

CE que font ces quatre regles sur les Raisons VIII.
égales. L'addition de deux Raisons égales fait une
Raison double de chacune. Si B. C.::F. G $\frac{b \frac{g}{c} + c}{c \frac{g}{c}}$
est double de chacune de ces deux Raisons.

La soustraction de deux Raisons égales donne
zero pour l'antecedent, & par consequent le réduit
à rien.

$$\text{Si B. C.::F. G. } \frac{BG - CF}{CG} = \frac{0}{c \frac{g}{c}}.$$

Car $BG \equiv CF$, donc l'un moins l'autre n'est
rien.

La multiplication de deux Raisons égales fait une
Raison composée des deux, qui s'appelle Raison
doublée, dont on va parler bien-tost.

La division d'une Raison par une autre qui luy
est égale, donne une Raison d'égalité. Si $\frac{b}{c}$ est
égale $\frac{f}{g} : \frac{b}{c}$ divisant $\frac{f}{g}$ donne $\frac{c \frac{f}{g}}{b \frac{f}{g}}$, qui est une
Raison d'égalité, parce que $CF \equiv BG$.

DE LA RAISON COMPOSE'E.

CE qui vient d'être dit de la multiplication des IX.
Raisons fait comprendre sans peine ce que c'est
que la Raison composée; ce qui n'a point encore
été bien expliqué par aucun Geomettre.

Car au lieu d'en donner une définition generale;
ils se sont contentez d'apporter l'exemple d'une
Raison composée dans un cas particulier, comme
si on n'eût pû avoir d'autre notion plus claire,
plus distincte & plus universelle de la Raison com-
posée.

„Lors, disent-ils, qu'ayant deux grandeurs on
„en prend une troisième telle que l'on veut, &

D 3

„que

„ que l'on compare la premiere des grandeurs don-
 „ nées à cette troisieme, & cette troisieme à la
 „ seconde des données: la Raison des deux grandeurs
 „ données est composée de deux Raisons, de la
 „ premiere grandeur à l'interposée & de l'interposée
 „ à la seconde; ainsi la Raison de B à D est composée
 „ des Raisons de B à X & d'X à D.

Or il est aussi ridicule de ne dire que cela pour expliquer la nature de la Raison composée, que si on se contentoit de dire pour définir la proportion Geometrique, que quand la premiere grandeur est double de la seconde, & la troisieme double de la quatrième, cela s'appelle *proportion*.

Car comme cette définition de la proportion seroit vicieuse, parce qu'elle ne comprendroit pas tout le défini: celle qu'ils donnent de la Raison composée ne l'est pas moins; parce que bien loin de convenir à toute Raison composée, ce n'est qu'un abregement dans un cas particulier de la maniere dont se forment les Raisons composées, comme on le verra plus bas. Voicy donc en general ce que c'est que Raison composée:

DEFINITION DE LA RAISON COMPOSÉE.

X. LA composition des Raisons n'est autre chose que leur multiplication; & une Raison qui est née de la multiplication de deux ou plusieurs Raisons, est dite composée de ces deux ou plusieurs Raisons.

C'est pourquoi, suivant ce qu'on a dit de la multiplication, & y ajoutant seulement les termes de Composante & de Composée, une Raison est composée de deux Raisons quand la Raison dégalité est à l'une des composantes, comme l'autre composante est à la Raison composée.

PROPOSITION GENERALE.

O U

I. THEORÉME.

XI.

LA Raïson qui a pour antecédent le produit de tous les antecédens de plusieurs raïsons, & pour conséquent le produit de tous les conséquens, est composée de toutes ces Raïsons : ainsi la Raïson de $\frac{b \cdot m \cdot p}{c \cdot n \cdot q}$ est composée des trois Raïsons $\frac{b}{c}$, $\frac{m}{n}$, $\frac{p}{q}$.

On ne peut le démontrer qu'en commençant par deux Raïsons, & en faisant voir d'abord que $\frac{b \cdot m}{c \cdot n}$ est composée des Raïsons $\frac{b}{c}$, $\frac{m}{n}$.

Or il ne faut pour cela que prouver que la Raïson d'égalité est à $\frac{b}{c}$ comme $\frac{m}{n}$ est à $\frac{b \cdot m}{c \cdot n}$; ce qu'on a déjà fait en expliquant la Multiplication.

Et quand cela est fait des deux premières, on prouvera de la même sorte que $\frac{b \cdot m \cdot p}{c \cdot n \cdot q}$ est composée de toutes les trois; en faisant voir qu'elle est composée de $\frac{b \cdot m}{c \cdot n}$ [qui l'est des deux premières] & de la troisième $\frac{p}{q}$. Car $\frac{x}{a} \cdot \frac{b \cdot m}{c \cdot n} :: c \cdot n \cdot b \cdot m$. par 11. 65. & $\frac{p}{q} \cdot \frac{b \cdot m \cdot p}{c \cdot n \cdot q} :: c \cdot n \cdot b \cdot m$. par 11. 69. Donc $\frac{x}{a} \cdot \frac{b \cdot m}{c \cdot n} :: \frac{p}{q} \cdot \frac{b \cdot m \cdot p}{c \cdot n \cdot q}$; & par conséquent $\frac{b \cdot m \cdot p}{c \cdot n \cdot q}$ est composée de $\frac{p}{q}$ & $\frac{b \cdot m}{c \cdot n}$, laquelle l'est de $\frac{b}{c}$ & $\frac{m}{n}$, & ainsi l'est de toutes les trois $\frac{b}{c}$, $\frac{m}{n}$, $\frac{p}{q}$.

Suite importante de la vraie notion de la Raïson composée.

II. THEORÉME.

XII.

LA véritable notion de la Raïson composée étant une fois établie, qui est la Raïson du produit des

30. NOUVEAUX ELEMENS

antecedens de deux ou plusieurs Raisons au produit de leurs conséquens, il s'ensuit de là une chose fort remarquable; c'est que lors qu'il se rencontre dans les Raisons composantes des antecedens égaux aux conséquens, il faut les ôter un pour un, avant que de former les produits des antecedens & des conséquens, qui doivent faire l'antecedent & le conséquent de la Raison composée, si on veut qu'elle soit réduite aux moindres termes qu'elle peut être.

Que si ces antecedens & conséquens égaux étant ôtez, il ne restoit qu'un antecedent & un conséquent dans les Raisons composantes, cet antecedent & ce conséquent feront toute la Raison composée; & s'il ne restoit rien, la Raison composée seroit d'un à un, parce que ce seroit une marque que le produit des antecedens seroit égal au produit des conséquens.

On verra mieux tout cela par des exemples.

XIII. RAISONS RAISONS COMPOSANTES. COMPOSÉES.

$\frac{b}{d}$	$\frac{c}{p}$	$\frac{d}{r}$	$\frac{p}{f}$	$\frac{q}{b}$	$\frac{c}{r}$
$\frac{d}{m}$	$\frac{p}{n}$	$\frac{r}{f}$	$\frac{f}{x}$	$\frac{b}{n}$	$\frac{r}{d}$
$\frac{a}{o}$	$\frac{c}{a}$	$\frac{o}{c}$			$\frac{r}{i}$

LA Raison de cela, est que quand on auroit mis toutes ces lettres semblables dans le produit des antecedens & dans celui des conséquens, il les faudroit ôter pour avoir la Raison de ces produits reduite aux moindres termes qu'elle peut être, selon ce qui a été dit cy dessus. II. 59.

Il vaut donc mieux les retrancher d'abord comme

DE GEOMETRIE. LIV. III. 31

me inutiles, quand on ne veut qu'avoir la Raison de ces produits qui est la Raison composée.

On peut tirer delà divers Corollaires qui donneront une grande lumière à toute cette matière de la Raison composée.

I. COROLLAIRE.

Quand une de ces Raisons composantes ; est une Raison d'égalité ; il ne la faut que retrancher comme inutile à la Raison composée XIV.

$$\frac{x \cdot b \cdot m \cdot m}{x \cdot c \cdot n \cdot c n} \\ \frac{x \cdot b \cdot b}{x \cdot c \cdot c}$$

II. COROLLAIRE.

Quand les deux Raisons composantes ont la même grandeur pour leurs extrêmes, la Raison composée a pour son antecédent l'antecedent de la seconde Raison, & pour son conséquent le conséquent de la première XV.

$$\frac{x \cdot d \cdot d}{b \cdot x \cdot b}$$

III. COROLLAIRE.

Lors qu'au contraire les deux Raisons ont la même grandeur pour moyens [comme il arrive dans les Raisons que nous avons dites se pouvoir appeller continues,] la Raison composée a pour son antecédent l'antecedent de la 1.^{re} Raison, & pour son conséquent le conséquent de la 2.^{de} XVI.

$$\frac{b \cdot x \cdot b}{x \cdot d \cdot d}$$

IV. COROLLAIRE.

Quand il y a de suite plusieurs de ces Raisons continues égales ou inégales ; c'est à dire qui sont telles que le conséquent de la précédente est toujours l'antecedent de la suivante, la Raison du premier antecédent au dernier conséquent est com-

XVII.

D 5,

posée.

82 NOUVEAUX ELEMENS.

posée de toutes ces Raisons, $\frac{b}{c}, \frac{c}{d}, \frac{d}{e}, \frac{e}{f}, \frac{f}{g}, \frac{g}{h}, \frac{h}{i}$.

V. COROLLAIRE.

XVIII. C'EST qui vient d'être dit, est la même chose que ce qu'on propose en cette manière; Ayant plusieurs Grandeurs de suite, la Raison de la première à la dernière est composée de toutes les Raisons continuës de toutes les Grandeurs, c'est à dire des Raisons de la 1.^{re} à la 2.^{de} & de la 2.^{de} à la 3.^e & de la 3.^e à la 4.^e jusqu'à la dernière: c'est la même chose que le 2.^d Theoreme, & que le 3.^e Corollaire s'il n'y a que trois Grandeurs; car ayant ces grandeurs b, c, d, f, g, h , leurs Raisons continuës sont $\frac{b}{c}, \frac{c}{d}, \frac{d}{f}, \frac{f}{g}, \frac{g}{h}$. Donc par le 2.^d Theoreme la Raison de b à h est composée de toutes ces Raisons; & s'il n'y a que trois Grandeurs b, c, d , la Raison de b à d , $\frac{b}{d}$, par le 3.^e Corollaire est composée des deux Raisons $\frac{b}{c}$ & $\frac{c}{d}$.

VI. COROLLAIRE.

XIX. SI entre deux Grandeurs données, on en interpose une ou plusieurs autres à discretion, la Raison des Grandeurs données sera composée de deux ou de plusieurs Raisons continuës que formeront ces Grandeurs données avec les interposées. Soient les données b, d , l'interposée à discretion x , ou si on en veut mettre plusieurs x, y, z ; ce qu'on a dit de 3 Grandeurs ne peut pas n'être point vray de b, x, d .

VII. COROLLAIRE.

XX. DEUX Raisons étant égales, si on en renverse se une en faisant l'antecedent du consequent, & le con-

DE GEOMETRIE. LIV. III. 83

conséquent de l'antécédent, la Raison composée de ces deux Raisons, dont l'une est renversée est une Raison d'égalité. J'en laisse à trouver la démonstration.

III. THEOREME

DEUX Raisons composées sont égales quand les Raisons composantes de l'une, sont égales chacune à chacune aux Raisons composantes de l'autre. XXI.

Toute raison composée est le 4.^e terme d'une proportion, dont la Raison d'égalité fait le premier terme, & les deux Raisons composantes le 2.^d & le 3.^e; donc les Raisons d'égalité étant égales dans l'une & l'autre proportion: si les Raisons composantes d'une part sont égales aux Raisons composantes de l'autre part, les trois premiers termes de l'une sont égaux aux trois premiers termes de l'autre: & par conséquent les deux Raisons composées qui en sont chacune le 4.^e terme, seront égales par 11. 49.

IV. THEOREME.

SI les Raisons dont une raison est composée sont toutes-deux de moindre inégalité, la composée est moindre qu'aucune des composantes. Si elles sont toutes-deux de plus grande inégalité, la composée est plus grande qu'aucune des composantes. Si l'une est de moindre inégalité, & l'autre de plus grande inégalité, l'a composée sera plus petite que celle de plus grande inégalité, & plus grande que celle de moindre inégalité. Tout cela dépend de deux principes: XXII.

L'un que toute raison composée est le 4.^e terme d'une proportion dont la Raison d'égalité est le premier terme & les deux composantes, le 2.^d & le 3.^e terme. L'autre, que la Raison composante

2..

D 6

qui

84 NOUVEAUX ELEMENS

qui fait le 3.^e terme de cette proportion est à la composée, comme le consequent de celle qui en fait le 2.^d terme est à son antecédent par 11. 65, & 69. cydessus.

Donc quand l'une & l'autre composante est de moindre inégalité, le consequent de chacune étant plus grand que son antecédent, elles ne pourront être disposées de sorte que l'une & l'autre ne soit plus grande que la composée, $\frac{1}{1} \cdot \frac{2}{3} :: \frac{4}{7} \cdot \frac{8}{13} :: 3 \cdot 2$.

$\frac{1}{1} \cdot \frac{4}{7} :: \frac{2}{3} \cdot \frac{8}{13} :: 5 \cdot 4$. Au contraire, par le même principe quand les deux composantes sont de plus grande inégalité, le consequent de chacune étant plus petit que son antecédent, chacune aussi est plus petite que la composée. $\frac{1}{1} \cdot \frac{3}{2} :: \frac{5}{4} \cdot \frac{15}{8} :: 2, 3$. $\frac{1}{1} \cdot \frac{9}{4} :: \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{8} :: 4, 5$.

Mais si l'une des composantes est de moindre inégalité, le consequent en l'une étant plus grand que l'antecédent & moindre en l'autre: la composante de plus grande inégalité sera plus grande que la composée, & celle de moindre inégalité plus petite que la composée. $\frac{1}{1} \cdot \frac{2}{3} :: \frac{7}{3} \cdot \frac{14}{13} :: 3 \cdot 2$. $\frac{1}{1} \cdot \frac{7}{3} :: \frac{3}{2} \cdot \frac{14}{13} :: 5 \cdot 7$.

OBSERVATION SUR CE THEOREME.

EXIII.

ON voit clairement par ce qui vient d'être démontré dans ce Theorème que la composition des Raisons n'en peut être une Addition, mais en doit être une Multiplication; car il est contre la nature de l'Addition que deux choses ajoutées ensemble fassent un tout qui soit moindre que chacune: parce qu'il faudroit pour cela qu'un tout fût moindre que sa partie; mais il en est tout autrement de la Multiplication, dans laquelle il se peut faire que deux choses étant multipliées l'une par l'autre, il en naisse un produit qui soit moindre que chacune, & cela arrive toujours quand les deux.

DE GEOMETRIE. LIV. III. §5

deux choses que l'on multiplie sont moindres chacune que l'unité, comme quand on multiplie un tiers par un quart, ce qui fait un douzième; & c'est ce qui fait encore voir la parfaite analogie des nombres aux raisons; car il n'arrive jamais que la Raison composée soit plus petite qu'aucune des composantes, que quand chacune des composantes est de moindre inégalité, & qu'elle est par conséquent plus petite que la Raison d'égalité qui tient lieu d'unité dans les Raisons.

Quand une Raison est composée de plusieurs Raisons égales, si c'est de deux, elle s'appelle doublée; de trois, triplée; de quatre, quadruplée, &c.

V. THEORÉME.

S'il y a plusieurs termes en proportion continue, c'est à dire que le premier soit au second, comme le 2.^d au 3.^e & le 3.^e au 4.^e & le 4.^e au 5.^e: ce qui s'appelle Progression Geometrique: la Raison d'un terme à l'autre, sera simple, ou doublée, ou triplée, ou quadruplée, &c. selon que ces termes seront distans l'un de l'autre; car s'ils se suivent immédiatement, leur Raison sera simple, c'est à dire la même qui regne dans toute la Progression. XXIV.

S'il y a un terme entre-deux, qui est une moyenne proportionnelle, leur Raison sera doublée, c'est à dire composée de deux Raisons simples, qui par l'hypothèse sont égales.

S'il y a deux termes entre-deux, c'est à dire deux moyennes proportionnelles, leur raison sera triplée; s'il y en a trois, quadruplée; &c.

VI. THEORÉME.

La Raison d'une grandeur de plusieurs dimensions à toute autre grandeur homogene d'autant de XXV.

86 NOUVEAUX ELEMENS

dimensions , est composée de toutes les Raisons de chacune des dimensions d'une grandeur à chacune des dimensions de l'autre : ce n'est qu'une application de la définition de la Raison composée ; car comparant chacune des dimensions d'une grandeur à chacune des dimensions de l'autre , on met tous les antecedens de ces Raisons dans une des grandeurs , & tous les consequens dans l'autre. Or une Grandeur de plusieurs dimensions est la même chose que le Produit de ces dimensions multipliées l'une par l'autre , & par consequent les grandeurs sont entr'elles , comme le produit de leurs dimensions , c'est à dire comme le Produit des antecedens des Raisons de chacune des dimensions de l'une à chacune des dimensions de l'autre au Produit des consequens de ces mêmes Raisons ; ce qui est une Raison composée de ces Raisons par la définition même de la Raison composée.

I. COROLLAIRE.

XXVI. TOUTE Grandeur plane est à une autre Grandeur plane en raison composée des deux raisons de chacun des côtez de l'une à chacun des côtez de l'autre , c'est la même chose que la precedente.

II. COROLLAIRE.

XXVII. TOUTE Grandeur solide est à une autre Grandeur solide en raison composée des trois raisons de chacun des côtez de l'un à chacun des côtez de l'autre , c'est la même chose que la proposition generale.

III. COROLLAIRE.

XXVIII. LES Grandeurs planes & solides ayant qu'une de leurs dimensions égale & l'autre inégale sont entr'elles comme les inégales. $b f . b g . :: f . g .$
 $b f d . b f g . :: d . g . b f d . b m n . :: f d . m n .$

IV. Co-

IV. COROLLAIRE.

LES plans dont les deux dimensions ont même raison, chacune de l'un à chacune de l'autre, sont en raison doublée de cette même raison. Cela est clair par le premier Corollaire & la définition de la Raison doublée. XXIX.

V. COROLLAIRE.

LES solides dont les trois dimensions ont même raison chacune de l'un à chacune de l'autre, sont en raison triplée de cette raison. Cela est encore clair par le second Corollaire, & la définition de la raison triplée. XXX.

VI. COROLLAIRE.

Tous les Quarrez & les Cubes sont en raison, les uns doublée, & les autres triplée de la raison de leurs racines; car toutes les dimensions des Quarrez & des Cubes étant égales entr'elles, elles ne peuvent pas n'avoir pas chacune la même raison à chacune des dimensions des autres Quarrez & des autres Cubes. XXXI.

VII. COROLLAIRE.

Si 4 Grandeurs sont proportionnelles, leurs Quarrez & leurs Cubes le sont aussi. Si $b.c.::f.g.$ $bb.cc.::ff.gg.$ $bbb.ccc.::fff.ggg.$; car les Quarrez étant en raison doublée de leurs Racines, & leurs Cubes en raison triplée, les Raisons doublées & les triplées de Raisons égales doivent être égales par le 3.^e Theorème. XXXII.

VIII. COROLLAIRE.

Le Produit de deux Grandeurs quelconques est XXXIII.
moyen

88 NOUVEAUX ELEMENS

moyen proportionnel entre les Quarrez de chaque Grandeur. Soient les Grandeurs b & c , bb , bc , cc ; car bb , bc , cc :: b , c , cc :: b , c .

C'est la meme chose que de dire que le Produit de la toute & d'une partie, est moyen proportionnel entre le Quarre de la toute & le Quarre de cette partie; car il est visible que si la toute est t & m une partie :: t , t :: m , mm .

IX. COROLLAIRE.

XXXIV. EN toute Progression Geometrique, les Quarrez de deux termes qui se suivent immediatement, sont entr'eux comme deux termes, entre lesquels il y en a un d'interpose. Soient b , c , d , f , g , en Progression Geometrique. Je dis que bb , cc :: b , d ou cc , dd :: c , f ; car la Raison de b , d , est doublee de celle de b , c . Or par le 6.^e Corollaire, les Quarrez bb & cc , sont aussi en raison doublee de celle de b , c . Cela se peut prouver encore d'une autre forte. Si b , c , d , f , bd :: cc . Or bb , bd :: b , d donc bb , cc :: b , d .

X. COROLLAIRE.

XXXV. EN toute Progression Geometrique, les Cubes de deux termes qui se suivent immediatement, sont entr'eux comme deux termes entre lesquels il y en a deux d'interposez; car les Cubes sont en raison triplee de la Raison de la Progression, & les termes entre lesquels il y en a deux d'interposez, sont aussi en raison triplee de cette meme raison. Cela se peut prouver aussi par le 9.^{me} Corollaire; car si b , c , d , f , bb , cc :: c , f ; donc bb , ff :: cc , cc . Or bb , bb , bb , ff :: b , f , donc bbb , ccc :: b , f .

XI. COROLLAIRE.

XXXVI. C'EST par la qu'on a trouve comment il s'y falloit

DE GEOMETRIE. LIV. III. 89

loit prendre pour doubler un Cube donné ; car ayant un Cube donné bbb . il faut prendre f double de b , & si on peut trouver deux moyennes continuellement proportionnelles entre b & f , comme seroient c & d : enforte que $\frac{b}{c} = \frac{c}{d} = \frac{d}{f}$: le Cube de c premiere de ces moyennes proportionnelles sera double du Cube de b .

VII. THEOREME. DEFINITION.

DEUX Grandeurs planes qui sont telles que les deux dimensions de l'une sont les extremes d'une proportion dont les deux dimensions de l'autre sont les moyens, ou [ce qui est la même chose] que l'une des dimensions de la premiere soit à l'une des dimensions de la seconde, comme l'autre dimension de la seconde est à l'autre dimension de la premiere, sont appellées reciproques, & sont toujours égales. XXXVII.

Soient les plans bg & cf . Je dis que si b est à c comme f est à g , $b.c.::f.g.$ Ces deux plans sont reciproques & égaux, $bg = cf$: Car par II. 73. le Produit des extremes bg , qui est le premier de ces deux plans, est égal au Produit des moyens cf , qui est le second de ces deux plans.

VIII. THEOREME.

LES Grandeurs planes égales sont toujours reciproques, c'est à dire les deux dimensions de l'une sont les extremes de la proportion dont les deux dimensions de l'autre sont les moyens. Si bg est égal à cf : Je dis que $b.c.::f.g.$ par II. 73. XXXVIII.




NOU.



NOUVEAUX ELEMENS DE GEOMETRIE.

LIVRE QUATRIÈME.

DES GRANDEURS COMMENSURABLES ET INCOMMENSURABLES.

- I.  OUS avons dit généralement qu'il y a deux sortes de raisons ; la raison de nombre à nombre, & la raison sourde ; & comme c'est par là que les grandeurs sont commensurables & incommensurables, la suite naturelle nous oblige de parler de ces sortes de Grandeurs.

DEFINITION.

- II. C'EST la même chose de dire que deux grandeurs sont commensurables, & de dire qu'elles sont comme nombre à nombre.

Car

DE GEOMETRIE. LIV. IV. 91

Car afin que b soit commensurable à c , il faut que quelque grandeur comme x soit précisément tant de fois dans b & précisément tant de fois dans c , comme si elle est 9 fois dans b & 10 fois dans c .

Donc b est la même chose que 9 x , & c la même chose que 10 x .

Or 9 x . 10 x :: 9. 10.

Donc b . c :: 9. 10.

Donc b est à c comme nombre à nombre. Et de là il s'ensuit que c'est aussi la même chose de dire que deux grandeurs ne sont pas entr'elles comme nombre à nombre, & de dire qu'elles sont incommensurables, puisque si elles étoient commensurables elles seroient comme nombre à nombre.

SECTION PREMIERE.

Des Grandeurs commensurables ou des Raisons de nombre à nombre.

Tout ce qui a été dit dans les deux Livres précédens des Raisons en general, peut-être appliqué sans peine aux Raisons de nombre à nombre. Ce n'est donc pas ce que l'on va faire ici : ce seroit une répétition inutile. Mais on parlera seulement de ce qui convient spécifiquement aux Raisons de nombre à nombre, & en quoi elles sont différentes des Raisons Sourdes.

III.

I. LEMME.

Marquer les nombres par lettres.

ON peut marquer les nombres par lettres comme les autres grandeurs : & alors il faut observer en faisant les quatre opérations sur les nombres que l'on a marquez par lettres, tout ce qui a été dit dans le I. Livre de ces opérations sur les grandeurs quelconques : D'où naissent plusieurs différences entre cette manière de marquer les nombres par

IV.

92 NOUVEAUX ELEMENS

par lettres , & celle de les marquer par chiffres.

1. Une seule lettre peut marquer quand on veut quelque grand nombre que ce soit ; au lieu qu'il faut beaucoup de caractères pour marquer les grands nombres.

2. Les chiffres changent dans l'Addition , Soustraction, & Multiplication des nombres ; mais les lettres ne changent point : Car si *b* signifie 4, & *a* 5 : pour les adjoûter en chiffres je mettray 9 , & par lettres je mettray *b + a*. Et pour les multiplier en chiffres je mettray 20, & par lettres je mettray *ba* : & c'est en cela qu'est le plus grand avantage des lettres ; car les multiplications s'y font sans peine, & laissent toujours voir les nombres par lesquels on a multiplié ; au lieu que deux grands nombres sont difficiles à multiplier par chiffres , & on ne voit plus dans le produit les nombres dont il a été fait.

3. Le rang dans les chiffres fait tout ; car 29 & 92 sont deux nombres bien différens : mais il ne fait rien dans les lettres quand on les joint ensemble , ce qui marque une multiplication ; car il n'importe par où on commence la multiplication de deux nombres. C'est toujours la même chose 5 fois 4, ou 4 fois 5 : & ainsi *bcd*, *bdc*, *dbc* marquent le même nombre.

4. Les chiffres signifient des nombres déterminés : & un même caractère dans la même place des unités, des dizaines, &c. ne peut signifier que la même chose. Mais les lettres signifient des nombres quelconques ; en observant néanmoins que dans une même opération la même lettre doit signifier le même nombre.

II. LEMME.

v.

CETTE maniere de marquer les nombres par lettres, fait voir que les nombres peuvent être considérez comme étant d'une dimension, ou de deux, ou de trois, ou de quatre, &c.

On considere un nombre comme étant d'une seule dimension, lors qu'on regarde simplement ce qu'il contient d'unitez & qu'on le marque par une seule lettre, soit qu'il ait besoin pour être écrit en chiffre d'un seul ou de plusieurs caracteres. Ainsi 72 marqué par un *s*, est un nombre d'une seule dimension.

On le considere comme ayant deux dimensions, lors qu'il est exprimé par deux lettres qui marquent deux nombres, qui se multipliant l'un l'autre font le nombre total qu'on veut exprimer; Ainsi *b* signifiant 2, & *p* 36: *bp* signifie deux fois 36, ce qui fait encore 72.

On le considere comme ayant 3 dimensions, lors qu'il est exprimé par 3 lettres, qui marquent 3 nombres, dont le 3.^e multiplie le produit des deux premiers. Ainsi *b* signifiant 2, *c* 3 & *m* 12: *bcm* signifie 2 fois 3 fois 12. c'est à dire, 6 fois 12; ce qui fait encore 72.

On le considere comme ayant 4. dimensions; lors qu'il est exprimé par 4 lettres qui marquent 4 nombres, dont le 3.^e ayant multiplié le produit des deux premiers, le 4.^e multiplie le produit des 3 autres. Ainsi *b* signifiant 2, *c* 3, & *d* 4; *bcd* signifie 2 fois 3 fois 4 fois 3; c'est à dire, 6 fois 4 fois 3 ou 24 fois 3; ce qui fait encore 72.

On le considere comme ayant cinq dimensions, lors qu'il est exprimé par 5 lettres.

De 6, quand par 6.

De 7, quand par 7.

De 8, quand par 8, &c.

III. LEM-

III. LEMME.

VI. ON voit assez que deux mêmes lettres, comme bb ou cc , doivent faire un nombre quarré, & 3 mêmes lettres, comme bbb , un nombre cubique.

Mais il y a encore une autre observation à faire sur ces nombres. C'est qu'un nombre est reconnu pour quarré non seulement quand il est exprimé par deux mêmes lettres comme bb , mais aussi quand on partage en deux parts égales les lettres d'un nombre, en sorte que les mêmes lettres se trouvent en l'une & en l'autre partie. Ainsi $bbcc$, ou $bbccdd$, sont des nombres quarrés, parce que l'un se peut partager en bc & bc , & l'autre en bcd & bcd . Car on a déjà vu qu'il n'importoit de rien en quelque maniere que les lettres fussent rangées.

Un nombre de même est cubique non seulement quand il est exprimé par les trois mêmes lettres comme bbb , mais aussi quand les lettres qui le marquent peuvent être divisées en trois parts égales dont chacune contienne les mêmes lettres. Ainsi $bbbccc$, ou $bbbcccd dd$ sont deux nombres cubiques, parce que le premier se peut partager en bc , bc & bc , & l'autre en bcd , bcd & bcd .

COROLLAIRE.

VII.

Il s'ensuit de là sans autre preuve, que le produit de deux nombres quarrés est toujours un nombre quarré qui a pour sa racine le produit des deux racines des deux autres nombres quarrés. Ainsi bb en cc fait $bbcc$, qui a pour sa racine bc . Et que le produit de deux nombres cubiques est toujours

jours un nombre cubique, qui a aussi pour sa racine le produit des deux racines des deux autres nombres cubiques.

IV. LEMME.

LES exposans d'une raison de nombre à nombre sont nécessairement ou deux nombres impairs, ou un nombre pair & un impair, mais ce ne peut être deux pairs; car deux pairs pouvant encore l'un & l'autre être partagez par la moitié: cette raison n'auroit pas été reduite aux moindres termes qu'elle l'auroit pû être, & cette division par la moitié fera enfin que ces deux pairs se reduiront ou à deux impairs comme la raison de 10 à 6 se reduit à la raison de 5 à 3, ou au moins à un pair & à un impair, comme la raison de 8 à 14 se reduit à la raison de 4 à 7.

VIII.

V. LEMME.

QUOI que deux nombres n'aient pas autant de dimensions l'un que l'autre, ils ne laissent pas de pouvoir être comparez ensemble, parce que tous les nombres étant mesurez par l'unité ont toujours raison l'un à l'autre.

IX.

Neanmoins il est souvent utile de pouvoir faire que le nombre qui auroit moins de dimensions que l'autre, en ait autant demeurant le même, & cela est aisé.

Car reservant la lettre (*i*) pour marquer l'unité il ne faut qu'augmenter les lettres du nombre qui en a moins que l'autre, d'autant d'*i* qu'il est nécessaire pour faire qu'il y ait autant de lettres à l'un qu'à l'autre. Ainsi ayant à comparer *b* avec *bx*; ajoutant un *i* à *b*, *bi* aura autant de dimensions que *bx*.

Et



96 NOUVEAUX ELEMENS

Et néanmoins *b i* sera le même nombre que *b*, parce que l'unité multipliant un nombre ne le change point; 4 fois un, ou une fois 4, étant la même chose que quatre.

Et quand on le multiplieroit 2, 3 & 4 fois par l'unité, ce seroit toujours de même: comme il se voit en ce que l'unité prise une fois (ce qui peut être marqué par un seul *i*) est un nombre linéaire; & multiplié par soi-même, ce qui peut être marqué par deux (*i i*) est un nombre quarré, quoi que ce soit toujours un: & marquée par trois (*iii*) un nombre cubique: & par quatre (*iiii*) un nombre quarré de quarré: & ainsi à l'infini. D'où ils'enfuit que comme un seul (*i*) n'apporte aucun changement au nombre auquel il est ajouté: deux, trois, quatre *i*, n'en apportent point aussi.

Cette observation sera de grand usage dans les Theorèmes suivans.

VI. LEMME.

- x. IL est bon pour distinguer plus facilement les nombres pairs des impairs de marquer les nombres pairs par des consonnes, & les impairs des par voyelles, reservant toujours *i* pour l'unité: neantmoins quand on ne considere ni les pairs ni les impairs, les consonnes alors se prendront pour les nombres en general.

VII. LEMME.

- xi. OUTRE cette maniere de marquer par lettres les nombres que l'on veut multiplier, on peut aussi en les marquant par les chiffres ordinaires avoir presque les mêmes avantages, qui sont, 1. Que les nombres multipliers & multipliez paroissent toujours. 2. Qu'on voit tout d'un coup de combien de dimensions est chaque nombre. 3. Que l'on

DE GEOMETRIE. LIV. IV. 97

L'on voit sans peine les exposans de chaque raison de nombre à nombre.

Il ne faut pour cela que faire deux choses. La 1^{re} est de mettre une virgule entre deux, ou trois, ou quatre, ou cinq nombres que l'on veut multiplier les uns par les autres, en se souvenant que cette virgule veut dire *fois*.

Ainsi 4, 5. voudra dire 4 fois 5. c'est à dire 20.

5, 12. 5 fois 12. c'est à dire 60.

5, 6, 7, 8. 5 fois 6 fois 7 fois huit, 6. 30 fois 7 qui font 210, & 8 fois 210, ce qui fait 1680.

Les quarez se mettront de même.

3, 3. Quarré de 3. 9.

4, 4. Quarré de 4. 16.

12, 12. Quarré de 12. 144.

36, 36. Quarré de 36. 1296.

Les Cubes de même.

4, 4, 4. Le Cube de 4. 64.

10, 10, 10. Le Cube de 10. 1000.

On peut aussi dans cette maniere faire les nombres d'autant de dimensions les uns que les autres, en multipliant par 1, c'est à dire par l'unité, ceux qui n'en ont pas tant, & mettant la virgule entre-deux. Ainsi si je veux comparer 4 à 4, 7. Je n'auray qu'à mettre 4, 1 & 4, 7. Ce qui signifiera 4 fois 1, & 4 fois 7. Ce qui peut être de grand usage dans les proportions.

L'autre invention qui n'est que pour les nombres quarez, cubiques, quarez de quarez, &c. c'est de faire comme aux lettres, mettre au dessus un peu à côté un petit 2 pour les quarez; un 3 pour les cubes; un 4 pour les quarez de quarez, &c.

Ainsi 8.² marquera le quarré de 8. 64.

8.³. Le cube de 8. 512.

8.⁴. Le quarré de quarré de 8. 4096.

E

DE-

DEFINITIONS.

XII.

Il y a quelques définitions qu'il faut sçavoir pour bien comprendre les raisons de nombre & nombre.

Un nombre est dit en diviser un autre, ou en être la mesure quand il y est précisément tant de fois.

Ainsi l'unité est la mesure de tous les nombres, & tous les nombres sont multiples de l'unité.

Le nombre 2 est la mesure de tous les nombres pairs, & tous les nombres pairs sont multiples de 2.

Mais il faut remarquer 1°. que chaque nombre est la mesure de soy-même, parce qu'il est une fois dans soy-même. Et ainsi tout nombre a au moins deux mesures, soy-même & l'unité; il n'y a que l'unité qui n'a que soy-même. 2°. Que toutes mesures sont doubles, si ce n'est dans les quarrés, où un nombre se multiplie soy-même; Car si 3 par exemple est le quart de 12, quatre en fera le tiers. Si 3 est la 12.^{me} de 60, 12 en fera la 5.^{me}

3°. On dit qu'un nombre est nombre premier, quand il n'a de mesure que l'unité & soy-même, (ce qui se sous-entend sans qu'on le dise.) Comme 2. 3. 5. 7. 11. 13, &c.

Hors le nombre 2 nul nombre pair ne peut être premier, parce que tous (hors 2) peuvent au moins être divisez par 2.

4°. Deux nombres sont premiers entr'eux, quand ils n'ont de mesure commune que l'unité.

Ils s'ensuit delà que deux nombres differens qui sont chacun premiers le sont entr'eux, comme 5. 7. 11. J'ay dit deux nombres differens; car deux mêmes nombres comme 5 & 5, quoi que chacun soit premier, ne le sont point entr'eux; Car ou-

tre.

DE GEOMETRIE. LIV. IV. 99

tre l'unité, étant chacun à soy-même la mesure, ils ont encore cette mesure commune.

Deux nombres qui se suivent sont premiers entr'eux.

Deux impairs qui se suivent comme 7 & 9 le sont aussi.

Tous les quarrés sont premiers entr'eux, lors que leurs racines sont des nombres premiers, ou seulement premiers entr'eux, quoi que nul quarré ne puisse être nombre premier 9. 13. 49. 64. 81.

Deux nombres premiers entr'eux ne scauroient tous deux être pairs; il faut qu'au moins l'un des deux soit impair; car deux pairs auroient le nombre 2 pour mesure commune.

La Notion des Raisons de nombre à nombre.

LA raison de nombre à nombre est bien plus facile à concevoir que la raison des grandeurs en general, à cause que les nombres ont toujours l'unité pour commune mesure, & qu'il y a des grandeurs qui n'ont aucune mesure commune. XIII

Ainsi la raison de deux nombres ne consiste qu'en ce que l'un est tant de fois dans l'autre, si l'un est multiple de l'autre, comme 4 est 3 fois dans 12; ou que quelque aliquote de l'un est précisément tant de fois dans l'autre; ce qui est toujours certain au moins de l'unité, comme 2 qui est le tiers de 6, est quatre fois dans 8; l'unité qui est le quart de quatre, est 7 fois dans 7.

Or delà il est aisé de comprendre qu'afin que la raison de deux nombres soit égale à la raison de deux autres, il faut que si le second est multiple du premier, le troisième soit autant de fois dans le quatrième que le premier est dans le second; ou que si le premier n'a que quelqu'une de ses aliquotes qui soit tant de fois dans le second, une ali-

E 2 quote

100 NOUVEAUX ELEMENS

qu'ote pareille du troisiéme soit autant de fois dans le quatriéme; c'est à dire que si le tiers du premier est cinq fois dans le second: il faut aussi que le tiers du troisiéme soit cinq fois dans le quatriéme; Quatre est 5 fois dans 20, comme 7 est 5 fois dans 35.

La moitié de 6 est 5 fois dans 15, comme la moitié de 8 est 5 fois dans 20.

DIVISION GENERALE.

XIV. LA plus generale division des raisons de nombre à nombre, est de dire que les unes sont premieres, & les autres non-premieres.

J'appelle premieres celles dont les termes sont premiers entr'eux, comme la raison de l'unité à tout nombre: la raison de 2 à tout nombre impair.

J'appelle non-premieres celles dont les termes ne sont pas des nombres premiers entr'eux, comme 8, 12; 15, 20; 45, 81.

PROPOSITIONS FONDAMENTALES.

XV. Deux raisons premieres étant differentes ne sçauroient être égales.

Chaque raison premiere peut être égale à une infinité de non premieres.

Chaque raison non-premiere peut être reduite à une premiere qui lui sera égale.

Il faut prouver toutes ces trois propositions.

La premiere se prouve ainsi. Deux nombres premiers entr'eux n'ont de mesure commune que l'unité qui est l'aliquote qui prend sa denomination du nombre même, comme l'unité est une seizième de 16. Si je compare donc 16 à 25 qui sont deux nombres premiers entr'eux (quoi que nul ne soit premier:) la raison de 16 à 25 ne consiste qu'en ce qu'une 16.^{me} de 16 est 25 fois dans 25. Or dans l'in-

DE GEOMETRIE. LIV. IV. 101

L'infinité des nombres, il n'y a que 16 & ses multiples, comme 2 fois 16, 3 fois 16, qui ait des seizièmes, & il n'y a aussi que 25 & ses multiples, comme 2, 25. 3, 25. en qui quelque nombre puisse être précisément 25 fois. Or deux nombres dont l'un seroit multiple de 16, & l'autre autant multiple de 25, ne seroient pas des nombres premiers entr'eux. Donc il est impossible que deux raisons premieres étant différentes soient égales.

PREUVE DE LA DEUXIÈME PROPOSITION.

ELLE est claire par ce qui vient d'être dit; xvi.
car deux nombres premiers entr'eux peuvent être chacun multipliés par un même nombre, & cela une infinité de fois : n'y ayant point de nombre qui ne puisse multiplier l'un & l'autre. Et alors (par II. 58) cette raison non-premiere sera égale à la premiere.

PREUVE DE LA TROISIÈME PROPOSITION.

UNE raison non-premiere est celle qui est entre deux nombres non-premiers entr'eux. xvii.
Or afin que deux nombres soient non-premiers entr'eux, il faut qu'ils ayent une commune mesure autre que l'unité, & que par consequent ils soient multiples d'un même nombre. Ils ont donc chacun deux dimensions, & en ont une commune. Ils peuvent donc être exprimés chacun par deux lettres, dont il y en aura une qui sera la même, ou par deux chiffres avec une virgule entre-deux, & il y aura de part & d'autre le même chiffre. Donc effaçant ou la même lettre, ou le même chiffre, ce qui restera sera en même raison par II. 58. & 59.

$$\begin{array}{l} 8. \ 12. \\ bd. \ ad. \end{array} \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \dots b.a. \\ \dots 2.3. \end{array}$$

2, 4, 3, 4.

Mais il faut remarquer 2 choses : La premiere, que quand l'un des nombres est multiple de l'autre, c'est le nombre même dont l'autre est multiple, qui est la mesure commune des deux nombres : de sorte qu'il faut ou l'exprimer ou le concevoir comme étant multiplié par l'unité : 4 à 20, c'est à dire 4, 1. à 4, 5. De sorte qu'effaçant 4 de part & d'autre, la reduction sera 2. 5.

La deuxieme, que toute raison d'un même nombre à soy-même se réduit à la raison de l'unité à l'unité ; car ils ont chacun deux mesures comme il a été dit, l'unité & soy-même, & chacune leur est commune, effaçant donc la plus grande de ces mesures qui sont toutes deux communes, reste l'unité de part & d'autre.

Si la premiere reduction ne donnoit pas des nombres premiers entr'eux, (ce qui arrive quand on ne prend pas le plus grand diviseur commun,) il ne faudroit que recommencer, & il est indubitable que cela se reduiroit à la fin à une raison premiere, c'est à dire à une raison de deux nombres premiers entr'eux.

COROLLAIRE.

XVIII. LES deux termes de la raison premiere à laquelle se réduit une raison non premiere s'appellent *les exposans* de cette raison non-premiere.

Ainsi 2 & 3 sont les *exposans* de la raison de 8 à 12. 4 & 5, Les *exposans* de la raison de 28 à 35.

Cela s'appelle autrement reduire une raison aux moindres termes qu'elle peut être. Et pour abréger, le mot de *reduire* signifiera tout cela. Ce qu'il faut bien remarquer.

Ceci

DE GEOMETRIE. Liv. IV. 103

Ceci revient encore à cette maxime : Si un même nombre en divise deux autres, les quotiens sont proportionnels à ces deux nombres ; car le même nombre 4 ayant divisé 8 & 12, les quotiens ont été 2 & 3, qui sont en même raison que 8 & 12.

I. THEOREME.

DEUX raisons égales ont nécessairement les mêmes exposans, & ce n'est qu'en cela qu'elles sont égales. XIX.

Car il faut que deux raisons que l'on compare, ou soient toutes deux premières, ou toutes deux non-premières, ou que l'une soit première, & l'autre non-première.

Or il vient d'être prouvé qu'elles ne sçauroient être égales étant toutes deux premières si elles sont différentes : & que les non-premières se peuvent réduire à une première. Il faut donc que les non-premières pour être égales se puissent réduire à une seule & même première : ou s'il n'y en a qu'une de non-première, qu'elle se puisse réduire à la même première que celle qui l'est déjà. Or c'est ce qu'on appelle avoir les mêmes *exposans*, que de ne pouvoir être réduite qu'à une même & seule raison première. Donc il est impossible que deux raisons égales n'ayent pas les mêmes *exposans*.

II. THEOREME.

DEUX raisons de nombre à nombre étant égales, le produit des antecedens est au produit des consequens comme deux nombres quarréz : ou, la raison du produit des antecedens au produit des consequens a pour ses exposans des nombres quarréz. Car deux raisons ne sçauroient être égales, qu'elles n'ayent les mêmes exposans par le Theorème precedent, c'est à dire qu'étant réduites, el-

104 NOUVEAUX ELEMENTS

les ne le soient à deux raisons premières qui ont chacune le même antecédent & le même conséquent. Donc le produit des antecédens sera la multiplication d'un nombre par soy-même, ce qui fait un nombre quarré, & de même du produit des conséquens.

Deux raisons égales $bx. cx :: by. cy.$
 reduites aux moindres termes $b. c :: b. c.$

Donc le produit des antecédens est $bb.$

& celui des conséquens $cc.$

Exemple par les chiffres selon le septième Lemme.

$4. 7. 5. 7 :: 4. 3. 5. 3.$

Exp. $4. 5 :: 4. 5.$

Donc le produit des antecédens est 4 fois 4, c'est à dire le quarré de quatre.

Et le produit des conséquens est 5 fois 5, c'est à dire le quarré de cinq.

III. THEOREME.

XXI. TROIS raisons de nombre à nombre étant égales, la raison du produit des 3 antecédens au produit des 3 conséquens a pour ses exposans des nombres cubiques.

C'est la même chose; car trois raisons ne scauroient être égales, qu'elles n'aient toutes trois les mêmes exposans, c'est à dire qu'étant reduites elles ne le soient à trois raisons, qui ne seront que la même, ayant toutes trois le même antecédent & le même conséquent. Donc le produit des antecédens sera un cube, & le produit des conséquens un autre cube.

$bx. cx :: by. cy :: bz. cz.$

$b. c :: b. c :: b. c.$

Donc le produit $\left\{ \begin{array}{l} \text{des antecédens } bbb. \\ \text{des conséquens } ccc. \end{array} \right.$

C'est la même chose par les chiffres.

$4. 7. 5. 7 :: 4. 3. 5. 3 :: 4. 9. 5. 9.$

$4. 5 :: 4. 5 :: 4. 5.$

Donc

DE GEOMETRIE. LIV. IV. 105

Donc le produit des antecedens est 4, 4, 4, c'est à dire le cube de 4. Et le produit des consequens est 5, 5, 5, c'est à dire le cube de 5.

IV. THEOREME.

LA raison doublée ou triplée d'une raison de nombre à nombre a pour ses exposans des nombres quarez si elle est doublée, & des nombres cubiques si elle est triplée. XXXIV

Car une raison doublée n'est autre chose qu'une raison composée de deux raisons égales.

Or une raison composée de deux raisons n'est autre chose que la raison du produit des antecedens de ces deux raisons au produit des consequens par III. 1^o.

Donc une raison composée de deux raisons égales de nombre à nombre (ce qui est la même chose que la raison doublée d'une raison de nombre à nombre) n'est autre chose que la raison du produit des antecedens de 2 raisons égales de nombre à nombre au produit des consequens.

Or cette raison du produit des antecedens de deux raisons égales de nombre à nombre au produit des consequens, a pour ses exposans des nombres quarez par le 2.^d Theoreme.

Donc toute raison doublée d'une raison de nombre à nombre a pour ses exposans des nombres quarez.

On prouvera de la même sorte par le 3.^e Theoreme que la raison triplée d'une raison de nombre à nombre a pour ses exposans des nombres cubiques; parce qu'une raison triplée n'est autre chose qu'une raison composée de trois raisons égales. Donc, &c.

I. COROLLAIRE.

TROIS nombres étant continuellement propor- XXXV
tionnels,
E 3

tionnels, ne peuvent être réduits aux moindres nombres qu'ils peuvent être, que les deux extrêmes ne soient des nombres quarréz, & celui du milieu le produit de leurs racines.

Car le 1.^{er} de ces 3 nombres est au troisiéme en raison doublée de la raison du 1.^{er} au 2.^d ou [ce qui est la même chose] en raison composée de la raison du 1.^{er} au 2.^d & de celle du 2.^d au 3.^e. comme il a été prouvé III. 38. Donc par le 4.^e Theorème la raison du 1.^{er} au 3.^e. doit avoir pour ses exposans des nombres quarréz. Or par III. 33. le produit des 2 racines est moyen proportionnel entre deux quarréz, & il est clair que deux nombres ne peuvent avoir qu'un seul nombre pour moyen proportionnel. Donc le produit des deux racines doit être ce second terme.

II. COROLLAIRE.

XXIV. QUATRE grandeurs étant continuëment proportionnelles la raison de la 1.^{re} à la 4.^e a pour ses exposans des nombres cubiques.

C'est la même chose; car (par III. 24.) la raison de la 1.^{re} à la 4.^e est une raison triplée. Or par le Theorème precedent, toute raison triplée a pour ses exposans des nombres cubiques.

V. THEOREME.

XXV. Si plusieurs nombres sont continuëment proportionnels (ce qui s'appelle Progression Geometrique:) il faut necessairement qu'étant réduits, ils soient ou tous impairs, ou tous pairs hors l'un des extrêmes, qui sera seul necessairement impair. Car il est clair qu'ils ne peuvent pas être tous pairs, parce qu'ils ne seroient pas réduits.

Demonstr. Ce qui fait que les nombres sont proportionnels, c'est qu'il y a toujours une même raison entre ceux qui se suivent immédiatement. Et ainsi toutes ces raisons étant égales n'ont que les

mê-

DE GEOMETRIE. LIV. IV. 107

mêmes exposans, qui sont, ou l'unité & quelque autre nombre que ce soit, quand la Progression est multiple, ou deux autres nombres quand elle n'est pas multiple, lesquels deux nombres sont nécessairement ou tous deux impairs, ou l'un pair & l'autre impair, par le 4.^e Lemme.

PREUVE DU PREMIER CAS.

DANS le premier cas, c'est à dire quand l'un des exposans est l'unité, la vérité du Theorème est manifeste; car le 2.^d exposant sera le 2.^d terme de la Progression, & tous les autres en sont les puissances, le 3.^e le quarré, le 4.^e le cube, le 5.^e le quarré de quarré, &c. D'où il s'ensuit que si ce 2.^d exposant est un nombre impair, (toutes les puissances d'un nombre impair l'étant toujours aussi,) tous les termes de la Progression sont impairs.

xxv.

Exemple quand le deuxième terme est 5; (il faut se souvenir que par 5.² 5.³, &c. j'entens toujours le quarré de 5. le cube de 5, &c.)

1. 5. 5.². 5.³. 5.⁴, &c.

1. 5. 25. 125. 625, &c.

Que si le 2.^d exposant est pair, comme il sera le 2.^e terme de la Progression, & que tous les autres termes seront ses puissances: ils seront tous pairs (toute puissance d'un nombre pair l'étant toujours aussi.) Il n'y aura donc que l'unité qui sera un nombre impair dans cette Progression.

Exemple, ce second exposant étant 10.

1. 10. 10.². 10.³. 10.⁴, &c.

1. 10. 100. 1000. 10000.

PREUVE DU DEUXIÈME CAS.

QUAND la Progression n'est pas multiple, c'est à dire quand l'un des deux exposans n'est pas l'unité, il faut toujours qu'ils soient ou tous deux

xxvi.

108 NOUVEAUX ELEMENS

impairs, ou l'un pair & l'autre impair, comme il a déjà été dit. Or ce sont alors les deux exposans qui déterminent tous les autres termes.

Car les deux extrêmes doivent être la même puissance de chacun des deux exposans; c'est à dire le quarré s'il n'y a que trois termes, le cube s'il y en a 4. le qq. s'il y en a 5. le qc. s'il y en a 6, & ainsi jusques à l'infuy. Et tous les autres termes doivent avoir autant de dimensions que ces extrêmes; c'est à dire en avoir 2 si ces extrêmes sont des quarréz. 3, si ce sont des cubes. 4, si ce sont des qq. 5 si ce sont des qc, &c. Mais il faut qu'une partie de leurs dimensions soit d'un exposant, & l'autre partie de l'autre exposant.

Or de là s'ensuit tout ce qu'on avoit à prouver dans ce Theorème; car 1. Quand les deux exposans sont impairs, toutes les multiplications qui sont les extrêmes & ceux d'entre-deux se font par impairs, & par conséquent ils doivent tous être impairs.

Exemples, les deux exposans étant 3. & 5. (Il faut se souvenir qu'une virgule entre deux chiffres, signifie qu'ils se doivent multiplier l'un l'autre.)

3 ² . 3, 5. 5 ² .	9. 15. 25.
3 ³ . 3 ² . 5. 35 ² . 5 ³ .	27. 45. 75. 125.
3 ⁴ . 3 ³ . 5. 3 ² . 5 ² . 3. 5 ³ . 5 ⁴ .	81. 135. 225. 375. 625.

2. Quand l'un des exposans est pair & l'autre impair, l'un des extrêmes sera pair & l'autre impair. Mais tous ceux d'entre deux seront pairs, par ce qu'il y aura quelqu'une de leurs dimensions qui sera un nombre pair. Or toute multiplication où il entre un nombre pair, fait un nombre pair.

Exemples les deux exposans étant 2 & 5.

2 ² . 2, 5. 5 ² .	4. 10. 25.
2 ³ . 2 ² . 5. 2. 5 ² . 5 ³ .	8. 20. 50. 125.
2 ⁴ . 2 ³ . 5. 2 ² . 5 ² . 2. 5 ³ . 5 ⁴ .	16. 40. 100. 250. 625.

AYER-

AVERTISSEMENT.

Ces deux cas de la Progression multiple & de la non multiple ne sont differens qu'en apparence. Le 1.^{er} se devant concevoir comme étant virtuellement semblable au second ; Car l'unité qui en est le premier terme doit être conceüe comme quarré quand il y a trois termes , comme cube quand il y en a 4 , comme quarré de quarré quand il y en a 5 , & ainsi de suite. Et tous les autres termes doivent être concens comme ayant autant de dimensions qu'en a le dernier terme de la Progression : ce qui se fait par le moyen des unitex que l'on met pour autant de dimensions qui leur manquent. Cela se comprendra mieux par des exemples Soit i pris pour l'unité , & x pour l'autre exposant quelconque pair ou impair. Voici comme ces Progressions multiples doivent être conceüs , pour être semblables aux non multiples.

—	ii.	ix.	xx.
—	iii.	iiix.	ixx. xxx.
—	iiii.	iiix.	iiixx. ixxx. xxxx.

SECTION SECONDE.

Des Grandeurs incommensurables ou des Raisons Sourdes.

Nous avons déjà dit , que ce qui fait que des Grandeurs sont appellées incommensurables (ce qui est la même chose que n'avoir entr'elle qu'une raison sourde ,) est qu'ayant chacune une infinité de mesures de plus petites en plus petites , nulle des mesures de l'une ne peut-être la mesure de l'autre.

Cela paroît incomprehensible , & l'est en effet , parce que ce qui est cause de cela , ne peut être que

110 NOUVEAUX ELEMENS

la divisibilité de la matiere à l'infini. Or il est clair que tout ce qui tient de l'infinité, ne sçauroit être compris par un esprit fini tel qu'est celui de tous les hommes.

Il ne faut donc pas s'imaginer que l'on puisse avoir des notions aussi claires des raisons sourdes, qu'on en a des raisons de nombre à nombre : ni qu'on puisse prouver positivement que deux grandeurs sont incommensurables ; on ne le peut certainement, & tout ce que l'on sçauroit faire de mieux, est de le faire négativement ; c'est à dire en montrant qu'elles ne sont point entr'elles comme nombre à nombre : par où on est tres-convaincu que la chose est, quoi qu'on ne penetre pas comment cela peut être. Tout se réduit donc à faire voir par les proprietézz essentielles des raisons de nombre à nombre que nous venons d'établir, quelles peuvent être les grandeurs qui ne sont point entr'elles comme nombre à nombre, & qui par conséquent sont incommensurables, parce que les proprietézz des raisons de nombre à nombre ne pourroient convenir à la raison qu'elles auroient entr'elles. C'est pourquoi il faut bien avoir dans l'esprit les definitions suivantes.

DEFINITIONS.

- XXX.** 1. Deux grandeurs sont incommensurables, quand elles ne sont point entr'elles comme nombre à nombre, ou que la raison qu'elles ont entr'elles n'est point une raison de nombre à nombre.
2. Une raison est sourde quand on peut prouver qu'elle n'a point ce qui convient nécessairement aux raisons de nombre à nombre.
3. Chacune des deux raisons égales dont est composée la raison qu'on appelle *doublée*, ou des trois égales dont est composée la raison qu'on appelle *triplée*, soit appelée la raison simple d'une raison doublée ou triplée.

4. Deux

DE GEOMETRIE. LIV. IV. III

4. Deux grandeurs peuvent être incommensurables, que leurs quarréz & leurs cubes ne le sont pas. Et on dit alors, qu'elles sont incommensurables en elles-mêmes, ou en longueur, ou lineairement, mais qu'elles sont commensurables en puissance. Et il faut remarquer que le quarré est la puissance qui s'appelle simplement puissance, le cube la 2^{de}, le quarré de quarré la 3^e, & ainsi à l'infiny. Et qu'enanmoins quand on les marque par un petit chiffre au dessus & un peu à côté d'une lettre, ou d'un plus grand chiffre, 2 signifie le quarré, 3 le cube, 4 le quarré de quarré, comme 6.² 6.³ 6.⁴ &c. 8.² 8.³ 8.⁴ &c.

PROPOSITION FONDAMENTALE.

DES INCOMMENSURABLES.

DEUX grandeurs sont incommensurables (quoi XXXI. que non en puissance, ou 1.^{re} ou 2.^{de}) quand la Raison qu'elles ont entr'elles est la raison simple, ou d'une raison doublée, qui a pour ses exposans d'autres nombres que deux nombres quarréz, ou d'une raison triplée qui a pour ses exposans d'autres nombres que deux cubiques.

C'est une suite nécessaire de ce qui a été prouvé ci-dessus, qu'une raison composée de deux raisons égales de nombre à nombre doit avoir nécessairement pour ses exposans des nombres quarréz; c'est à dire que les deux termes de cette raison doublée doivent être nécessairement deux nombres quarréz, comme 1 & 4. 4 & 9. 16 & 25. Et qu'il ne suffit pas que l'un d'eux soit quarré, mais qu'ils le doivent être tous-deux.

Donc toute raison qui a pour ses exposans d'autres nombres que deux nombres quarréz ne sauroit être composée de deux raisons égales de nombre à nombre: Elle ne le peut donc être que de deux raisons sourdes. Donc les deux grandeurs
entre

112 NOUVEAUX ELEMENS

entre lesquelles est cette raison qui ne sçauroit être de nombre à nombre, sont incommensurables par la 1.^{re} définition S. 30. & par 2. S.

Il n'y a rien de plus facile que d'appliquer tout cela à la raison simple d'une raison triplée, &c

Mais on voit bien aussi que ces grandeurs sont commensurables en puissance ou 1.^{re} ou 2.^{de} car c'est ce que l'on suppose, que leurs quarez ou leurs cubes sont comme nombre à nombre, mais non comme deux nombres ou quarez ou cubiques.

I. COROLLAIRE.

XXXII. Deux quarez qui sont entr'eux comme deux nombres, & non comme deux nombres quarez, ont leurs racines incommensurables.

Et deux Cubes de même ont leurs racines incommensurables, si ces Cubes sont entr'eux comme deux nombres qui ne sont pas tous deux cubiques.

C'est la proposition même; car par III. 39. deux quarez sont entr'eux en raison doublée de leurs racines, & deux cubes en raison triplée: Donc si les quarez sont entr'eux comme 2 à 1. ou comme 4 à 3: la raison des racines sera la raison simple d'une raison doublée, qui n'aura pas pour les exposans deux nombres quarez. Donc ce sera une raison fourde. Donc ces deux racines seront incommensurables: Et on voit assez qu'il en sera de même des racines des cubes.

II. COROLLAIRE.

XXXIII. Quand trois grandeurs sont continuëment proportionnelles: Si la 1.^{re} est à la dernière comme deux nombres qui ne soient pas tous deux quarez, comme si la 1.^{re} est à la dernière comme 2 à 1, ou comme 3 à 2: la seconde sera incommensurable

DE GEOMETRIE. Liv. IV. 113

ble à la première & à la dernière, c'est à dire que la raison de la 1.^{re} à la seconde sera une raison sourde, aussi bien que celle qui lui est égale de la 2.^{de} à la 3.^e Mais cette 2.^{de} sera commensurable en puissance à chacune des deux autres; car (par III. 29.) la raison de la 1.^{re} à la 3.^e est composée des 2 raisons égales de la 1.^{re} à la 2.^{de} & de la 2.^{de} à la 3.^e Donc si ces deux raisons étoient de nombre à nombre, la raison de la 1.^{re} à la 3.^e qui en est composée, auroit eu pour ses exposans deux nombres quarrés. Or elles ne les a pas par l'hypothèse. Elles sont donc sourdes: & par conséquent la 2.^{de} de ces 3 grandeurs est incommensurable tant à la 1.^{re} qu'à la 3.^e

Mais elle leur est commensurable en puissance; car (par III. 34.) le quarré de la 1.^{re} est au quarré de la 2.^{de}, comme la 1.^{re} à la 3.^e & le quarré de la 2.^{de} au quarré de la 3.^e est de même comme la 1.^{re} à la 3.^e

III. COROLLAIRE.

Lors que 4 grandeurs sont continûment proportionnelles, si la 1.^{re} est à la 4.^e comme deux nombres qui ne soient pas tous deux cubiques: Chaque grandeur est incommensurable à celle qui la suit, en longueur & en 1.^{re} puissance, & seulement commensurable en 2.^{de} puissance.

C'est la même démonstration que la précédente; Car d'une part (par III. 19.) la raison de la 1.^{re} à la 4.^e doit être composée des 3 raisons égales de la 1.^{re} à la 2.^{de}, de la 2.^{de} à la 3.^e & de la 3.^e à la 4.^e Donc c'est une raison triplée, qui par l'hypothèse a d'autres nombres pour ses exposans que des nombres cubiques. Donc par la proposition, chacune de ces raisons est sourde. Donc les grandeurs qui ont entr'elles cette raison sourde sont incommensurables.

D'autre

114 NOUVEAUX ELEMENS

D'autre part (par III. 34.) les cubes de deux de ces grandeurs qui se suivent sont en même raison que la 1.^{re} à la 4.^{re} Or par l'hypothèse, la raison de la 1.^{re} à la 4.^{re} est une raison de nombre à nombre (quoi que ce ne soit pas celle qui est entre deux nombres cubiques.) Donc ces grandeurs qui se suivent sont commensurables en 2.^{de} puissance.

IV. COROLLAIRE.

XXXV. Si 3 grandeurs sont telles , que d'une part le carré de la plus grande soit égal aux carrés des deux autres , & que de l'autre la plus petite des trois soit une aliquote de la plus grande , c'est à dire qu'elle soit à la plus grande comme l'unité à quelque nombre: celle qui est entre-deux sera incommensurable à l'une & à l'autre , & elle leur sera seulement commensurable en puissance.

Soient les trois grandeurs b, d, i . Et que b soit à i comme 3 à 1. Leurs carrés seront comme 9. à 1. Donc par l'hypothèse du plus grand carré égal aux deux autres :

$$bb. dd. :: 9. 8.$$

$$\text{Et } dd. ii. :: 8. 1.$$

Donc par le 1.^{er} Corollaire, b & d sont incommensurables , & d . & 1. le sont aussi. Mais on voit assez que d . est commensurable en puissance à l'une & à l'autre.

V. COROLLAIRE.

XXXVI. Si trois Grandeurs sont d'une part continuellement proportionnelles , & que de l'autre la plus grande soit égale aux deux autres : elles sont absolument incommensurables entr'elles.

Car si elles étoient comme trois nombres , il faudroit par le 4.^{er} Lemme , & le 5.^{er} Theorème qu'elles fussent ou comme trois impairs , ou comme un impair & deux pairs , ou comme deux pairs & un

DE GEOMETRIE. LIV. IV. 115

un impair; c'est à dire en l'une de ces 3 manieres, en marquant les impairs par des voyelles, & les pairs par des consonnes, & en commençant par la plus grande, a. e. o.

a. b. c.

b. c. e.

Or la 2.^{de} hypothese fait que tous ces 3 cas sont impossibles; car cette 2.^{de} hypothese est que la 1.^{re} doit être égale aux 2 dernières, ce qui ne peut être dans aucun des trois cas: la 1.^{re} dans les deux premiers cas étant un impair, & les deux dernières un pair; & dans le 3.^e cas étant un pair, & les deux dernières faisant un impair.

AVERTISSEMENT IMPORTANT.

De tout ce qui vient d'être dit dans la 1.^{re} section xxxvii. des raisons de nombre à nombre, & dans cette 2.^{de} des raisons sourdes, on voit aisément que la maniere dont les premieres sont égales, est tres-differente de celle dont le sont ces dernières; car il paroît par les propositions fondamentales de la 1.^{re} section S. 15. Que deux raisons de nombre à nombre ne sont égales, que par ce qu'elles ont les mêmes exposans, & qu'ainsi étant reduites, elles ne sont toutes deux qu'une seule & même raison. 8 est à 12, comme 100 est à 150. par ce que la raison de 8 à 12, est la raison de 2 à 3, & que la raison de 100 à 150, est aussi la raison de 2 à 3.

Mais il n'en est pas de même des raisons sourdes; car on ne peut point dire qu'elles ayent les mêmes exposans. Elles ne seroient plus sourdes si cela étoit. Ce n'est donc point de là qu'on doit prendre leur égalité, mais comme il a été prouvé dans le 1.^{er} Theorème du 2.^d Livre, de ce que toutes les aliquotes pareilles des deux antecedens sont également contenues dans les conséquens, quoi que nulle aliquote du 1.^{er} antecedent ne soit précise-
ment

ment tant de fois dans son conséquent, ni aussi l'aliquote pareille du 2.^d antecédent dans le 2.^d conséquent; mais que ce soit toujours au regard de l'un & de l'autre avec quelque reste.

Et c'est pourquoi dans les raisons de nombre à nombre, quand une seule aliquote pareille de chaque antecédent, par exemple un tiers, est également contenu dans chaque conséquent, c'est à dire autant de fois dans l'un que dans l'autre, on n'a point besoin après cela d'examiner d'autres aliquotes. Mais dans deux raisons sourdes, pour être assuré qu'elles sont égales, il faut avoir comme examiné toutes les aliquotes pareilles de l'un & de l'autre antecédent quoi qu'infimes, & être assuré que nulle du 1.^{er} ne pourra être dans son conséquent avec quelque reste, que la pareille du 2.^d antecédent ne soit autant de fois dans son conséquent, quoi qu'avec aussi quelque reste, comme nous le démontrerons des lignes dans le 10.^e Livre. Et ainsi l'on ne peut point dire à proprement parler que 2 raisons sourdes égales (sur tout quand leurs termes sont absolument incommensurables, tant lineairement qu'en puissance) se puissent réduire à une seule & même raison première; puisque l'on ne peut dire ni quelle des deux tiendrait lieu de première, ni qu'il y en ait une troisième qui soit plutôt *raison première* que ces deux-là, à laquelle il les faille réduire pour les comprendre plus facilement; car assurément cela est impossible.

C'est pourquoi il faut prendre bien garde à ne pas étendre aux raisons entre deux étendus, ce que nous avons dit dans les propositions fondamentales de la 1.^{re} section: Que deux différentes raisons premières ne pouvoient être égales; car on ne l'a dit que des raisons de nombre à nombre, & cela n'a point de lieu dans les raisons sourdes entre deux étendus.

Et c'est ce qui me fait croire que ceux qui se ser-

vent

DE GEOMETRIE. LIV. IV. 117

vent de la consideration des exposans , qu'ils supposent être les mêmes dans toutes les raisons égales , pour expliquer les propriétés des proportions en general , que nous avons démontrées par une autre voye dans le commencement du 2.^d Livre , font le même sophisme que celui qui ayant à expliquer la nature du genre , le feroit par ce qui ne convient qu'à une de ses especes , qui est un sophisme assez ordinaire , mais qui n'en est pas moins sophisme ; car c'est ainsi par exemple qu'on explique les actions des bêtes par des pensées & des volontez qui ne conviennent qu'à l'homme , & qu'on le fait même au regard des choses inanimées : presque tout le monde s'imaginant que les pierres vont au centre de la terre , comme à un lieu de repos , par une inclination qui a quelque rapport à celle qui nous fait désirer ce que nous regardons comme nôtre bien.

AVERTISSEMENT.

Tout ce qui suit jusques à la fin de ce Livre ne sont que des pensées détachées que l'on peut passer , mais où je croi néanmoins que l'on trouvera assez de choses nouvelles , ou démontrées d'une nouvelle maniere.

SECTION TROISIE'ME.

*Reflexions sur les nombres quarrez, & divers moyens XXXVIII.
de trouver les sommes de plusieurs nombres
rangez en de certains ordres.*

De la difference entre deux quarrez.

DEUX quarrez quelconques ont pour leur difference le produit de la somme de leurs racines , par la difference des mêmes racines.

Soient les deux quarrez *bb.* & *cc.*

Leur

118 NOUVEAUX ELEMENS.

Leur différence sera $bb - cc$.

Or la somme des racines est $b + c$; & leur différence est $b - c$.

Et le produit de l'un par l'autre donne $bb - cc$; ce qui est la différence des quarréz.

Exemple dans les nombres.

Ayant les deux quarréz 12 , 12 (144) & 9 , 9 (81.)

Je veux sçavoir tout d'un coup leur différence : Je prens la somme des racines qui est 12 + 9 (21.)

Et leur différence $12 - 9$ (3.).
3 , 21 donne 6 ; qui est justement la différence de 144 à 81.

COROLLAIRE.

XXXIX. QUAND les Racines de deux quarréz ne diffèrent que d'une unité , leur différence est simplement la somme des racines ; car on ne fait rien d'avantage en la multipliant par l'unité.

Ainsi la différence entre 10 , 10 (100) & 9 , 9 (81) est 19 la somme des racines 10 & 9.

I. PROBLÈME.

XL. TROUVER des quarréz qui aient entr'eux une différence donnée.

Soit h la différence donnée ; l'ayant divisée par celui qu'il me plaira de ses diviseurs , & appellant d ce diviseur & q le quotient , il est clair que dq est égal à h , & qu'ainsi ces deux quarréz auront h pour leur différence s'ils ont dq .

Or ils auront dq , si je donne au premier pour sa racine $\frac{1}{2}d + \frac{1}{2}q$.

Et au 2.^d pour la sienne $\frac{1}{2}d - \frac{1}{2}q$. (remarquez qu'il faut mettre pour le premier de d ou de q , celui qui sera le plus grand.)

Ca

DE GEOMETRIE. LIV. IV. 119

Car le quarré du 1.^{er} sera $\frac{1}{4} dd + \frac{1}{4} qq + \frac{1}{2} dq$;
(car deux quarts font une moitié.)

Et le quarré du 2.^d sera $\frac{1}{4} dd + \frac{1}{4} qq - \frac{1}{2} dq$.

Donc la différence entre ces quarréz sera deux moitez de dq ; c'est à dire dq qui est égal à b .

Exemple dans les nombres: Soit 80 la différence donnée. Je la divise par 20 & le quotient sera 4.

Donc la moitié de 10 (10) & la moitié de 4 (2) donneront les racines de ces deux quarréz ;
Sçavoir 10 + 2 (12)

& 10 — 2 (8)

Car le quarré du 1.^{er} sera 100 + 4 + 2, 2, 10 (40)

Et le quarré du 2.^d sera 100 + 4 — 40.

Donc leur différence est 80. qui est en effet la différence du quarré de 12 (144) au quarré de 8 (64.)

COROLLAIRE.

QUAND la moitié de l'un des deux du diviseur ou du quotient, seroit un nombre rompu, la même chose se rencontreroit. X L I.

Exemple: Soit la différence donnée 60, qui étant divisé par 12 donne 5. Je dis que le quarré de 6 plus $2\frac{1}{2}$ ($8\frac{1}{2}$) & de 6 moins $2\frac{1}{2}$ ($3\frac{1}{2}$) auront 60 pour leur différence.

Car le quarré de $8\frac{1}{2}$ est $72\frac{1}{4}$ & celui de $3\frac{1}{2}$ est $12\frac{1}{4}$ qui ont visiblement 60 pour leur différence.

On pourroit mêmes prendre l'unité pour diviseur (ce qui donneroit 60 pour quotient,) & ce seroit la même chose.

Car le quarré de 30 + $\frac{1}{2}$ est 900 + $\frac{1}{4}$ + 30.

Et celui de 30 — $\frac{1}{2}$ est 900 + $\frac{1}{4}$ — 30.

Donc ces deux quarréz ont 60 pour leur différence.

ce ;

cc ; car le premiet est $930 + \frac{1}{4}$, & le dernier $870 + \frac{1}{4}$.

II. PROBLEME.

XLII. TROUVER tous les nombres dont le quarré est égal à deux quarteux.

Tout nombre composé de deux quarteux, comme $4 + 1$ (5) $9 + 4$ (13) $16 + 1$ (17) $16 + 9$ (25) a son quarré égal à deux quarteux. Et il n'y a que ces nombres là, ou leurs multiples, qui ayent cette propriété.

Soit un nombre quelconque composé de 2 quarteux comme $bb + cc$. Il est impossible que son quarré ne soit pas égal au quarré du nombre $bb - cc$, & à celui du nombre $2. bc$. C'est à dire qui sera le double du produit des deux racines.

Car $bb + cc$ a pour son quarré $b^4 + c^4 + 2bbcc$.

Et $bb - cc$ a pour son quarré $b^4 + c^4 - 2bbcc$.

Donc leur difference est $4bbcc$, qui est certainement un quarré qui a pour sa racine, $2bc$. Donc ce quarré là, plus celui qui a pour sa racine $bb - cc$, doivent être égaux à celui dont la racine est $bb + cc$.

Donc il est impossible qu'un nombre composé de deux quarteux n'ait pas son quarré égal à deux quarteux.

Exemple dans les nombres. 29 est composé de deux quarteux, de 25 & de 4. Je dis donc que son quarré sera égal au quarré de $25 - 4$ (21,) & à celui de 2, 2, 5 ; c'est à dire de 20.

Car $25 + 4$ a pour son quarré $625 + 16 + 2, 4, 25.$ (100.)

Et $25 - 4$ a pour son quarré $625 + 16 - 200.$

Donc

DE GEOMETRIE. Liv. IV. 121

Donc leur difference est 400 qui est le quarré de 20.

Et en effet le 1.^{er} de ces quarréz sera 841.

Le second 441.

Et le troisiéme 400.

I. COROLLAIRE.

Tout nombre quarré plus 1 fait un nombre, XLIII.
dont le quarré est égal à deux quarréz, comme
 $16 + 1$, $36 + 1$. Mais alors le second quarré
ayant pour sa racine ce quarré primitif moins un,
le troisiéme est quatre fois ce même quarré, & a
pour sa racine deux fois la racine de ce quarré que
j'ay appellé primitif.

Exemple. $36 + 1$. a pour son quarré 36, 36
(1296) $+ 1 + 1$, 36 (72.)

Et $36 - 1$ a pour son quarré 36, 36 (1296) $- 1 - 1$, 36 (72.)

Donc leur difference est 4, 36. (144) dont la
racine est 2, 6 (12.)

II. COROLLAIRE.

La plus grande moitié d'un quarré impair a son XLIV.
quarré égal à deux quarréz ; sçavoir au quarré
de la plus petite moitié, & au quarré impair
dont cette premiere racine est la plus grande
moitié.

Preuve generale. Soit hh un quarré impair,
soit m la plus grande moitié & n la plus petite,
(je les appelle ainsi, parce que je suppose qu'elles ne
different que d'une unité) $m = n + 1$. Donc
 $m + n$ étant égal à hh , $n + n + 1$, ou $2n + 1$, se-
ront aussi égales à hh .

Et le quarré de $n + 1$ sera la même chose que
 mm .

Or $n + 1$ a pour son quarré $nn + 1 + 2n$.

Et $2n + 1 = hh$.

F

Donc

122 NOUVEAUX ELEMENS

Donc $mm = nn + hh$; ce qu'il falloit démontrer.

Exemple dans les nombres.

Le carré de 25 a 13 pour sa plus grande partie, & 12 pour la plus petite.

Donc le carré de 12 + 1 est la même chose que le carré de 13.

Or 12 + 1 a pour son carré 12, 12, (144) + 1 + 24.

Et 24 + 1, est 25. Donc 144 + 25 = 169 carré de 13.

AVERTISSEMENT.

XLV. *ON dira peut-être qu'il n'est donc pas vrai qu'il n'y ait que les nombres composés de deux carrés ou leurs multiples, qui aient leur carré égal à deux carrés.*

Je nie la conséquence ; car il n'y a point de plus grande moitié de carré impair qui ne soit composée de deux carrés ; sçavoir du carré de la plus grande moitié de la racine de ce carré impair & de la plus petite. Exemple : 25 carré de 5 a 13 pour sa plus grande moitié, & 5 sa racine a 3 pour sa plus grande moitié, & 2 pour la plus petite. Je dis donc que 13 sera composé du carré de 3 qui est 9, & du carré de 2 qui est 4. Et voicy la raison pourquoi il faut nécessairement que cela soit ainsi : c'est que le carré de 5 est la même chose que le carré de 3 + 2, qui est 9 + 4 + 2, 6 (12.) Et n'y ayant que l'unité de différence entre 3 & 2 : les deux carrés de 3 & 2 ne sçauroient aussi être différens du double du produit des deux racines que d'une unité. C'est pourquoi les deux carrés 9 & 4 seront toujours la plus grande moitié du carré de 5, & 2, 6 sa plus petite moitié.

III. COROLLAIRE.

Le double d'un nombre composé de deux quarrez est aussi composé de deux quarrez ; sçavoir du quarré de la somme des racines des deux premiers quarrez, & du quarré de leur difference. XLVI

Soient bb & cc les 2 quarrez dont est composé le 1.^{er} nombre. Je dis que le double de ce nombre là sera aussi composé de deux quarrez, dont le premier aura pour sa racine $b + c$, & l'autre $b - c$.

Car $b + c$ a pour son quarré $bb + cc + 2bc$.

Et $b - c$ a pour le sien $bb + cc - 2bc$.

Or $2bc$ étant par $+$ & par $-$ se réduit à zero. Reste donc $2bb$ & $2cc$ qui font le double de $bb + cc$.

Exemple dans les nombres. Le double de $25 + 4$ est 58 .

Les racines de ces premiers quarrez sont 5 & 2 .

Or $5 + 2$ a pour son quarré $25 + 4 + 20$ (20 ,) ce qui fait en tout 49 .

Et $5 - 2$ a pour son quarré $25 + 4 - 20$ ce qui fait 9 . Donc le tout fait $49 + 9$, ce qui fait 58 double de 29 .

IV. COROLLAIRE.

La moitié d'un nombre composé de deux quarrez est aussi composée de deux quarrez, sçavoir du quarré de la moitié de la somme des racines, & du quarré de la moitié de leur difference. XLVII

Soient les deux quarrez bb & cc . Je dis que $\frac{1}{2}bb + \frac{1}{2}cc$, sera aussi composé de deux quarrez, dont le premier aura pour sa racine $\frac{1}{2}b + \frac{1}{2}c$, ce qui fait pour quarré $\frac{1}{4}bb + \frac{1}{4}cc + \frac{1}{2}bc$.

Et l'autre aura pour sa racine $\frac{1}{2}b - \frac{1}{2}c$, ce qui fait $\frac{1}{4}bb + \frac{1}{4}cc - \frac{1}{2}bc$.

F 2

Or

324 NOUVEAUX ELEMENS

Or ces deux quarez ensemble tout compyé & tout rabbatu font $\frac{1}{2}bb + \frac{1}{2}cc$, & par conséquent la moitié du nombre composé de bb & cc .

Exemple dans les nombres. 208 est composé des quarez 144 & 64. La somme de leurs racines est $12 + 8$, dont la moitié est 10, & leur difference 4, dont la moitié est 2; donc le quarré de 10 (100) plus celui de 2 (4) doit être comme il est aussi la moitié de 208,

PROBLEMES.

Pour trouver les sommes de plusieurs nombres mis dans une certaine suite.

I. PROBLEME.

XLVIII. TROUVER la somme d'une Progression Arithmetique quelque grande qu'elle soit, pourveu qu'on en connoisse le premier & le dernier terme, & le nombre des termes.

Il ne faudra qu'ajouter le 1.^{er} & le dernier, & multiplier ce nombre composé du 1.^{er} & du dernier par la moitié du nombre des termes, ou le nombre des termes entier par la moitié de ce que font le premier & le dernier.

Exemple. Cent pierres étant arrangées de toise en toise, si un homme s'oblige à les ramasser toutes l'une après l'autre, & les mettre en un tas à une toise près de la première: combien fera-t'il de toises de chemin? Il en fera deux pour la 1.^{re} pierre, 4 pour la 2.^{de}, & 200 pour la dernière. Ce sera donc une Progression Arithmetique de 100 termes, dont le premier & le dernier feront 202. Il faut donc multiplier ou 50 par 202, ou 100 par 101, ce qui fera 10100; c'est à dire 12120 pas Geometriques; ce qui fait plus de 4 lieues.

II. PRO-

II. PROBLEME.

TROUVER la somme d'une Progression Geometrique, supposant qu'elle va en augmentant comme c'est le plus ordinaire, & qu'ainsi l'antecedent de chaque raison est plus petit que son consequent. XLIX.

Soit la somme de tous les termes appellée S .

Le premier terme a , le 2.^d b , & le dernier w , & les exposans de la raison qui regne par toute la Progression n & m ; c'est à dire que deux termes qui se suivent immédiatement sont entr'eux comme n est à m , ou comme a est à b , si la premiere raison est déjà dans les moindres termes qu'elle peut-être.

Or tous les termes étant antecedens, hors le dernier qui n'est que consequent, & tous consequens, hors le premier qui n'est qu'antecedent: Tous les antecedens se pourront nommer $S-w$. Et tous les consequens $S-a$.

Cela supposé, je dis que le dernier moins le 1.^{er}, (c'est à dire $w-a$) est à toute la somme moins le dernier, (c'est à dire à $S-w$) comme $m-n$, est à n , ou comme $b-a$ est à a . Et en voici la raison:

Par ce qui a été dit II. 52. dans une Progression Geometrique tous les antecedens sont à tous les consequens, comme un antecedent est à un consequent.

Donc *permutando*, tous les consequens sont à tous les antecedens comme un consequent est à un antecedent.

Donc *dividendo*, tous les consequens moins tous les antecedens sont à tous les antecedens, comme un consequent moins son antecedent est à son antecedent.

F ;

Qr

126 NOUVEAUX ELEMENS

Or quand je dis, *tous les conséquens moins tous les antecedens*, c'est comme si je disois le dernier terme moins le premier ($\omega - a$;) car tous les termes étant conséquens hors le premier, je les mets tous par *plus*, hors le premier, quand je dis, *tous les conséquens*: & étant tous antecedens hors le dernier, je les mets tous par *moins* hors le dernier, quand je dis *moins tous les antecedens*. Ils sont donc tous, hors le premier & le dernier, par *plus* & par *moins*, & par conséquent se réduisent à rien. Et il n'y a que le dernier qui ne soit que par *plus*, & le premier qui ne soit que par *moins*. Donc cela se réduit au dernier moins le premier ($\omega - a$.)

Donc quand la Progression est ascendante, le dernier terme moins le 1.^{er} est à tous les termes moins le dernier, comme le 2.^d terme moins le premier est au premier.

En voici la preuve par la Specieuse:

$$S - a. S - \omega. :: b. a.$$

Donc *dividendo* $S - a - S - \omega. S - \omega :: b - a. a.$

Or dans le premier terme de cette proportion S étant par *plus* & par *moins* se réduit à rien. Reste donc ω par *plus* & a par *moins*. Donc cela ne veut dire qu' $\omega - a$.

Mais si la Progression étoit descendante, chaque antecedent étant plus grand que son conséquent, il ne faudroit que changer & dire:

Que le 1.^{er} terme moins le dernier seroit à tous les termes moins le premier, comme un antecedent moins son conséquent est à son conséquent,
 $a - \omega. S - a :: n - m. m.$

I. COROLLAIRE.

ON pourra prouver facilement par là que si on prend d'un tout une dixième, & une dixième de cette dixième, c'est à dire $\frac{1}{100}$; & une dixième de cette centième, c'est à dire $\frac{1}{1000}$, & ainsi jusques à l'infiny : toutes ces dixièmes de dixièmes prises à l'infiny ne feront que $\frac{1}{9}$ du tout; & les neuvièmes de neuvièmes prises de la même sorte $\frac{1}{81}$; & les huitièmes de huitièmes $\frac{1}{64}$; & ainsi en diminuant toujours les denominateurs d'un, les quars un tiers, les tiers une moitié, & les moitiés le tout.

Il ne faut pour cela que faire une Progression Geometrique en cette maniere : 1. $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{100}$, $\frac{1}{1000}$, & ainsi à l'infiny.

Donc, par ce qui vient d'être dit, 1 moins le dernier terme (qui se réduit à zero, la progression allant à l'infiny, de sorte qu'on le doit prendre simplement pour 1,) est à tous les termes de la Progression moins un, c'est à dire à toute cette infinité de dixièmes de 10.^{mes} comme 1 — $\frac{1}{10}$ est à $\frac{1}{10}$, c'est à dire comme $\frac{9}{10}$ est à $\frac{1}{10}$, & par conséquent comme 9 à 1. Donc toute cette infinité de dixièmes de 10.^{mes} n'est au tout que comme 1 à 9. Donc elles ne sont que la 9.^e partie du tout; ce qu'il falloit demontrer.

II. COROLLAIRE.

ON voit par là la solution du sophisme des anciens contre le mouvement.

Supposant, disoient-ils, qu'Achille aille 10 fois plus vite qu'une tortue, si la tortue a une lieue d'avance, jamais Achille ne l'attrapera; car tandis

128 NOUVEAUX ELEMENS

qu'Achille fera la 1.^{re} lieuë , la tortuë fera la $\frac{1}{15}$ de la 2.^{de} lieuë ; & tandis qu'Achille fera la $\frac{1}{15}$ de la 2.^{de} lieuë , la tortuë fera la $\frac{1}{15}$ de cette $\frac{1}{15}$, & ainsi à l'infini.

Tout cela suppose que toutes ces dixièmes de dixièmes à l'infini fassent une espace infini , au lieu qu'elles ne font toutes ensemble qu' $\frac{1}{9}$ de lieuë , selon le Theorème precedeur.

Et c'est pourquoi Achille doit attraper la tortuë à la premiere $\frac{1}{9}$ de la 2.^{de} lieuë. Car allant 10 fois plus vite que la tortuë , il doit avoir fait dix fois autant de chemin dans le même temps.

Donc pendant que la tortuë parcourra une $\frac{1}{9}$ de lieuë , Achille en doit parcourir $\frac{10}{9}$, ce qui fait justement la premiere lieuë composée de $\frac{9}{9}$, plus $\frac{1}{9}$ de la seconde lieuë.

III. COROLLAIRE.

LII. Si une horloge a deux aiguilles , l'une des heures , qui fait son tour en 12 heures , & l'autre des minutes , qui fait le même tour en une heure , marquer tous les points auxquels ces deux aiguilles se rencontreront ?

Ce sera à ces heures-ici : 1 → $\frac{1}{11}$. 2 → $\frac{2}{11}$. 3 → $\frac{3}{11}$. 4 → $\frac{4}{11}$. 5 → $\frac{5}{11}$. 6 → $\frac{6}{11}$. 7 → $\frac{7}{11}$. 8 → $\frac{8}{11}$. 9 → $\frac{9}{11}$. 10 → $\frac{10}{11}$. 11 → $\frac{11}{11}$. C'est à dire 12 heures.

La preuve en est aisée à deviner par celle du premier Corollaire.

III. PROBLEME.

TROUVER la suite des nombres triangulaires, pyramidaux & plus que pyramidaux. LIII

Pour bien comprendre cecy, il faut remarquer qu'on peut disposer les nombres ~~en~~ plusieurs bandes, qui seront telles que chaque nombre d'une bande sera égal à tous ceux de la bande precedente inclusivement jusques à celui-là; c'est à dire, par exemple, que le 2.^d de la troisième bande sera égal aux deux premiers de la 2.^d le 3.^e aux trois premiers, le 4 aux quatre premiers, & ainsi de suite jusqu'à l'infini.

On le comprendra mieux par l'exemple de 6 bandes que je ne continuërai que jusques à 9 termes.

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	1	3	6	10	15	21	28	36	45
4	1	4	10	20	35	56	84	120	165
5	1	5	15	35	70	126	210	330	495
6	1	6	21	56	126	252	462	792	1287

La premiere bande n'est que d'unitez.

La deuxieme des nombres ordinaires, dont on voit assez que chacun comprend autant d'unitez qu'il y a eu de termes dans la premiere bande jusques à ce terme de la 2.^d

F 3

La

130 NOUVEAUX ELEMENS

La troisiéme est des nombres qu'on appelle Triangulaires, parce qu'ils se peuvent disposer en triangle.

La quatrième de ceux qu'on appelle Pyramidaux.

La cinquiéme des seconds-Pyramidaux. Je ne sçai si on leur a donné un autre nom.

La sixiéme des troisiémes Pyramidaux. Et cela se peut continuer jusques à l'infy.

Il s'agit donc de trouver la somme de tant de nombres que l'on voudra à commencer toijours par l'unité dans chacune de ces bandes, par exemple la somme des dix premiers termes de la troisiéme bande, ou de la quatrième, ou de la cinquiéme. Et il faut remarquer que c'est la même chose de trouver la somme des dix premiers termes de la troisiéme bande, c'est à dire des dix premiers nombres triangulaires, que de trouver le dixiéme nombre pyramidal.

Voilà une regle generale pour cela que je tiens d'un fort habile homme. Je la pourrois proposer generalement : mais j'aime mieux l'appliquer tout d'un coup à un exemple particulier par lequel on jugera sans peine de tous les autres.

Je veux chercher la somme des 10 premiers termes de quelque bande que ce soit. Je mets 10, & puis 11, & puis 12, &c. comme des nombres qui se doivent multiplier les uns les autres, selon la bande dont on veut sçavoir la somme des dix premiers termes : & je mets 1, 2, 3, &c. au dessous de chacun de ces nombres, en cette maniere :

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, &c.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, &c.

Les nombres de dessous sont pour diviser les produits des nombres de dessus ; car si j'ai besoin de multiplier les 3 premiers nombres les uns par les

DE GEOMETRIE. LIV. IV. 131

les autres, je les diviserai par le produit des 3 de dessous, qui ne font que 6, parce que l'unité ne change rien en divisant.

Cela supposé, si je veux avoir la somme de dix termes de la 1.^{re} bande, je ne prens que le premier chiffre d'enhaut qui marque ~~que c'est~~ de dix termes, dont je veux avoir la somme. Et ce nombre me la donne sans qu'il soit divisé, parce que l'unité qui est au dessous ne divise point.

Mais si je veux avoir la somme de dix termes de la 2.^{de} bande, je multiplie les deux premiers nombres de dessus; c'est à dire 10 par 11, ce qui fait 110, & les divise par les deux de dessous; c'est à dire par une fois 2, ce qui donne 55. Mais pour faire cela plus facilement, avant que de faire la multiplication je divise par 2 l'un des deux chiffres qui le peut être, & je multiplie l'autre nombre par sa moitié, c'est à dire 11 par 5; ce qui donne encore 55.

Si je veux avoir la somme de dix termes de la 3.^{re} bande, je me sers pour cela des trois premiers chiffres d'enhaut, & je commence par diviser ou 10 par 2 & 12 par 3, ou tout d'un coup 12 par 6; (car cela revient au même,) & je multiplie les uns par les autres 5, 11, 4, ou 10, 11, 2, ce qui donnera 220, qui font la somme des dix premiers chiffres de la 3.^{re} bande.

Pour la 4.^{re} bande, je me sers des 4 chiffres d'enhaut, les ayant auparavant divisez par ceux d'embas, sçavoir 10 par 2, & 12 par 3 fois 4, ce qui le reduira à 1, qui ne fera rien dans la multiplication des chiffres d'enhaut, & ainsi ils se reduiront à 5, 11, 13, ce qui fait 715.

Pour la 5.^{re} bande, on en fera autant des 5 chiffres d'enhaut, on les diviserà autant que l'on pourra par ceux d'embas en cette maniere: 14 par 2, ce qui donnera 7; 12 par 3 fois 4, ce qui le reduira à rien; au regard de la multiplication à faire; & 10 par 5,

132 NOUVEAUX ELEMENTS

ce qui donnera 2. Et ainsi ces 5 nombres ne feront plus que 2, 11, 13, 7, ce qui fait 2002.

J'en dirai pas davantage. On voit assez comment cela se doit faire pour toutes les bandes suivantes, & pour toute autre quantité de termes dont on voudra scavoir la somme, comme la somme des 100 premiers termes de quelque bande que ce soit; car laissant toujours en bas 1, 2, 3, &c. ce qui est invariable pour diviser les nombres d'en haut: il faudra mettre pour ces nombres d'en haut 100, 101, 102, 103, &c.

Mais j'avouë franchement que je ne sçay la raison de cela que pour la 2.^{de} & la 3.^{de} bande, & non pour les autres.

Observations sur les nombres Triangulaires.

CLIV.

J'AY déjà dit qu'on appelloit Triangulaires les nombres de la 3.^{de} bande. Or comme je pretens m'en servir pour trouver avec beaucoup de facilité la somme des quarrés & des cubes: j'ay besoin d'en remarquer quelques proprietés.

La 1.^{re} est que deux nombres triangulaires qui se suivent immédiatement font, pris ensemble, le quarré du nombre qui répond au plus grand des deux. On le verra par la table & en voici la raison:

Je dis donc que le nombre Triangulaire de 9 & celui de 10, doivent faire ensemble le quarré de 10 qui est 100. Car pour avoir le nombre triangulaire de 9, il faut multiplier 9 par la moitié de 10, ce qui fait 5, 9; & pour avoir celui de 10, il faut multiplier 11 par la moitié de 10, ce qui fait 5, 11. Or 9 & 11 faisant 20, il est visible que ces deux multiplications ensemble fons 5, 20; c'est à dire 100.

Autrement 5, 10 — 1 font 50 — 5.

Et 5, 10 + 1 font 50 + 5.

Q

DE GEOMETRIE. LIV. IV. 133

Or cela fait ensemble 2, 50, c'est à dire 100.

Autre exemple. Le nombre Triangulaire de 8 est 4, 9.

Et celui de 9 est 5, 9 ;

Ce qui fait ensemble 9, 9 ou 81.

La 2.^{de} propriété est que deux nombres Triangulaires qui se suivent ont pour leur différence le nombre naturel qui répond au plus grand.

Et il faut bien que cela soit ainsi ; car le 9.^{me} nombre Triangulaire est la somme des 9 premiers nombres, & le 10.^e la somme des 10 premiers qui par conséquent ne peut différer de l'autre, que parce qu'elle a 10 de plus.

On peut encore remarquer une 3.^e propriété de ces nombres Triangulaires, qui est assez surprenante, quoi qu'elle ne soit pas de grand usage. C'est que tout nombre carré impair, moins 1, se pouvant diviser par 8, pour trouver combien 8 y fera de fois, il ne faut que prendre le nombre triangulaire de la plus petite moitié de la racine de ce carré impair. Exemple ; 8 est 45 fois dans le carré de 19, parce que le nombre triangulaire de 9 (qui est la plus petite moitié de 19) est 45. Et 8 est 120 fois dans le carré de 31, parce que 120 est le nombre Triangulaire de 15, qui est la plus petite moitié de 31.

De la première propriété il s'ensuit que toute quantité de nombres carrés pris de suite, (ce qui se suppose toujours) contient deux fois la même quantité des nombres Triangulaires moins le dernier qu'elle ne contient qu'une fois. Car chaque nombre Triangulaire entre deux fois dans la composition d'un carré, hors le dernier qui n'y entre qu'une fois : 1. dans le 1.^{er}, qui est aussi 1. Et dans le 2.^d qui est 1 + 3 ; & 3 qui est entré dans le 2.^d carré, qui est 4, entre avec 6 dans le 3.^e qui est 9 ; & 6 avec 10 dans le 4.^e qui est 16 ; & 10 avec 15 dans le 5.^e qui est 25 ; & 15 avec 21 dans le 6.^e qui est 36.

F 7

On

134 NOUVEAUX ELEMENTS

On voit donc que si on en demeure-là, il n'y aura que 21, sixième nombre Triangulaire, qui n'entrera qu'une fois dans l'un des 6 premiers quarrez; & par conséquent tous les autres y entrant deux fois, il est donc clair que la somme des 6 quarrez ~~plus 1~~ doit être égale au double de la somme des 6 premiers nombres triangulaires.

IV. PROBLEME.

Lv. TROUVER la somme de tant de nombres quarrez de suite que l'on voudra, c'est à dire des 10 premiers, des 20, des 100, &c.

On n'a, selon ce qui vient d'être dit, qu'à avoir la somme d'autant de nombres Triangulaires; c'est à dire de ceux de la 3.^e bande, la doubler, & puis en ôter le dernier des nombres Triangulaires dont a trouvé la somme.

Le 10.^e nombre Triangulaire est 55. La somme des 10 premiers est 220, comme on l'a déjà fait voir. Le double est 440, d'où ôtant 55, on aura 385 pour la somme des 10 premiers quarrez.

Autrement. Faites comme si vous vouliez avoir la somme des 10 premiers nombres Triangulaires, en mettant au dessous 1, 2, 3, ou seulement 2, 3, car l'1 ne sert que pour l'analogie, & au dessus 10, 11; mais au lieu du troisième qui est 12, mettez la somme des deux premiers qui est 21, ainsi :

10, 11, 21.

2, 3.

Puis ayant divisé 10 par 2, ce qui donne 5, & 21 par 3, ce qui donne 7: multipliez les uns par les autres 5, 11, 7, ce qui donnera 55, 7; cela fait 385.

Cette dernière façon revient à l'autre; car il faut remarquer que si au lieu de prendre pour troisième nombre le premier plus 2, on prend le double du 1.^{er} plus 1: il se trouve toujours que ce

der-

DE GEOMETRIE. LIV. IV. 135

dernier, plus 3, est double de celui dont on se sert pour trouver la somme des Triangulaires : d'où il arrive que divisant l'un & l'autre par 3, celui dont on se sert pour les quarez, plus 1, est double de l'autre. 21 plus 3 est double de 12; & le tiers de 21 étant 7: $7 \rightarrow 14$ est double de 7 qui est le tiers de 21.

V. PROBLEME.

TROUVER la somme de tant de Cubes que l'on voudra en les prenant de suite, c'est à dire des 10 premiers, des 20 premiers, &c. LVI.

Le carré du nombre triangulaire qui répond au nombre des Cubes dont on veut avoir la somme est la somme des Cubes: c'est à dire que si on veut avoir la somme des 10 premiers Cubes, il ne faut que trouver le 10.^e nombre Triangulaire qui est 55, & son carré qui est 3025 sera le nombre des Cubes.

On le peut prouver en deux manieres, l'une plus subtile, & l'autre plus naturelle. La 1.^{re} dépend des deux propriétés des nombres triangulaires.

Car par la 1.^{re}, deux triangulaires qui se suivent font ensemble le carré du nombre qui répond au plus grand; c'est à dire que le 5.^e qui est 15, & le 6.^e qui est 21, font ensemble le carré de 6 qui est 36.

Et par la seconde ces deux mêmes Triangulaires ont 6 pour leur difference. D'où il s'ensuit que les prenant pour racines de deux quarez: ces quarez auront pour leur difference la somme de ces deux racines, qui est 36, multipliée par leur difference, qui est 6; c'est à dire qu'ils auront pour leur difference le cube de 6.

Or pour voir plus facilement ce qui suit delà, nous marquerons chaque nombre triangulaire par un

136 NOUVEAUX ELEMENS

un accent circonflexe que nous mettrons au dessus du nombre qui marque sa place; c'est à dire que 6 sera le sixième nombre Triangulaire qui est 21; 5 le cinquième qui est 15, & ainsi des autres.

Et pour les carrés de chacun nous mettrons seulement 6², 5². Et les Cubes des nombres ordinaires 6³, 5³, 4³, &c. Cela étant :

$$6^3 = \{ \begin{matrix} 6^3 \\ 5^3 \end{matrix} = \{ \begin{matrix} 5^3 \\ 4^3 \end{matrix} = \{ \begin{matrix} 4^3 \\ 3^3 \end{matrix} = \{ \begin{matrix} 3^3 \\ 2^3 \end{matrix} = \{ \begin{matrix} 2^3 \\ 1^3 \end{matrix} = \{ \begin{matrix} 1^3 \\ 0 \end{matrix}$$

D'où il s'ensuit que laissant là les carrés des autres nombres Triangulaires, parce que l'on a leurs équivalens, le seul carré du sixième nombre, qui est 441, est égal à la somme des six premiers nombres cubes.

L'autre raison est plus simple, & on la peut exprimer ainsi: La somme de tant de nombre cubiques de suite que l'on voudra, est le produit de la somme de toutes les racines multipliée par cette même somme de racines; car prenant, comme il le faut, ces nombres cubiques d'ordre, leurs racines seront toujours autant de nombres naturels que l'on prendra de Cubes dont on voudra sçavoir la somme.

Soient donc tant de nombres naturels que l'on voudra en commençant par 1.

Les multipliant par autant 1. 2. 3. 4. 5. 6. &c. d'autres tous les mêmes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. &c.

Il se fera autant de multiplications partiales, que sera le carré des termes que l'on prendra; c'est à dire que si on n'en prend que 5, il y aura 25 multiplications partiales. Si 6, il y en aura 36, &c.

Mais il faut remarquer 1. Que de ces multiplications partiales, les directes comme 2, 2. 3, 3. sont toujours simples, & que celles qui se font en croix, comme 2, 3; 3, 5, &c. sont toujours doubles.

En

DE GEOMETRIE. LIV. IV. 137

En second lieu, que c'est la même chose de multiplier 6 par 2 + 4 que de le multiplier séparément par 2, en disant 2, 6. & par 4 en disant 4, 6. Il faut seulement remarquer que la multiplication de 2 + 4 par 6, comprend deux des 36 multiplications partiales, qui doit avoir la multiplication des 6 premiers nombres par eux-mêmes & qu'y ajoutant *bis* cela en fait 4.

Cela supposé, voicy comme ces 36 Multiplications partiales feront les 6 premiers Cubes.

Denomb. des Mult. partiales.	Mult. partiales.	Cubes.
1 { 1	1, 1	1
3 { 1 2	2, 2 1, 2 <i>bis</i>	4 } 2, 4. 8
5 { 1 4	3, 3 1 + 2, 3 <i>bis</i>	9 } 3, 9. 27
7 { 1 4 2	4, 4 1 + 3, 4 <i>bis</i> 2, 4 <i>bis</i>	16 } 4, 16. 64
9 { 1 4 4	5, 5 1 + 4, 5 <i>bis</i> 2 + 3, 5 <i>bis</i>	25 } 5, 25. 125
11 { 1 4 4 2	6, 6 1 + 5, 6 <i>bis</i> 2 + 4, 6 <i>bis</i> 3, 6 <i>bis</i>	36 } 6, 36. 216

Somme 36.

On voit par là, que le premier nombre multiplié par soy-même ne donne qu'une multiplication qui fait un premier nombre cube.

Que les deux premiers 1. 2. multipliez aussi par eux-mêmes, (ce qui se doit toujours sous-entendre sans qu'il soit besoin de l'exprimer,) en don-

nent

138 NOUVEAUX ELEMENS

nent 4, dont une étant déjà prise, les trois autres donnent 8, second nombre cube.

Que les trois premiers 1. 2. 3. en donnent 9, dont 4 étant prises, qui ont donné les deux premiers cubes, les cinq qui restent donnent le 3.^e 27.

Que les quatre 1. 2. 3. 4. en donnent 16, dont 9 étant déjà prises, qui ont donné les trois premiers cubes; les 7 qui restent donnent le 4.^e 64.

Que les cinq 1. 2. 3. 4. 5. en donnent 25, dont 16 étant déjà prises, qui ont donné les 4 premiers cubes, les 9 qui restent donnent le 5.^e 125.

Que les six 1. 2. 3. 4. 5. 6. en donnent 36, dont 25 étant déjà prises, qui ont donné les cinq premiers cubes, les 11 qui restent donnent le 6.^e 216.

Et on voit sans peine que cela doit aller jusqu'à l'infiny.

Mais pour éviter l'embarras & la longueur de ces multiplications partiales, (ce qui n'a servi qu'à la preuve:) Il ne faut que prendre la somme de toutes ces racines, (c'est à dire de tant que l'on voudra de nombres naturels,) & la multiplier par elle-même; car il est visible que c'est la même chose de multiplier 3 par 3, que de multiplier 1 + 2 par 1 + 2.

Or la somme de ces nombres naturels est ce qu'on appelle nombre triangulaire; car 6 par exemple, est le nombre triangulaire de 3, parce que 1 + 2 + 3 font 6. Donc en multipliant le dixième nombre triangulaire qui est 55 par soy-même, on aura la somme des dix premiers cubes.

Or rien n'est plus facile que de trouver le nombre triangulaire de tel nombre que l'on veut; car si c'est un nombre impair, il ne faut que le multiplier par sa plus grande moitié: 5. 3. 5. 7. 4. 7. 9. 5. 9. 11. 6. 11. Et

DE GEOMETRIE. LIV. IV. 139

Et si c'est un nombre pair, il ne faut que prendre la moitié & multiplier par là ce nombre plus un. 6. 3, 7. 8. 4, 9. 10. 5, 11. 12. 6, 13. 14. 7, 15.

*Comment il se faut conduire dans tous les
Problèmes semblables à ceux de la mule
& de l'asneffe, des deux vases qui
ont un même couvercle, &c.*

PREPARATION.

Il faut écrire les hypothèses en donnant des noms aux quantitez inconnues. Exemple, *Mule, Asneffe.*

Le nombre des sacs que porte la mule soit appelé A ; & celui que porte l'asneffe B.

HYPOTHESES.

- | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|
| 1. ^{re} Hyp. $A - 3 = B + 3$ | $\left\{ \begin{array}{l} \text{Si la mule donne à} \\ \text{l'asneffe trois de ses} \\ \text{sacs, ils en auront au-} \\ \text{tant l'une que l'autre.} \end{array} \right.$ | <p>LVII.</p> |
| 2. ^{de} Hyp. $A + 1 = B - 3$ | | |
| | $\left\{ \begin{array}{l} \text{Si l'asneffe donne à} \\ \text{la mule l'un de ses sacs,} \\ \text{la mule en portera 3} \\ \text{fois autant que l'asnef-} \\ \text{fe.} \end{array} \right.$ | |

Ayant ces Hypothèses, il faut trouver les équivalens ; c'est à dire l'équivalent d'A par B plus ou moins ce qu'il faut, & l'équivalent de B par A plus ou moins ce qu'il faut.

Pour trouver les équivalens d'une Hypothèse : il faut ôter d'un membre les chiffres & laisser la lettre seule, & transporter les chiffres dans l'autre membre, en changeant le signe. Exemple :

EQUI-

EQUIVALENS.

$$\text{Par la 1.}^{\text{re}} \text{Hyp. } \begin{cases} A = B + 6. \\ B = A - 6. \end{cases}$$

$$\text{Par la 2.}^{\text{de}} \text{Hyp. } \begin{cases} A = 3B - 4. \\ 3B = A + 4. \end{cases}$$

Ayant ces équivalens, on refout sans peine les Problemes. Il ne faut pour cela que reprendre les Hypotheses: & si on veut refoudre le Probleme par la premiere, il faut se servir des équivalens de la seconde; & au contraire si on le veut refoudre par la seconde Hypothese, il faut se servir des équivalens de la premiere; & par là, on fera que dans l'équation de chaque hypothese il n'y ait que les mêmes lettres dans l'un & dans l'autre membre.

I. PROBLEME. HYPOTHESES.

$$\text{2 VII. } \begin{aligned} 1. & \begin{cases} A - 3 = B + 3. \\ A + 1 = 3B - 3. \end{cases} \end{aligned}$$

EQUIVALENS.

$$\text{Par la 1.}^{\text{re}} \text{Hyp. } \begin{cases} A = B + 6. \\ B = A - 6. \end{cases}$$

$$\text{Par la 2.}^{\text{de}} \text{Hyp. } \begin{cases} A = 3B - 4. \\ 3B = A + 4. \end{cases}$$

I. Solution par la 1.}^{\text{re}} \text{Hypothese en reduisant tout en B.}

$$\begin{aligned} 1.{}^{\text{re}} \text{Hypothese } & \begin{cases} A - 3 = B + 3. \\ A = 3B - 4. \end{cases} \\ \text{Equivalent de la 2.}^{\text{de}} & \begin{cases} A = 3B - 4. \end{cases} \end{aligned}$$

Je puis donc mettre au lieu d'A, $3B - 4$, donc mettant dans le second membre l'équation 7 qui est par moins dans le premier,

$3B$

DE GEOMETRIE. LIV. IV. 141

$$3 B = B + 10.$$

$$\text{Donc } 2 B = 10.$$

$$\text{Donc } B = 5.$$

II. Solution par la 1.^{re} Hypothese en reduisant tout en B.

$$2.^{de} Hypothese. \quad \begin{cases} A + 1 = 3 B - 3. \\ A = B + 6. \end{cases}$$

$$1.^{re} Eq. de la 1.^{re} Hyp. \quad \begin{cases} A = B + 6. \end{cases}$$

Mettant donc $B + 6$ au lieu d' A ,

$$B + 7 = 3 B - 3.$$

$$\text{Donc } B + 10 = 3 B.$$

$$\text{Donc } 10 = 2 B.$$

$$\text{Donc } 5 = B.$$

III. Solution par la 2.^{de} Hypothese en reduisant tout en A.

$$2.^{de} Hypothese. \quad \begin{cases} A + 1 = 3 B - 3. \\ B = A - 6. \end{cases}$$

$$1.^{re} Equiv. de la 1.^{re} \quad \begin{cases} B = A - 6. \end{cases}$$

Donc mettant au lieu de $3 B$, trois fois $A - 6$, qui font $3 A - 18$:

$$A + 1 = 3 A - 18 - 3, \text{ [c'est à dire } - 21;]$$

& transportant 21 dans le premier membre en changeant le signe:

$$A + 21 = 3 A.$$

$$\text{Donc } 21 = 2 A.$$

$$\text{Donc } 11 = A.$$

$$\text{Donc } A \text{ est } 11 \text{ \& } B \text{ } 5;$$

C'est à dire que la mule avoit 11 sacs, & l'asne 5 .

II. PROBLEME.

$$\text{Hypotheses } 1.^{re} \quad \begin{cases} A - 9 = B + 9. \\ A + 3 = 3 B - 9. \end{cases}$$

LIX.

$$2.^{de} \quad \begin{cases} A + 3 = 3 B - 9. \end{cases}$$

$$\text{Equivalens de } \begin{cases} A = B + 12. \end{cases}$$

$$\text{la } 1.^{re} Hypoth. \quad \begin{cases} B = A - 18. \end{cases}$$

Equiv.

Equivalens $\{ A = B - 12.$
la 2.^{de} $\{ 3B = A + 12.$

I. Solution par la 1^{re} Hypothese en reduisant tout en B.

1. re ~~nothefc~~ - 9 = B + 9.

1.^{er} Equilibre de la B.^{re} (A=3; B=12).

3 $B \equiv 12 \equiv 9$, [c'est à dire $21 \equiv B \rightarrow 9$].

Donc ${}_3B \equiv B + 30$.

Donc $2B \equiv 30$.

Donc $B = 15$.

II. Solution par la 2.^{de} Hypothese en reduisant tout en A.

2^{de} Hypothèse. $\zeta A \neg \vdash \equiv \vdash B \text{---} 9.$

2.^d Equiv. de la 1.^{re} $\{ B = A \rightarrow 18.$

$$A + 3 \equiv 3A - 63.$$

Donc $A \rightarrow +66 \equiv 3 \cdot A$.

Donc $66 \equiv 2 \pmod{A}$.

Donc $33 = A$. C'est à dire que A est 33 & B est 15.

III. Solution par la 2.^{de} Hypothese en reduisant tout en B.

$$3\text{ B} \longrightarrow 9 \equiv \text{B} + 2\text{I}.$$

Donc ${}_3B \equiv B + 30$.

Donc $2B \equiv 30$.

Donc $B \equiv 15$.

III. PROBLEME.

Ex. Hypotheses 1.^{re} $\begin{cases} A + 2000 = 4B. \\ 2.^{de} \end{cases}$ $\begin{cases} B + 1000 = \frac{1}{2}A. \end{cases}$

Equiv. de la 1.^{re} $\left\{ \begin{array}{l} A \equiv 4B - 2000. \\ \text{de la 2.^{de}$

I. Solution par la 1.^{re} Hypothese.

$$A + 2000 = 2A - 4000.$$

$$\text{Donc } A + 6000 = 2A.$$

$$\text{Donc } 6000 = A.$$

II. Solution par la 2.^{de} Hypothese.

$$B + 1000 = 2B$$

$$\text{Donc } B + 2000 = 2B.$$

$$\text{Donc } 1000 = B.$$

III. Solution par la 1.^{re} Hypothese.

$$A + 2000 = 4B.$$

$$\text{Donc } \frac{1}{4}A + 500 = B.$$

$$\text{Or } B = \frac{1}{2}A - 1000.$$

$$\text{Donc } \frac{1}{4}A + 500 = \frac{1}{2}A - 1000.$$

$$\text{Donc } \frac{1}{4}A + 1500 = \frac{1}{2}A.$$

$$\text{Donc } 1500 = \frac{1}{4}A.$$

$$\text{Donc } 6000 = A.$$

IV. PROBLEME.

$$\text{Hypothese } 1.^{\text{re}} \quad \begin{cases} A + 3000 = 3B. \\ 2.^{\text{de}} \quad \begin{cases} B + 1000 = \frac{1}{2}A. \end{cases} \end{cases}$$

LXI

$$\text{Equiv. de la } 1.^{\text{re}} \quad \begin{cases} A = 3B - 3000. \\ \text{de la } 2.^{\text{de}} \quad \begin{cases} B = \frac{1}{2}A - 1000. \end{cases} \end{cases}$$

I. Solution par la 1.^{re} Hypothese.

$$A + 3000 = A \frac{1}{2} - 3000.$$

$$\text{Donc } A + 6000 = A \frac{1}{2}.$$

$$\text{Donc } 6000 = \frac{1}{2}A.$$

$$\text{Donc } 12000 = A.$$

II. Solution par la 2.^{de} Hypothese.

$$B + 1000 = B \frac{1}{2} - 1500.$$

$$\text{Donc } B + 2500 = B \frac{1}{2}.$$

$$\text{Donc } 2500 = \frac{1}{2}B.$$

$$\text{Donc } 5000 = B.$$

V. PRO-

V. PROBLÈME.

- LXII. Hypothèse 1.^{re} $\begin{cases} A + 3000 = 9 B. \\ B + 5000 = \frac{1}{3} A. \end{cases}$
 Hypothèse 2.^{de} $\begin{cases} A + 3000 = 9 B. \\ B + 5000 = \frac{1}{3} A. \end{cases}$
 Equiv. de la 1.^{re} $\begin{cases} A = 9 B - 3000. \\ B = \frac{1}{3} A - 5000. \end{cases}$
 Equiv. de la 2.^{de} $\begin{cases} A = 9 B - 3000. \\ B = \frac{1}{3} A - 5000. \end{cases}$

I. Solution par la 1.^{re} Hypothèse.

$$\begin{aligned} A + 3000 &= 9 B - 3000. \\ \text{Donc } A + 4800 &= 9 B. \\ \text{Donc } 4800 &= 9 B - A. \\ \text{Donc } 2400 &= \frac{1}{2} A. \end{aligned}$$

II. Solution par la 2.^{de} Hypothèse.

$$\begin{aligned} B + 5000 &= \frac{1}{3} A - 5000. \\ \text{Donc } B + 6000 &= \frac{1}{3} A. \\ \text{Donc } 6000 &= \frac{1}{3} A - B. \\ \text{Donc } 3000 &= \frac{1}{2} B. \end{aligned}$$

VI. PROBLÈME.

- LXIII. Hypothèse 1.^{re} $\begin{cases} A - 25 = B + 25. \\ A + 25 = 2 B - 50. \end{cases}$
 Hypothèse 2.^{de} $\begin{cases} A - 25 = B + 25. \\ A + 25 = 2 B - 50. \end{cases}$
 Equiv. de la 1.^{re} $\begin{cases} A = B + 50. \\ B = A - 50. \end{cases}$
 Equiv. de la 2.^{de} $\begin{cases} A = 2 B - 75. \\ B = \frac{1}{2} A + 37 \frac{1}{2}. \end{cases}$

I. Solution par la 1.^{re} Hypothèse.

$$\begin{aligned} B + 25 &= 2 B - 100. \\ \text{Donc } B + 125 &= 2 B. \\ \text{Donc } 125 &= B. \end{aligned}$$

II. Solution par la 2.^{de} Hypothèse.

$$\begin{aligned} A + 25 &= 2 A - 150. \\ \text{Donc } A + 175 &= 2 A. \\ \text{Donc } 175 &= A. \end{aligned}$$



NOUVEAUX ELEMENS
DE
GEOMETRIE.

LIVRE CINQUIÈME.

DE L'ÉTENDUË.

DE LA LIGNE DROITE ET
CIRCULAIRE.

DES DROITES, PERPENDICULAIRES
ET OBLIQUES.

DEFINITIONS.



Oùs avons parlé jusques icy de la
grandeur en general: il faut mainte-
nant descendre à ses especes.

Toute grandeur est continuë,
comme est l'étenduë, le tems, le
mouvement: ou non continuë, comme le nom-
bre.

G°

La

146 NOUVEAUX ELEMENS

La continuë est ou successive, comme le tems, le mouvement.

Ou permanente, qui s'appelle generalement *espace* ou *étendue*.

Mais elle se considere ou selon toutes ses trois dimensions *longueur* & *profondeur*, & alors elle s'appelle *corps* ou *solide*.

Ou selon deux seulement, *longueur* & *largeur*, & alors elle s'appelle *surface* ou *superficie*, qui est ou plate, qui s'appelle *plan*, ou non plate, qui s'appelle *surface courbe*.

Ou selon une seulement, qui est la *longueur*, & alors elle s'appelle *ligne*, qui est ou droite ou courbe.

L'extrémité de la ligne s'appelle *point*, qui doit être conceu indivisible. Car s'il pouvoit être partagé en deux, l'une de ces moitez ne seroit pas à l'extrémité de la ligne.

Et par la même raison la ligne qui est indivisible selon la *largeur*, parce qu'elle est considérée comme n'en ayant point, est l'extrémité de la surface.

Et la surface qui est aussi indivisible selon la *profondeur*, est l'extrémité du corps.

PREMIER AVERTISSEMENT.

- II. LES idées d'une surface plate & d'une ligne droite sont si simples, qu'on ne feroit qu'embrouiller ces termes en les voulant définir. On peut seulement en donner des exemples pour en fixer l'idée aux termes de chaque langue.

SECOND AVERTISSEMENT.

- III. QUOI qu'il n'y ait point au monde d'étendue qui n'ait que *longueur* & *largeur* sans *profondeur*, ou *longueur* sans *largeur* ni *profondeur*, & encore moins

DE GEOMETRIE. LIV. V. 147

moins de point qui n'ait ni longueur, ni largeur, ni profondeur: ce que disent les Geomètres des surfaces, des lignes & des points ne laisse pas d'être vray; parce qu'il suffit pour cela qu'un corps qui est véritablement long, large & profond, je puisse n'en considérer que la longueur ou la largeur, sans faire attention à la profondeur. On mesure même la longueur seule sans m'arrêter ni à la largeur, ni à la profondeur. Ainsi pour mesurer un champ, je ne m'amuse pas à creuser pour sçavoir si la terre y est bien profonde, mais je regarde seulement combien il est long & large: Et pour sçavoir combien il y a de Paris à Orléans, je ne mesure pas la largeur des chemins, mais seulement la longueur. Et de même ce qu'on appelle Point n'est que la ligne même, entant qu'on n'y considère que la negation d'une plus longue étendue.

TROISIÈME AVERTISSEMENT.

ON doit commencer par la ligne comme par la plus simple étendue: & de plus pour en rendre la considération plus facile, lors que l'on compare plusieurs lignes ensemble, on les suppose toujours dans ces premiers élémens comme étant posées ou décrites sur un même plan, c'est à dire sur une même, superficie plate; ce qu'il suffit d'avoir dit une fois pour toutes.

IV.

PREMIERE SECTION.

DE LA LIGNE DROITE.

Nous n'avons point défini la ligne droite, parce que l'idée en est très claire d'elle même, & que tous les hommes conçoivent la même chose par ce mot. Mais il est bon de remarquer ce que nous concevons naturellement être renfermé dans

G 2

cette

cette idée, ce que l'on pourra prendre si l'on veut pour sa définition.

La ligne droite est la plus courte étendue entre deux points.

Et celle qui a le plus de courbure, est aussi la plus courte. — a donné occasion à Archimède d'en tirer le principe ou Axiome :

PREMIER AXIOME.

VI.

Si deux lignes sur le même plan ont les extrémités communes & sont courbes ou creuses vers la même part, celle qui est contenue est plus courte que celle qui la contient. J'ay dit courbes ou creuses, car cela n'est pas seulement vrai des lignes courbes comme dans la 1.^{re} figure mais aussi des droites comme dans la 2.^{de} lors que deux ou plusieurs lignes droites se joignant font un creux. Car alors deux ou plusieurs lignes droites sont considérées comme une seule ligne courbe qui seroit creusée vers ce côté-là.



Mais il faut bien remarquer ces mots, (vers la même part) car cela ne seroit pas vrai, si la même ligne courbe étoit creusée vers différens côtés comme dans la 3.^e figure : ou si diverses lignes droites considérées comme une seule ligne faisoient aussi des creux de différens côtés comme dans la 4.^e figure ; car alors la contenante pourroit être plus courte que la contenue.

SECOND AXIOME OU DEMANDE.

VII.

AYANT deux points donnez on peut mener une ligne droite de l'un à l'autre.

Et

DE GEOMETRIE. LIV. V. 149

Et on n'y en peut mener qu'une.

Laquelle par conséquent est l'unique & naturelle mesure de la distance entre ces deux points. L'instrument dont on se sert pour cela s'appelle *regle*.

TROISIÈME AXIOME OU DEMANDE.

LA simplicité de la ligne droite fait qu'en ayant une posée on la peut prolonger de part & d'autre jusques à l'infini, c'est à dire tant que l'on veut. VIII.

D'où il s'ensuit que la position d'une ligne droite ne dépend que de deux points.

Où, que connoissant deux points dans une ligne droite, nous la connoissons toute.

Où, que deux points étant donnez de position, toute la ligne droite est donnée.

QUATRIÈME AXIOME.

SI une ligne droite est immédiatement couchée sur une autre en une de ses parties, elle le sera en toutes, pourveu que l'une & l'autre soit prolongée autant qu'il faudra, & elles ne seront proprement qu'une même ligne. IX.

CINQUIÈME AXIOME.

DEUX lignes droites ne se peuvent couper qu'en un point. X.

SIXIÈME AXIOME.

DEUX lignes droites qui étant prolongées vers un même côté s'approchent peu à peu, se couperont à la fin. XI.

Euclide prend cette proposition pour un principe & avec raison; car elle a assez de clarté pour s'en

150 NOUVEAUX ELEMENS
 contenter, & ce seroit perdre le temps inutilement
 que de se rompre la teste pour la prouver par un long
 circuit.

SECONDE SECTION. DE LA LIGNE CIRCULAIRE. DEFINITIONS.

- XII. LA ligne que décrit sur un plan l'une des extrémités d'une ligne droite, son autre extrémité demeurant immobile, s'appelle *circulaire*, ou *circonférence*.
- XIII. ET l'espace que décrit toute la ligne s'appelle *cercle*.
- XIV. LE point immobile, *centre*, qui ne peut pas n'être point également distant de chaque point de la circonférence, puisque c'est toujours la même ligne qui a fait cette distance.
- XV. ET ainsi il est bien clair que toutes les lignes du centre à la circonférence sont égales.
- XVI. CES lignes s'appellent *rayons* ou *demydiametres*.
- XVII. LES lignes menées d'un point de la circonférence à un autre s'appellent *cordes*.
- XVIII. SI elles passent par le centre, elles s'appellent *diametres*, & elles coupent le cercle & la circonférence en deux parties égales, qui s'appellent *demycercles* & *demycirconférences*.
- XIX. LA partie de la circonférence qui se trouve entre les extrémités d'une corde s'appelle *arc*. Mais lors que cette corde est moindre qu'un diamètre, il y a deux portions de circonférence qui se terminent aux extrémités de cette corde: l'une plus grande que la demy-



DE GEOMETRIE. Liv. V. 151

demycirconference, & l'autre plus petite. Or quand on parle de l'arc d'une corde, si on n'ajoute autre chose, on entend celui qui n'est pas plus grand que la demycirconference; & qui soit bien remarqué.

TOUTE circonference se conçoit divisée en 360 parties égales qui s'appellent *degrés*.

XX.

CHACQUE degré en 60 minutes premières qu'on appelle simplement *minutes*: Chaque minute en 60 *secondes*, & chaque seconde en 60 *troisièmes*; & ainsi à l'infini.

XXI.

PREMIER AXIOME OU DEMANDE.

ON demande qu'ayant un intervalle donné, on puisse décrire une circonference de cet intervalle. Ce qu'on ne peut douter être possible, puis qu'il ne faut pour cela que concevoir que la ligne qui joindra les deux points de cet intervalle se remue, l'une de ses extremittez demeurant immobile.

XXII.

La machine la plus ordinaire dont on se sert pour la décrire sur le papier s'appelle, *compas*; qui a deux jambes, lesquelles étant ouvertes plus ou moins selon l'intervalle donné, l'une demeurant immobile, l'autre décrit la circonference.

SECOND AXIÔME OU DEMANDE.

OR comme il faut supposer dans cette operation que les deux jambes du compas gardent toujours la même distance entr'elles, il n'est rien de plus facile après avoir mesuré la longueur d'une ligne donnée par l'ouverture du compas, que de se servir de cette même ouverture pour décrire ailleurs une ligne égale à celle-là, ou de retrancher d'une autre ligne une portion qui soit égale à cette première. C'est pourquoi on peut hardiment mettre ce Problème entre les demandes qui n'ont pas besoin d'être prouvées;

XXIII.

G 4

Décrire

152 NOUVEAUX ELEMENS

Décrire une ligne égale à une ligne donnée, soit par le retranchement d'une autre ligne, soit par tout ailleurs.

TROISIÈME AXIOME.

- XXIV. LA machine concevoit que se forme la ligne circulaire est si simple, qu'il est impossible de concevoir qu'elle ne soit pas par-tout dans une entière uniformité. Et de là il s'ensuit que les Théorèmes suivans sont naturellement connus :

Les circonférences qui sont décrites d'un égal intervalle sont égales.

Et celles qui sont décrites d'un plus petit intervalle sont plus petites.

Et d'un plus grand sont plus grandes.

QUATRIÈME AXIOME.

- XXV. LES degrez de circonférences égales sont égaux, puis que ce sont aliquotes pareilles de grandeurs égales. Et par la même raison les degrez d'une petite circonférence sont plus petits que les degrez d'une plus grande.

CINQUIÈME AXIOME.

- XXVI. DANS un même cercle les cordes qui soutiennent des arcs égaux sont égales, & les arcs qui sont soutenus par des cordes égales sont égaux. C'est une suite évidemment nécessaire de l'entière uniformité de la circonférence. Il ne faut que de l'attention pour en appercevoir la certitude.

Il en est de même dans deux cercles égaux que dans le même cercle.

SIXIÈME AXIOME.

TOUTES les lignes tirées d'un point qui sont plus petites que les rayons du cercle, ont leur extrémité au dedans du cercle : & les autres, plus longues, elles l'ont au dehors ; si égales, dans la circonférence même. XXVII.

SEPTIÈME AXIOME.

LORS qu'on a d'une ligne l'une des extrémités donnée de position, & sa longueur, son autre extrémité doit être dans la circonférence du cercle décrit par un intervalle de cette longueur donnée. XXVIII.

TROISIÈME SECTION. DES LIGNES DROITES PERPENDICULAIRES.

DEFINITIONS.

NOUS avons déjà dit qu'une ligne droite n'en peut couper une autre droite qu'en un point. Mais la coupant elle le peut faire en deux manières. XXIX.

La première, est en ne penchant point plus vers un côté de la ligne coupée, que vers l'autre.

Et alors elles sont dites se couper *perpendiculairement*, & être *perpendiculaires* l'une à l'autre.

La seconde, en penchant plus vers un côté que vers l'autre, & alors elles sont dites se couper *obliquement*, & être *obliques* l'une au regard de l'autre.

Mais il ne faut pas confondre l'obliquité qui convient à une ligne droite par rapport à une autre ligne, avec la curvité qui convient à la ligne par sa nature même, & constituée une espèce de ligne opposée à la ligne droite.


AVERTISSEMENT.

- XXX. *Quoi que deux lignes qui se coupent, se coupent & soient coupées mutuellement : néanmoins afin qu'on ne se méprenne pas, nous appellerons l'une coupée & l'autre coupante.*

DEFINITION PLUS EXACTE
DE LA PERPENDICULAIRE.

- XXXI. *Pour former une notion plus distincte de deux lignes perpendiculaires, on les peut définir en cette sorte :*

Lors que deux points de la ligne coupée étant pris également distans de l'un des points de la ligne coupante, tout autre point de la ligne coupante se trouvera aussi être également distant de ces deux points de la ligne coupée la ligne coupante est perpendiculaire à la coupée, étant bien clair qu'elle ne peut alors incliner plus d'un côté que de l'autre.



AXIOME.

- XXXII. *Pour montrer que tous les points de la ligne coupante sont également distans de deux de la ligne coupée, il suffit d'en avoir deux dans la ligne coupante dont chacun soit également distant de deux points de la ligne coupée. Car de là il s'ensuivra que tous les autres le feront aussi.*

Je prétens que la seule considération de la nature de la ligne droite fait voir la vérité de cette proposition, & que sans cela il est impossible de garder dans la Geometrie l'ordre naturel des choses.

Car.

DE GEOMETRIE. LIV. V. 195

Car 1. puisque la position de la ligne droite ne dépend que de deux points, & qu'en ayant donné deux points elle est toute donnée, c'est à dire que la position de tous les autres points est déterminée : il est visible que la position de ces deux points de la ligne coupante, dont on suppose que ~~elle est~~ distant de deux points de la ligne coupée, détermine tous les autres à en être aussi également distans.

2. S'il y en avoit quelqu'un qui approchât plus de l'un des points que de l'autre, la ligne seroit nécessairement courbée de ce côté-là.

3. Il n'y auroit point de raison pourquoy il s'approcheroit plutôt d'un côté que de l'autre, ny pourquoy il s'approcheroit de tant, plutôt que de tant. Car la position de ces deux points donnez qui détermine tous les autres points de la ligne, ne les peut déterminer qu'à une égalité de distance, puis qu'ils n'ont pour eux mêmes que cette détermination-là.

4. Tous les Geometres semblent assez convenir de l'évidence de cette proposition, puisque dans la solution de tous les problemes qui regardent les perpendiculaires ; ils ne font autre chose que chercher deux points dans la ligne coupante, dont chacun soit également distant de deux points de la ligne coupée. Et ainsi quelque circuit qu'ils cherchent pour montrer que leur probleme est résolu par là : il est clair néanmoins que dans la nature des choses ce n'est que cela seul qui l'a résolu.

5. Quoy qu'il en soit, je soutiens que quiconque voudra agir de bonne foy reconnoîtra que considérant les choses avec attention, il lui est impossible de concevoir que cela puisse être autrement ; & qu'il repugne à l'idée que nous avons naturellement de la ligne droite, que deux de ses points étant posez directement, comme nous avons dit, sur une autre ligne : quelqu'un des autres s'écarte ou à droit ou à gauche, & s'approche ainsi plus près de l'un des côtés de la ligne.

156 NOUVEAUX ELEMENS

Or il me semble très inutile de chercher bien-loin & par de longs détours des preuves d'une chose dont il nous est impossible de douter, pour peu que nous y veuillions faire attention.

6. Ce qui doit faire varier le scrupule qu'on pourroit avoir, c'est qu'on ne peut faire autrement sans troubler l'ordre naturel des choses, & employer des triangles pour démontrer les propriétés des lignes; c'est à dire se servir du plus composé pour expliquer le plus simple, ce qui est tout à fait contraire à la véritable méthode.


Soit donc de justice ou de grace, nous demandons qu'on nous accorde cette proposition, qui donne un moyen très facile de démontrer les Problèmes suivant sans se servir des triangles, comme fait Euclide.

PREMIER PROBLEME.

XXXIII. D'un point donné hors une ligne donnée tirer une perpendiculaire sur cette ligne : on suppose que cette ligne soit prolongée s'il en est besoin, & que le point donné ne se puisse pas rencontrer dans la ligne prolongée, car alors il ne seroit pas proprement hors cette ligne.

Soit le point K, & la ligne

Z. De K pris pour centre & décrivant un cercle qui coupe Z, & par conséquent y marque deux points comme M & N, également distans de K, puisque MK, & NK seront rayons du même cercle. Cela fait, décrivant deux cercles égaux d'*m* & d'*n* qui s'entrecoupent partout ailleurs qu'en K, comme en B : la ligne qui joindra B & K. sera perpendiculaire à la ligne-Z, ce qu'il falloit faire. Car K & B sont chacun également distans de deux points de Z, *m* & *n*, & par




con-

DE GEOMETRIE. Liv. V. 157

consequent tous les autres en feront aussi également distans par la précédente, & ainsi la ligne sera perpendiculaire par la définition.

SECOND PROBLÈME.

D'un point donné dans une ligne élever une perpendiculaire. Soit le point K dans la ligne Z, qui étant pris pour centre, le cercle que l'on décrira de ce centre coupera la ligne Z, prolongée s'il en est besoin, en deux points comme M & N, qui seront également distans de K. Donc l'intersection de deux cercles égaux qui auront M & N pour centres donnera le point B, auquel il faudra mener la ligne du point K pour faire la perpendiculaire que l'on cherche.



C'est la même preuve que du Problème précédent ; car K & B seront chacun également distans d'M & N.

TROISIÈME PROBLÈME.

Couper une ligne donnée en deux parties égales. Soit la ligne donnée *m n*. En tirant des deux extrémités *m* & *n*, prises pour centres, deux cercles égaux qui s'entrecoupent en deux points comme *k* & *b* : ou tirant des mêmes centres deux arcs de cercles égaux qui s'entrecoupent en un point comme en *k*, & deux autres arcs de cercles égaux ou inégaux aux premiers, mais égaux entr'eux, qui s'en-



258 NOUVEAUX ELEMENTS

trécoupent aussi en un autre point comme en b : la ligne $k b$ prolongée autant qu'il sera besoin coupera la ligne $n n$ en deux parties égales. Car si le point de la section est z : comme il est dans la ligne $b k$, qui est perpendiculaire à $n n$, parce que b & k sont également distans d' m & n : z aussi en sera également distant, & par conséquent $m z$ sera égale à $z n$. Ce qu'il falloit démontrer.



I. THEOREME.

XXXVI. LA perpendiculaire est la plus courte de toutes les lignes qui puissent estre menées d'un point à une ligne.

Soit le point K & la ligne Z , sur laquelle ayant mené de K la perpendiculaire $K b$, & l'ayant prolongée jusques en c , en faisant $b c$ égale à $K b$: si on tire de K d'autres lignes sur la ligne Z , comme en m & n , je dis que $K b$ est plus courte que $K m$, ou $K n$. Car ayant tiré les lignes $m c$ & $n c$, je dis que $K m$ est égale à $m c$, & $K n$ à $n c$; puisque la ligne Z étant perpendiculaire à la ligne $K c$, le point b qui est commun à ces deux lignes ne peut être, comme il est, également distant de K & de c , que les autres points comme m & n ne soient aussi chacun également distans de K & de c .



Or cela étant, il est clair que la ligne $K b c$ étant droite est plus courte que les lignes $K m c$, qui ne font pas une ligne droite; & par conséquent $K b$, qui est la moitié de $K b c$, est plus courte que $K m$, qui est la moitié de $K m c$.

II. THEO.

II. THEOREME.

ON ne peut élever du même point d'une ligne xxxvii. plus d'une perpendiculaire, ni en mener plus d'une d'un même point à une ligne. Le premier est clair de soi-même; car ayant élevé du milieu de la ligne mn la perpendiculaire bK , il est visible que si on en vouloit élever une autre du même point b , on ne la pourroit tirer que plus vers un côté que vers l'autre, ce qui est directement contraire à la notion de perpendiculaire.



La 2.^{de} partie est encore très manifeste, & se peut néanmoins prouver de cette sorte: Soit menée de K sur m la perpendiculaire KB , en sorte que B soit également distant d' m & n , dont par conséquent K doit être aussi également distant: si on menoit de K une autre perpendiculaire à un autre point comme à g , il faudroit que g fût également distant d' m & d' n , puisque k qui seroit un des points de cette ligne en est également distant. Or cela est impossible, puisque si g étoit entre B & m , il seroit plus près d' m que d' n ; & s'il étoit entre B & n , il seroit plus près d' n que d' m .



I. COROLLAIRE.

LA perpendiculaire est la mesure de la distance xxxviii. d'un point hors d'une ligne à cette ligne, & de la ligne à ce point.

Car étant unique & la plus courte de toutes les lignes qui peuvent être menées d'un point à une ligne,

160 NOUVEAUX ELEMENS

ligne, on n'en pourroit prendre aucune autre qui fût si propre à mesurer cette distance.

II. COROLLAIRE.


XXXIX. Deux lignes étant perpendiculaires à une même ligne, il est impossible qu'elles se rencontrent, quoi que prolongées à l'infini.

Car si elles se rencontroient, elles auroient un point commun, & ainsi il y auroit deux lignes menées d'un même point qui seroient perpendiculaires à une même ligne, ce qu'on a fait voir être impossible, 37. *Sup.*

III. COROLLAIRE.

XL. Lors que d'un point hors une ligne on a tiré une oblique sur cette ligne, si du même point on tire une perpendiculaire sur la même ligne, cette perpendiculaire tombera du côté que l'oblique est inclinée sur cette ligne.

Soit la ligne bC , & le point k dont ait été tirée l'oblique kg , qui soit inclinée vers b : je dis qu'il est clair par ce qui a été dit de la perpendiculaire, que si du même point k on en tire une sur bC , elle tombera entre b & g , & non pas entre g & C ; car il est visible que si elle tomboit entre g & C , tant s'en faut qu'elle fût perpendiculaire, qu'elle seroit encore plus oblique que kg .




De plus ayant pris dans la ligne bC deux points également distans de k , comme pourroient être b & C : le point où tombera la perpendiculaire doit être également distant de ces deux points b & C , (32. *S.*) & au contraire celui où tombe l'oblique

que doit être plus éloigné du point vers lequel elle est inclinée ; & par conséquent la perpendiculaire doit tomber du côté vers lequel cette ligne est inclinée.

IV. COROLLAIRE.

SI d'un point où une oblique coupe une ligne on veut élever une perpendiculaire sur cette ligne, elle s'élèvera du côté vers lequel cette oblique n'est pas inclinée. XLII.


Soit la ligne bC coupée par l'oblique kg inclinée vers b . Si du point g on veut élever une perpendiculaire sur bC , elle s'élèvera du côté de C , & non du côté de b ; c'est à dire qu'elle se trouvera entre les lignes kg & gc , & non pas entre kg & gb . Car il est visible que si elle se trouvoit entre kg & gb , elle seroit encore plus inclinée que kg .



III. THEOREME.

LA perpendiculaire indefinie qui coupe par la moitié la distance de deux points comprend tous les points du même plan, dont chacun peut être également distant de ces deux points. XLIII.

Soient les points m & n joints par la ligne mn , & la perpendiculaire indefinie kB , qui la coupe par la moitié au point B . Il est clair que tous les points de la ligne kB sont également distans d' m & d' n . Mais je dis de plus, qu'il n'y en peut avoir aucun autre hors cette ligne



qui en soit également distant. Car il faudra qu'il soit à l'un des côtez comme seroit g , d'où tirant une perpendiculaire sur mn (par 33. S.) elle la coupera en un autre point que B , comme seroit p . Or si g étoit également distant d' m & d' n , il faudroit que p , qui seroit un point de la perpendiculaire, fût également distant, ce qui est visiblement impossible, comme on l'a déjà vu.

QUATRIÈME SECTION.

DES LIGNES DROITES OBLIQUES.

Explication de la maniere dont on doit considérer les Lignes obliques pour les mieux comprendre.

XLIII. Nous avons déjà dit que lors qu'une ligne droite en coupe une autre en penchant plus d'un côté que de l'autre, elle s'appelle oblique au regard de cette ligne qu'elle coupe obliquement.

Mais pour mieux juger de la grandeur de ces obliques en les comparant les unes aux autres, il est bon de ne les considérer que selon le côté selon lequel elles approchent plus de la ligne qu'elles coupent, qui est aussi la façon la plus naturelle de considérer ces lignes.

De plus, nous ne regarderons les obliques que comme menées d'un certain point à la ligne qu'elles coupent, & comme terminées à cette ligne.

Cela étant supposé, ce que j'entens par l'obliquité d'une ligne sur une autre, est que cette ligne soit plus couchée sur la ligne qu'elle coupe, que ne feroit la perpendiculaire menée du même point sur la même ligne. De sorte que c'est toujours par rapport à cette perpendiculaire que je considère cette obliquité.

Mais


DE GEOMETRIE. Liv. V. 163

Mais ce rapport renferme deux choses. 1. La distance du point qui est commun à l'oblique & à la perpendiculaire d'avec le point de la ligne où la perpendiculaire tombe, qui est la même chose que la longueur de cette perpendiculaire.

2. La distance du point où l'oblique tombe d'avec celui où tombe la perpendiculaire, que j'appelle l'éloignement du perpendicule.

A quoi il faut ajouter la distance du point d'où l'oblique est menée d'avec celui où elle coupe la ligne au regard de laquelle elle est appelée oblique: qui est la même chose que la longueur de cette oblique.

Soit par exemple la ligne Z indéfinie, sur laquelle on fasse descendre du point K au point B l'oblique KB, & que de K on tire la perpendiculaire KC. Les trois distances dont nous venons de parler font trois lignes; dont deux (sçavoir la perpendiculaire KC, & l'éloignement du perpendicule BC) se coupent perpendiculairement, & la troisième, qui est l'oblique KB, rencontre obliquement l'une & l'autre.




Et ainsi cette oblique peut être considérée tantôt comme l'oblique de l'une, tantôt comme l'oblique de l'autre. Mais alors il faudra changer alternativement aux deux autres lignes les noms de perpendiculaire & d'éloignement du perpendicule. Car si je considère KB comme oblique sur BC: KC est la perpendiculaire, & BC l'éloignement du perpendicule. Et au contraire si je considère KB comme oblique sur KC: BC sera la perpendiculaire, & KC l'éloignement du perpendicule.

On pourroit aussi considérer BC & KC comme obliques sur KB, (car comme les lignes sont mu-

mu-

mutuellement perpendiculaires, elles sont aussi mutuellement obliques.) Mais pour suivre notre méthode, il faudroit alors mener une perpendiculaire du point C à la ligne ZB, qui seroit Cg.



Et si l'on considère B C comme oblique sur la ligne B K ; la perpendiculaire seroit C g , & l'éloignement du perpendicule seroit g B. Mais à moins que de faire cela , K B seule est considérée comme oblique , tantôt au regard de l'une , tantôt au regard de l'autre.

La considération de ces trois lignes , K B oblique , K C perpendiculaire , B C éloignement du perpendicule , nous fera comprendre plusieurs choses des lignes obliques qui n'ont pû encore être expliquées que par des triangles , ce qui est un ordre tout renversé. Et nous verrons d'une part que dans la comparaison des obliques l'égalité en deux de ces lignes donne l'égalité dans la troisième ; & nous examinerons de l'autre quand il n'y a égalité que dans une , quelle est l'inégalité des deux autres.

PROPOSITION FONDAMENTALE

DE LA MESURE DES LIGNES OBLIQUES.

XLIV. Les lignes obliques menées du même point à une même ligne sont plus longues , plus elles sont éloignées du perpendicule.

Soient du point K menées sur la ligne Z la perpendiculaire K B , & les obliques K f & K g. Et soit prolongée K B jusques en C, en sorte que B C soit égale à K B. Et soient aussi menées les lignes

lignes fC & gC : je dis premierement que Z étant perpendiculaire à KB , comme le point B , qui est commun à l'une & à l'autre est également distant de K & de C . Donc Kf est égale à fC , & Kg à gC . Or par la maxime d'Archimede KfC est plus courte que KgC . Donc Kf , qui est la moitié de KfC , est plus courte que Kg , qui est la moitié de KgC . Ce qu'il falloit démontrer.




COROLLAIRE.

Il est visible que ce n'est que la même chose si l'on dit que de toutes les obliques qui seront menées au même point d'une même ligne de divers points d'une perpendiculaire à cette ligne pris du même côté, celles qui sont menées des points plus proches de la ligne où tombe l'oblique sont les plus courtes.

XLV.


Car il ne faudra alors que tirer d'autres lignes des mêmes points de cette perpendiculaire vers un même point de l'autre côté de la ligne qui coupe cette perpendiculaire également distant de cette perpendiculaire. Si je veux montrer, par exemple, que la ligne Kf est plus longue que Cf , je n'ay qu'à prendre le point E autant distant de B , qu' f est aussi distant de B , & tirer les lignes KE & CE , & faire ensuite la démonstration précédente.




AVER-

AVERTISSEMENT.

KLVI. C'EST la même chose pour juger de la grandeur de deux lignes obliques de les considérer comme menées du même point ~~à la même ligne~~, ou comme menées de deux points différens sur la même ligne, ou deux différentes lignes : pourvu que l'on suppose que chaque point est également distant de la ligne à laquelle on mène l'oblique. Car il est visible qu'il n'y a que cette distance qui y fasse quelque chose.



Il est vrai qu'il faut supposer pour cela que si l'on a d'une part la ligne x , & de l'autre la ligne Z , & qu'on élève d'un point de chacune, comme de b & d , une perpendiculaire, & que dans chaque perpendiculaire on prenne un point comme c & n , qui soit de part & d'autre également distant du point de la section b & m ; & qu'on prenne aussi dans chaque coupée x & Z un point comme f & p , également distant de part & d'autre du même point de la section b & m : les obliques cf & np sont égales.



Mais la vérité de cette supposition est naturellement connue, & si on la peut contester de paroles, comme les Pyrrhoniens ont fait voir qu'il n'y a rien qu'on ne puisse contester en cette manière: il est certain au moins qu'il est impossible à tout esprit raisonnable d'en avoir intérieurement le moindre doute, ce qui est la plus grande certitude qu'on doive désirer dans les sciences.

Neanmoins si on en veut être convaincu par une preuve

preuve grossiere & materielle, on peut se servir de celle dont Euclide prouve que deux angles étant égaux, & ayant les côtes égaux aux côtes, la baze est égale à la baze; qui est qu'il fait mettre ces angles l'un sur l'autre, en sorte que les extrémités des côtes se trouvent ensemble; d'où il s'en suit que les bazes sont aussi couchées l'une sur l'autre, ce qu'on appelle en Latin congruere, & par conséquent égales. Car on peut de mêmes icy s'imaginer que la ligne z est couchée sur la ligne x , en sorte que le point m est immédiatement sur le point b , & la perpendiculaire sur la perpendiculaire: D'où il arrivera nécessairement que le point n sera sur le point c , & le point p sur le point f , & qu'ainsi les obliques np & cf seront couchées l'une sur l'autre, & ainsi entièrement égales.

Voilà ce qui peut satisfaire ceux qui aiment mieux se servir dans la connoissance des choses de leur imagination que de leur intelligence: ce que je trouve fort mauvais, parce que l'Esprit se rend par là incapable de bien comprendre les choses spirituelles, s'accoutumant à ne recevoir pour vray que ce qu'il peut concevoir par des phantômes & des images corporelles: au lieu qu'il y a beaucoup de choses que nous sçavons très certainement, sans que nous les puissions concevoir par l'imagination; comme quand je dis, Je pense, donc je suis: nul phantôme ou image corporelle ne me peut servir à me faire concevoir ce que j'entens par ces mots, je pense, je suis.

EGALITÉ DANS LES LIGNES OBLIQUES.


CETTE seule proposition avec son corollaire & XLVII. l'avertissement nous donne moyen de prouver facilement plusieurs theorèmes touchant les lignes obliques. Et voici premièrement ceux de l'égalité:

I. THEO-

I. THEOREME.

XLVIII. DES trois lignes que nous avons dit se devoir considérer dans les lignes obliques, la perpendiculaire, l'éloignement ~~perpendiculaire~~, & l'oblique même : deux ne peuvent être égales que la troisième ne le soit aussi. Ainsi 1. s'il y a égalité dans la perpendiculaire & dans l'éloignement du perpendiculaire, les lignes obliques sont égales.

Soient du point K de la ligne Kb , qui coupe perpendiculairement la ligne Z en b , menées les deux obliques Km & Kn . La perpendiculaire étant la même, & par conséquent égale à soi-même : si bm , qui est l'éloignement du perpendiculaire de l'oblique Km , est égal à bn , qui est l'éloignement du perpendiculaire de l'oblique Kn : Km & Kn seront égales. Car les points m & n ne peuvent être également distans de b , l'un des points de la perpendiculaire Kb , qu'ils ne soient aussi également distans de tout autre point de cette perpendiculaire, & par conséquent de K . Donc Km est égale à Kn .



I. COROLLAIRE.

XLIX. ON ne peut mener d'un point à une ligne que deux lignes égales. Car on n'en peut mener qu'une seule perpendiculaire. Et pour les obliques, elles ne peuvent être égales que les deux points où elles coupent cette ligne ne soient également distans du point où tombe la perpendiculaire. Or il ne peut y avoir que deux points, l'un d'un côté & l'autre de l'autre, qui soient également distans de ce point.

Car

Car tout autre en fera , ou plus proche ou plus éloigné , comme il est évident. Donc , &c.

II. COROLLAIRE.

Il est impossible qu'un même point soit également distant de trois points d'une ligne droite.

L.

C'est la même chose que la précédente différemment énoncée.

II. THEORÉME.

S'IL y a égalité dans la perpendiculaire & dans l'oblique , il y a égalité dans l'éloignement du perpendiculaire.

L I.


Soit fait comme devant. Si Km est égale à Kn , Bm sera égale à Bn . Car si m étoit plus éloignée de B que n'est n , l'oblique Km seroit plus éloignée de la perpendiculaire , & par conséquent plus longue par la proposition principale ; ce qui est contre l'Hypothèse.

III. THEORÉME.

S'IL y a égalité dans l'oblique & dans l'éloignement du perpendiculaire , il y en a dans la perpendiculaire.

L I I.

Car si la perpendiculaire de l'une étoit plus grande que la perpendiculaire de l'autre , c'est comme si des deux obliques qui se terminent en m & n l'une



descendrait du point k de la perpendiculaire kB , & l'autre du point C plus bas que k de cette même

H

me

me perpendiculaire $k B$, de sorte que l'une seroit $k m$, & l'autre $c n$.

Or si cela étoit, $c n$ seroit plus petite que $k m$, par 44. & 45. *sup.* ce qui est contre l'hypothèse.

THEORÉME.

LIII. QUAND il n'y a égalité donnée que dans l'une de ces trois lignes, voici ce qui est des deux autres :


1. S'il n'y a égalité que dans la perpendiculaire, le plus grand éloignement du perpendiculaire donne la plus grande oblique, & la plus grande oblique donne le plus grand éloignement du perpendiculaire. C'est ce qui a été prouvé dans la proposition principale.

V. THEORÉME.

LIV. 2. S'IL n'y a égalité que dans l'éloignement du perpendiculaire, la plus grande perpendiculaire donne la plus grande oblique, & la plus grande oblique la plus grande perpendiculaire ; & alors la plus grande oblique est la moins oblique.

Il y a deux parties, dont la première a été prouvée par le Corollaire de la proposition fondamentale ; & pour l'autre, elle en est une suite évidente. Car si deux obliques se terminent au même point d'une ligne comme $K m$, &

$c m$, & qu'elles soient menées de deux points différens de la même perpendiculaire, comme de K & de c : il est clair que $c m$ est plus couchée sur $m B$ que $k m$. Or c'est la même chose,





chose, si ayant pris n autant distant de B quel est m , on tire $c n$ au lieu de $c m$.

VI. THEORÉME.

S'IL n'y a égalité que dans la longueur des obliques, le plus grand ~~est~~ perpendiculaire donnera une moindre perpendiculaire, & une moindre perpendiculaire donnera un plus grand éloignement du perpendiculaire. Cela est clair par les Theorèmes precedens.

LVI.

Car soit la perpendiculaire $k B$ sur la ligne $m n$. Si on tire l'oblique $C m$, & qu'on prenne un autre point plus près de B , comme n : il est visible que $C n$ seroit plus courte que $C m$ par le 4.^e Theorème; & par consequent afin qu'on mène à n de quelque point de la ligne $K B$ une oblique égale à $C m$, il faudra la tirer d'un point plus éloigné de B que n'est C , comme de K .




AVERTISSEMENT.

JE nedis rien de la diverse obliquité que la même ligne a sur les deux lignes qui peuvent être réciproquement considérées comme sa perpendiculaire & son éloignement du perpendiculaire, comme Cm sur $B C$ & sur Bm : car cela est trop facile à juger par ce qui est dit.

LVI.

VII. THEOREME.

- LVII. LORS que deux lignes obliques sont menées d'un même point sur une même ligne, la distance des deux points de section est égale à la distance du perpendiculaire de l'une plus ou moins la distance du perpendiculaire de l'autre. Plus, si les lignes sont inclinées de différent côté; moins, si elles sont inclinées du même côté.



Soient menées du point K sur la ligne z les deux obliques $K m$ & $K n$, inclinées de différent côté, & une autre comme $K P$, inclinée du même côté que $K m$. Il est visible que la perpendiculaire $K B$ se trouvera entre $K m$ & $K n$, mais au delà de $K m$ & de $K P$: & ainsi la distance entre les points de section m & n sera égale à l'éloignement du perpendiculaire de $K m$, qui est $m B$, plus l'éloignement du perpendiculaire de $K n$, qui est $B n$.

Mais si on considère $K m$, & $K P$, inclinées du même côté : il est visible que la distance d' m & P , points de section de ces deux obliques, est moindre que l'éloignement du perpendiculaire de $K m$, qui est $m B$, de la longueur de $P B$, qui est l'éloignement du perpendiculaire de l'autre oblique $K P$.


VIII. THEOREME.

- LVIII. DEUX lignes obliques inégales entr'elles & inclinées de différent côté étant menées du même point sur la même ligne : & deux autres obliques, dont chacune est égale à chacune des deux premières, étant aussi menées d'un autre point sur une même

même ligne, & y étant aussi inclinées de différent côté: si la distance des points de section des deux premières obliques est égale à la distance des points de section des deux dernières, les deux points dont elles sont menées sont également distans de la ligne à laquelle elles sont menées.

Soient sur la ligne X menées du point K les deux obliques Kb & Kd , & du point b deux autres obliques bp & bq , en sorte que Kb soit égale à bp , & Kd à bq , & que les points b & d soient autant distans que le sont p & q ; je dis que les points K & b sont également distans de la ligne X ; ou, ce qui est la même chose, que les perpendiculaires menées de ces deux points sont égales.

Car la distance des points b & d ne peut être égale à la distance des points p & q , que les éloignemens du perpendiculaire de Kb & Kd pris ensemble ne soient égaux à ceux de bp & bq pris ensemble: ce qui ne seroit pas si K étoit plus éloigné d' X que b . Car alors Kb étant égale à bp auroit son éloignement du perpendiculaire plus petit que ne l'auroit bp , puis qu'elle descendroit d'un point plus éloigné que ne descend bp , (par *sup.*) de mêmes Kd auroit son éloignement du perpendiculaire plus petit que bq ; Et ainsi les deux éloignemens du perpendiculaire de Kb & de Kd pris ensemble seroient plus petits que ceux de bp & bq pris ensemble.





NOUVEAUX ELEMENS DE GEOMETRIE.

LIVRE SIXIÈME.

DES LIGNES PARALLE- LES.

I.



APRES avoir parlé des lignes droites qui se rencontrent, soit perpendiculairement, soit obliquement, on peut considérer dans les lignes une autre propriété toute opposée, qui est de ne se rencontrer jamais, & d'être toujours également distantes l'une de l'autre, & c'est ce qu'on appelle des lignes parallèles.

DEUX

DEUX NOTIONS DES LIGNES PARALLELES,

L'UNE NEGATIVE ET L'AUTRE POSITIVE.

MAIS ces lignes peuvent être considérées selon deux notions différentes, l'une negative & l'autre positive. II.

La negative est de ne se rencontrer jamais, quoi que prolongées à l'infini.

La positive, d'être toujours également distantes l'une de l'autre, ce qui consiste en ce que tous les points de chacune sont également distans de l'autre; c'est à dire que les perpendiculaires de chacun des points d'une ligne à l'autre ligne, sont égales. Et il est bien clair que la notion negative est une suite nécessaire de la positive, ne se pouvant pas faire que deux lignes se rencontrent si elles demeurent toujours également distantes l'une de l'autre.

C'est pourquoy c'est avoir tout fait que d'avoir trouvé des marques certaines par lesquelles on puisse reconnoître que deux lignes sont paralleles selon la notion positive, c'est à dire qu'elles soient tellement disposées, que les points de chacune soient également distans de l'autre; ce qui suppose toujours qu'elles soient prolongées autant qu'il est nécessaire, afin que des points de l'une on puisse tirer des perpendiculaires sur l'autre.

C'est ce que nous trouverons facilement après avoir établi quelques Lemmes.

AVERTISSEMENT

POUR LES LEMMES SUIVANS.

III. LORS que dans les Lemmes suivans je compare diverses lignes qui coupent les deux mêmes, je suppose toujours deux choses :

L'une, que ces coupées, dont l'une sera toujours nommée x & l'autre z , ou ne se joignent point, ou se joignent simplement sans se traverser : c'est à dire qu'on les considère toujours comme n'ayant point changé de côté l'une au regard de l'autre.

L'autre, que ces coupantes soient enfermées entre les coupées, & c'est aussi ce que j'entens dans tout ce Livre quand je parle des lignes entre parallèles.

I. LEMME.


IV. QUAND les deux lignes x & Z sont coupées par bC perpendiculaire sur x & oblique sur Z , il arrive trois choses :

1. Que toutes les autres K lignes menées de Z perpendiculairement sur x , sont obliques sur Z .

2. Qu'elles sont inclinées sur Z du même côté que Cb l'est aussi sur Z , lequel côté j'appellerai K .

3. Que les perpendiculaires sur Z sont obliques sur x , & inclinées sur x du même côté que Cb l'est sur Z , c'est à dire vers K .


Les deux premières parties se prouvent ensemble, & la preuve de ces deux premières emporte celle de la 3.^e




PREU-

PREUVE DES DEUX PREMIERES PARTIES.

Soient pris deux points f & p sur la ligne Z , aux deux côtes de b , d'où soient menées fg & pg perpendiculairement sur la ligne x ; il faut prouver qu'elles seront obliques sur Z , & inclinées vers K .



Soit tirée de c une perpendiculaire sur Z ; elle sera vers K , & non pas vers p , par V. 40. Et ainsi le point où cette perpendiculaire tombera sur Z sera




ou le même point que f .

ou au delà de f .

ou entre f & b .

1.^{er} Cas. Si c'est le même point que f : cf étant perpendiculaire sur la ligne Z , gf sera oblique sur Z , & inclinée vers K .

2.^d Cas. Si ce point est au delà de f , comme en d , alors cd coupera fg . Que ce soit en a . Donc ad étant perpendiculaire



sur Z , af (qui est la même chose que gf) sera oblique sur Z , & inclinée vers a , & par conséquent vers K .

3.^e Cas. Si d est entre f & b : de d menant dh perpendiculaire sur x , & de b , bl perpendiculaire sur Z ; si hl se termine ou à f , ou au delà de f , on prouvera de la même sorte que dans

H ;

le

178 NOUVEAUX ELEMENS

le premier & dans le second Cas, que gf est oblique sur Z , & inclinée vers K .

Et si bl n'alloit pas jusques à f , on

tireroit encore d' l ,

lm perpendiculaire

sur x & d' m une perpendiculaire sur Z , jusques à ce qu'il y en ait une qui se termine à f , ou au delà d' f .

On prouve de la même sorte que qp est oblique

sur Z , & inclinée

vers K ; excepté qu'on

élèvera de b une perpen-

diculaire sur la ligne Z ,



qui coupera la ligne x au

delà de c , par V. 41. Et

ainsi tombera ou à q . ou

au delà de q . ou entre c & q .

Ainsi en l'une ou l'autre de ces trois manieres; on prouvera que $p q$ est oblique & inclinée vers K , comme on l'a prouvé d' $f g$.




PREUVE DE LA TROISIÈME PARTIE.

Elle est comprise dans la preuve des deux premières, étant clair que toutes les lignes qui ont été perpendiculaires sur Z , ont été obliques sur x , & inclinées vers K .

II. LEMME.

V. Si les lignes x & Z sont coupées par bc , perpendiculaire sur x , & oblique sur Z , & inclinée vers K : toutes les lignes menées des points de Z perpendiculaire-



ment


DE GEOMETRIE. LIV. VI. 179

ment sur x , seront inégales; & les plus courtes seront celles qui seront vers K , c'est à dire vers le côté où la ligne $b c$ est inclinée.

Il suffira de prouver que $b c$ étant plus vers K que $p q$, sera nécessairement plus courte que $p q$.


Soit menée de q , une perpendiculaire sur Z ; le point où cette perpendiculaire tombera, sera, ou le même point que b , ou au delà du point b , ou entre b & p .

1.^{er} CAS. Si c'est le même point que b : $b c$ étant perpendiculaire sur x , & $b q$ oblique, $b c$ sera plus courte que $b q$, (V. 36.) Or par la même raison $q b$ étant perpendiculaire sur Z , & $p q$ oblique, $q b$ est plus courte que $p q$.



Donc si $b c$ est plus courte que $q b$, & $q b$ plus courte que $p q$: $b c$ doit être plus courte que $p q$. Ce qu'il falloit démontrer.

2.^d CAS. Si ce point est au delà de b , comme en d : en tirant $q b$, $q b$ sera oblique, mais plus proche de la perpendiculaire $q d$, que $p q$, & par conséquent plus courte que $p q$. (V. 44.)




Or $b c$ est plus courte que $q b$, (V. 36) Donc $b c$ est à plus forte raison plus courte que $p q$. Ce qu'il falloit démontrer.

3.^e CAS. Si d se trouve entre b & p : de d on tire-

180 NOUVEAUX ELEMENTS

ra df perpendiculaire sur x , & $d'f$, fg perpendiculaire sur Z , & g se trouvant ou au point b , ou au delà du point b , on prouvera comme dans le premier & le second cas que bc est plus courte que df , laquelle par le premier cas est plus courte que pq , & par conséquent bc est plus courte que pq . Ce qu'il falloit démontrer.



Que si fg n'alloit pas jusques à b , on tireroit d'autres perpendiculaires sur x , & puis sur Z , jusques à ce qu'il y en eût une qui allât jusques à b , ou au delà.

Done de tous les points de Z les perpendiculaires sur x sont inégales, & par conséquent tous les points de Z sont inégalement distans de x , lorsqu'une même ligne est perpendiculaire sur x , & oblique sur Z .

COROLLAIRE.

- VI. C'EST visiblement la même chose de toutes les lignes perpendiculaires à Z , & obliques sur x , comparées ensemble.


III. LEMME.

- VII. EN comparant une perpendiculaire sur x , & oblique sur x , avec une perpendiculaire sur z & oblique sur x : si elles ne se croisent point, mais qu'elles soient toutes séparées, elles sont nécessairement inégales, & la plus courte est celle qui est plus vers le côté vers lequel elles sont inclinées.

Soient fg perpendiculaire sur z , & oblique sur x , & pq perpendiculaire sur x , & oblique sur z , & que

que leur inclination soit vers k ; je dis que fg , qui est plus vers k , est la plus courte.

Car en élevant de g , gh perpendiculaire sur x , & oblique sur z : par le Lemme precedent gh sera plus courte que pq ; or gf étant perpendiculaire sur z , elle est plus courte que gh , qui est oblique sur la même z ; & par conséquent fg est plus courte que pq .




IV. LEMME.

DEUX lignes enfermées ne se croisant point, V III.
ne sauroient être égales, & être chacune perpendiculaire sur quelque'une des enfermantes, qu'elles ne le soient sur toutes les deux.

Car si l'une étoit perpendiculaire sur x , & oblique sur z , elle seroit inégale à l'autre, ou par le second Lemme, si l'autre étoit aussi perpendiculaire sur x : ou par le troisième, si l'autre étoit perpendiculaire sur Z . Il faut donc pour être égales qu'elles soient perpendiculaires sur l'une & sur l'autre des enfermantes.

V. LEMME.

Si une ligne enfermée est perpendiculaire à l'une & à l'autre des enfermantes, toutes les lignes menées de quelque point que ce soit d'une enfermante perpendiculairement sur l'autre seront égales à cette enfermée, & par conséquent entr'elles.



H 7

Soit

182 NOUVEAUX ELEMENTS

Soit bf enfermée entre les lignes z & x , & perpendiculaire à l'une & à l'autre: & de c point quelconque de Z soit menée cg perpendiculaire sur x ; bf & cg seront égales, si on ne peut rien retrancher de bf , ni y rien ajouter, que bf & cg ne soient inégales. Or cela est faux.

Car si de p , point quelconque au dessous de b dans bf , on tire pc , cette ligne pc coupera obliquement bf , puisque par l'hypothèse c b (partie de Z) coupe perpendiculairement bf , & que d'un même point on ne peut tirer qu'une seule perpendiculaire à la même ligne.

Donc par le second Lemme pf (c'est à dire bf retranchée de quelque chose) & cg sont inégales.

Ce sera la même chose si on allongeoit bf de quoi que ce fût. Car si du point b au dessus de b , bf étant prolongée, on tiroit bc , cette ligne par la même raison couperoit obliquement bf prolongée.

Donc par le second Lemme bf prolongée seroit encore inégale à cg .

Donc on ne sauroit rien retrancher de bf , ni y rien ajouter, que bf & cg ne soient inégales.

Donc elles sont égales.

VI. LEMME.

2. Si une ligne est perpendiculaire à deux lignes, toutes les lignes perpendiculaires à l'une de ces lignes seront perpendiculaires à toutes les deux.

Car s'il y en avoit une seule qui fût perpendiculaire sur l'une & oblique sur l'autre, il s'en suivroit par le premier Lemme que toutes les autres lignes perpendiculaires à l'une de ces deux lignes seroient obliques sur l'autre.

Donc s'il y en a une seule qui soit perpendiculaire


DE GEOMETRIE. Liv. VI. 183

à toutes les deux , il faudra nécessairement que toutes celles qui sont perpendiculaires à l'une des deux enfermant les soient à toutes les deux , & par conséquent qu'elles soient toutes égales par le Lemme précédent.

VII. LEMME.

DEUX lignes ne se traversant point , tous les points de chacune sont également distans de l'autre , ou tous inégalement distans. Car menons d'un point de z , bc perpendiculaire sur x : si bc est aussi perpendiculaire sur z , de quelque point de z qu'on mène des perpendiculaires sur x elles seront égales à bc par le 5^e. Lemme ; & ce sera la même chose de quelque point d' x qu'on mène des perpendiculaires sur z .

xi.




Que si au contraire bc est oblique sur z , toutes les perpendiculaires des points de z sur x seront inégales , (5. sup.) & par conséquent tous les points de z inégalement distans d' x . Et il en sera de même des perpendiculaires sur z menées des points d' x , qui par la même raison seront toutes inégales entre elles. Et par conséquent aussi tous les points d' x seront inégalement distans de z .

Mais remarquez que je ne dis pas qu'un point d' x ne puisse être aussi distant de z qu'un point de z est distant d' x , mais seulement que tous les points d' x sont inégalement distans de z , & tous les points de z inégalement distans d' x .

VIII. LEMME

VIII. LEMME.

XI. Si deux lignes menées d'un même point font inclinées l'une sur l'autre, tous les points de chacune sont également distans de l'autre, & les plus courtes perpendiculaires des points de chacune sur l'autre sont celles qui sont les plus proches du point de la section.



Car on ne peut tirer d'un point de Z une perpendiculaire sur x , qu'elle ne soit oblique sur Z, par V. 37. Dont tout le reste suit par le second Lemme.

TROIS PROPOSITIONS
FONDAMENTALES

DES PARALLELES.

Ces Lemmes donnent trois marques certaines pour reconnoître si deux lignes sont paralleles selon la notion positive, c'est à dire si tous les points de chacune sont également distans de l'autre; ce qui fera les trois Propositions suivantes.

I. PROPOSITION.


XII. Si deux lignes sont coupées par une ligne perpendiculaire à l'une & à l'autre, tous les points de chacune sont également distans de l'autre, & par conséquent elles sont paralleles. 5. & 6°. Lemmes.

II. PRO-

II. PROPOSITION.

Si deux points d'une ligne sont également distans d'une autre ligne ; tous les points de chacune sont également distans de l'autre, & par conséquent elles sont parallèles 4. & 5^e. Lemmes. xiv.

Soient b & c deux points de la ligne Z également distans de la ligne x ; bf & cg perpendiculaires sur x seront égales.



Donc elles seront aussi perpendiculaires sur Z , par le 4^e. Lemme.

Donc toutes les autres lignes menées des points de Z perpendiculairement sur x seront aussi perpendiculaires sur Z , & égales à ces deux-là (par le 6^e. Lemme.) Et il en sera de même de celles qu'on mène des points d' x perpendiculairement sur Z .

III. PROPOSITION.

Deux lignes ne se croisant point & étant enfermées entre deux lignes, ne sçauroient être égales & être perpendiculaires, l'une sur une des enfermantes & l'autre sur l'autre, qu'elles ne le soient chacune sur toutes les deux (par le 4^e. Lemme,) & que par conséquent ces lignes enfermantes ne soient parallèles (par le 6^e. Lemme.) xv.

I. COROLLAIRE.

Toutes les perpendiculaires entre deux parallèles sont égales : car c'est cela même qui les rend parallèles. xvi.

II. COROLLAIRE.

Les obliques entre parallèles sont plus longues que xvii.

186 NOUVEAUX ELEMENS

que les perpendiculaires. Car chaque oblique est plus longue que sa perpendiculaire, (V. 36.) & toutes les perpendiculaires sont égales.


PROBLEME.

278. MENER par un point donné une parallèle à une ligne donnée.

Soit la ligne donnée x , & le point donné b ; on peut en diverses manieres mener par le point b une parallèle à x .


PREMIERE MANIERE.

Du point b mener sur x la perpendiculaire bf ; & mener par b une perpendiculaire sur bf , comme peut être mb , elle sera parallèle à x (par la 1^{re} proposition.)



SECONDE MANIERE.

Ayant mené de b sur x la perpendiculaire bf , en élever une autre d'un autre point quelconque d' x , comme gc : la prenant égale à $b.f$, & joignant les points c & b , $c b$ sera parallèle à x , par la 2.^{de} proposition.




TROISIÈME MANIERE PLUS COURTE ET PLUS FACILE.

Du point b tirer sur x une oblique quelconque, comme bd . Du centre d , intervalle db , d'écrire l'arc bK , qui coupe x en K . Puis du centre b ,

b ,

b , intervalle bd , dé-
 crire une portion de
 circonférence dans la-
 quelle on puisse pren-
 dre l'arc dc , égal à
 l'arc bK ; la ligne cb
 sera parallèle à dK ,
 c'est à dire à x .



Car les deux arcs bK , & dc , étant égaux &
 de cercles égaux, les cordes de ces arcs seront
 égales.

De plus bc , & dK , sont égales aussi, parce
 que ce sont rayons de cercles égaux.

Donc db étant égale à elle même, les trois li-
 gnes d'une part db , dc , cb , & les trois de l'aut-
 re bd , bK , dK sont égales chacune à chacune.

Donc le point d est autant éloigné de la ligne cb ,
 que le point b de la ligne dK , par V. 58.


Donc les perpendiculaires de d sur cb , & de
 b sur dK , sont égales.

Donc cb & dK sont parallèles par la 3.^e pro-
 position.

I. THEOREME.

Deux lignes ne sauroient être parallèles à une
 troisième, qu'elles ne le soient entr'elles. XIX.

Si x & z sont chacune pa-
 rallèle à y , elles le sont x
 entr'elles. Car soit élevé
 d'un point d' x une perpen-
 diculaire qui coupe y & z ,
 elle coupera perpendiculai-
 rement y , parce que x &
 y sont parallèles. Et étant perpendiculaire sur y ,
 elle le sera aussi sur z , parce qu' y & z sont paral-
 lèles.



Donc x & z auront une même perpendiculaire.
 Donc elles seront parallèles, (13. Sup.)

COROL-


COROLLAIRE.

- XX. ON ne ſçauroit faire paſſer par le même point deux différentes lignes qui ſoient parallèles à une même. Car il faudroit par le Theorème precedent qu'elles fuſſent parallèles entr'elles, ce qui eſt abſurde, puis qu'elles auroient un point commun, & qu'il eſt de l'eſſence des parallèles de ne ſe rencontrer jamais.

II. THEOREME.

- XXI. LES également inclinées entre les mêmes parallèles ſont égales, & les égales ſont également inclinées.

Soient les parallèles x & y . Soient bf & cg également inclinées entre ces parallèles. Soient menés de b & de c les per-



pendiculaires bp & cq ; ces perpendiculaires ſont égales. Donc afin que bf & cg ſoient également inclinées, il faut que les éloignemens du perpendicule fp & gq ſoient égaux: or cela étant, les obliques ſont égales par V. 48.

Et par la même raiſon les obliques bf & cg étant égales, & les perpendiculaires bp & cq égales auſſi, les éloignemens du perpendicule fp & gq ſeront égaux, (V. 51.) Donc ces obliques égales ſeront également inclinées.


III. THEOREME.

- XXII. LES plus inclinées entre les mêmes parallèles ſont les plus longues, & les plus longues ſont les plus inclinées; cela ſe prouve de la même ſorte par V. 53.

IV. THEO-

IV. THEOREME.


Lors que deux perpendiculaires, ou deux obliques également inclinées du même côté, coupent des parallèles: les portions de ces parallèles comprises entre ces lignes sont égales.




XXIII.

1. Cela est clair pour les perpendiculaires. Car bc & fg sont chacune perpendiculaire aux deux b & c , & par conséquent égales par le cinquième Lemme.

2. Si ces deux coupantes sont également obliques du même côté, comme bd & ck ; je dis que bc & dk se trouveront aussi être égales. Car tirant les perpendiculaires bf & cg : par le premier cas bc est égale à fg .



Or df est égale à kg , parce que ces obliques sont supposées également inclinées. Donc ajoutant fk à l'une & à l'autre, dk sera égale à fg . Donc dk est égale à bc , qui est égale à fg . Et il n'importe que les lignes fussent si proches que les éloignemens du perpendicule entrecroient l'un dans l'autre, comme en cette figure.



Car $bc = fg$.

Et $df = kg$.

Donc ôtant kf de l'un & de l'autre,


$dk = fg$, & par conséquent à bc .

V. THEO-

V. THEOREME.

XXIV. Les obliques également inclinées du même côté entre parallèles sont parallèles elles-mêmes.

Soient comme devant bd & ck également inclinées entre les parallèles x & y . Soit menée l'oblique bk .



$bd = ck$. Par l'Hypothèse & le 2.^e Theorème.

$dk = cb$. Par le Theorème précédent.

$bk = kb$. C'est à dire à soi-même.


Donc par V. 58. les perpendiculaires de k sur bd & de b sur ck sont égales. Donc les lignes bd & ck sont parallèles par 15.S.

VI. THEOREME.

XXV. Les inégales entre parallèles, quoi qu'inclinées du même côté, ne peuvent être parallèles, non plus que les égales qui sont inclinées de divers côtés. Car


1. Supposons que bd & ck entre les parallèles x & y soient inégales.

Soit tirée de C , Ck égale à bd , & inclinée du même côté que bd ; par le Theorème précédent bd & Ck sont parallèles. Donc



bd & Ck ne peuvent pas être parallèles, par 20.S.

2. On prouvera de la même sorte que bd & Cq étant égales, mais inclinées de divers côtés, ne sauroient être parallèles, parce que Ck égale aussi à bd , mais inclinée du même côté, lui est parallèle.



VII. THEOREME.


QUATRE lignes ne se joignant qu'aux extrémités, si les opposées sont égales elles sont parallèles. xxvi.

Soient les quatre lignes bC , dk , bd , Ck ; ayant tiré l'oblique bk ;

$dk = bc$. Par l'Hypothèse.

$bd = ck$. Par la même Hypothèse.

$bk = kb$. C'est à dire égale à soi-même.



Donc par V. 58. les perpendiculaires de b sur dk , & de k sur bc , sont égales. Donc bc & dk sont parallèles par 15. S.

VIII. THEOREME.

QUATRE lignes ne se joignant qu'aux extrémités, si les opposées sont parallèles elles sont égales. xxvii.

Soit fait comme auparavant; bc & dk sont parallèles. Donc bd & ck qui sont entre ces parallèles ne sauroient être elles-mêmes parallèles qu'elles ne soient égales & inclinées du même côté par le sixième Théorème. Donc elles sont égales.

Mais étant égales & inclinées du même côté, les

les portions des paralleles qui sont comprises entre ces lignes sont égales par le 4.^e Theorème. Donc $b c$ & $d k$ sont égales.

IX. THEOREME.


XXVIII. QUATRE lignes ne se joignant qu'aux extrémités, si deux des opposées sont paralleles & égales, les deux autres opposées sont aussi paralleles & égales.

Si $b c$ & $d k$ sont paralleles & égales; donc les perpendiculaires $b f$ & $k g$ sont égales, & $b g$ égale à $f k$, par 13. *Sup.*

Donc $d f$ égale à $g c$. I. 19.

Donc $b d$ & $k c$ sont égales, par V. 48.

Et paralleles par 24. & 26. *Sup.*




X. THEOREME.

XXIX. Les lignes qui enferment des paralleles égales, sont paralleles elles-mêmes. On le prouve de la même sorte.

COROLLAIRE.

XXX. Les lignes qui enferment des paralleles inégales ne sçauroient être paralleles.

Car si les paralleles $b c$ & $f g$, enfermées entre x & z , étoient inégales: prenant $g k$ égale à $b c$, la ligne $b k$ par le Theorème precedent est parallele à x . Donc x n'est pas parallele à z , par 19. *sup.*




XI. THEO-

XI. THEOREME.

QUAND une ligne en coupe deux obliquement, & qu'elle est inclinée sur chacune du même côté, toutes les parallèles à cette coupante enfermées entre ces deux mêmes lignes sont inégales: & les plus courtes sont celles qui sont vers le côté vers lequel cette première coupante étoit inclinée. XXXI.

Soient x & z , coupées l'une & l'autre obliquement par bc , inclinée vers K ; je dis que fg & pq , parallèles à bc , & enfermées aussi entre x & z , seront inégales: & fg plus proche de K sera la plus courte, & pq la plus longue. Car soit menée zn , perpendiculaire sur les trois parallèles, & xt de mêmes perpendiculaire sur toutes les trois: par le 8.^e Lemme, fi est plus courte que bm , & bm , que pn ; & de mêmes rg plus courte que lc , & lc que tq .



Or (par 23. *sup.*) ir , ml , & nt sont égales.

Donc (par l. 21.) fg est plus courte que bc , & bc que pq . Ce qu'il falloit démontrer.

I. COROLLAIRE.

IL s'ensuit delà, 1. Que deux lignes coupées par une ligne qui coupe toutes les deux obliquement, & qui est inclinée sur chacune du même côté, ne sçauroient être parallèles. (30. *sup.*) XXXII.

I

II. Co-

II. COROLLAIRE.

- XXXIII. 2. QUE ces lignes se r'approchant toujours vers le côté vers lequel cette coupante est inclinée, étant prolongées de ce côté-là, se rencontreront à la fin. V. 11.

XII. THEOREME.

- XXXIV. DEUX différentes lignes se joignant en un même point, les perpendiculaires sur chacune de ces lignes se rencontreront étant prolongées du côté qui regarde la concavité que font ces lignes jointes à un même point.


Soient les deux lignes KZ & Kx , dont KZ soit coupée en g , perpendiculairement par fg , & Kx coupée en c perpendiculairement par bc . Soient joints les points g & c ; il est clair que gc est oblique tant sur fg que sur bc , & inclinée sur l'une & sur l'autre vers y :



Donc elles se rencontreront étant prolongées de ce côté là, par 33. *Sup.*

XIII. THEOREME.

- XXXV. DEUX lignes se joignant perpendiculairement, les perpendiculaires sur l'une & sur l'autre se joindront aussi perpendiculairement.



Soient KZ & Kx perpendiculaires; si bc est perpendiculaire sur KZ , elle est parallèle à Kx , par 13. *sup.*

Donc gf ne peut être perpendiculaire sur Kx , qu'elle ne le soit aussi sur bc .





NOUVEAUX ELEMENS
DE
GEOMETRIE.

LIVRE SEPTIÈME.

DES LIGNES TERMINÉES
A UNE CIRCONFÉRENCE,

où il est parlé

DES SINUS,

*Et de la Proportion des Arcs de divers
Cercles à leurs Circonférences, & du
Parallélisme des Lignes Circulaires.*

JUSQUES icy nous avons considéré les
lignes droites entant qu'elles sont ter-
minées à d'autres lignes droites, ou
qu'elles leur sont parallèles. Nous les
considérons maintenant entant qu'elles
sont terminées à quelque point d'une circonférence.

1 2

ON

196 NOUVEAUX ELEMENS

On les peut distinguer par les diverses situations du point d'où elles sont menées à la circonférence. Car ce point est

1. Ou dans la circonférence même,
2. Ou au dedans du cercle,
3. Ou au dehors.

1. Quand il est dans la circonférence même, ce sont les lignes qui sont menées d'un point de la circonférence à un autre point de la même circonférence; Et ce sont celles que nous avons déjà dit s'appeler des cordes.

2. Quand le point est au dedans du cercle, si ce point est le centre, ce sont des rayons. Mais si ce n'est pas le centre, on les peut appeler des sécantes intérieures.

3. Et quand ce point est hors le cercle: ou ces lignes entrent dans le cercle, le coupant dans sa convexité & étant terminées à sa concavité: ou elles n'entrent point dans le cercle; & alors elles sont telles, que si on les prolongeait elles y entreroient, & tant celles-là que celles qui y entrent, peuvent être appelées des sécantes extérieures.

Ou bien, quoi que prolongées, elles n'entrent point dans le cercle; & ce sont celles-là que l'on dit toucher le cercle, & que l'on appelle pour cette raison des tangentes.

Mais parce que les deux derniers genres, hors la dernière espèce du 3.^e qui est des tangentes, peuvent être compris dans les mêmes propositions, nous renfermerons tout cela en 3 sections, Dont

La 1.^{re} sera des cordes.

La 2.^{de} des sécantes intérieures & extérieures.

La 3.^e des tangentes.

Et nous y en ajoutierons une 4.^e qui sera du parallélisme des lignes circulaires.

PREMIERE SECTION.

DES CORDES.


PREMIER THEOREME.

Les lignes droites qui coupent les cordes peuvent avoir trois conditions. 116

La 1.^{re} De les couper perpendiculairement.

La 2.^{de} De les couper par la moitié.

La 3.^e De passer par le centre.



Or deux de ces conditions étant données, donnent la 3.^e

C'est à dire :

1. Si elles coupent les cordes perpendiculairement & par la moitié, elles passent par le centre.

2. Si elles coupent les cordes perpendiculairement & qu'elles passent par le centre, elles les coupent par la moitié.

3. Si elles les coupent par la moitié & qu'elles passent par le centre, elles les coupent perpendiculairement.

Soient pour tous les cas le centre C, & la corde m , coupée par $f g$.

PREUVE DU PREMIER CAS.

Si $f g$, étant perpendiculaire à $m n$, la coupe par la moitié ; le point g est également distant des extrémités de la coupée m & n . Donc $f g$ étant prolongée doit contenir tous les points de ce plan également distans d' m & n , par V. 42. Or le centre est un de ces points : Donc il se doit trouver

I 3

dans

dans $f g$ prolongée. Ce qu'il falloit démontrer.

PREUVE DU SECOND CAS.

Si $f g$ coupe perpendiculairement $m n$, & qu'étant continuée elle passe par le centre, il y a un point dans cette ligne, sçavoir le centre, qui est également distant d' m & n . Donc tous les autres points de cette ligne $f g$, dont l'un est le point de la section, sont également distans d' m & n . (par V. 31. & 32.) Donc $m n$ est divisée par la moitié.

PREUVE DU TROISIÈME CAS.

Si $f g$ divisant $m n$ par la moitié, étant prolongée passe par le centre, il y aura deux points dans cette ligne, sçavoir le point de la section, & le centre, également distans d' m & n . Donc $f g$ est perpendiculaire à $m n$, par V. 32.

I. COROLLAIRE.

III. AYANT trois points d'une circonférence, on a toute la circonférence.

Car qui a un point de la circonférence & le centre, l'a toute entière, par V. 22.

Or qui a trois points de la circonférence, en a le centre. Ce qui se prouve de cette sorte:

Il est clair que ces trois points ne peuvent pas être dans la même ligne droite, parce que tous les points d'une circonférence doivent être également distans d'un même point, sçavoir le centre, & qu'il est impossible que trois points d'une ligne droite soient également distans d'un même point, par V. 30.

Ainsi



DE GEOMETRIE. LIV. VII. 179

Ainsi joignant ces trois points deux à deux, on a trois cordes qui soutiennent 3 arcs de cette circonférence.

Donc le centre se trouvera dans l'intersection de deux lignes, qui couperont perpendiculairement & par la moitié deux de ces 3 cordes.

Car par le précédent Théorème chacune de ces perpendiculaires passe par le centre. Donc le centre est le point qui leur est commun. Et par là on voit combien il est facile de résoudre le Problème que voicy :

PROBLEME.

Trouver la circonférence qui passe par trois divers points donnez. IV

Il ne faut que faire ce qui a servi de preuve au Théorème précédent, en remarquant que si ces trois points étoient dans la même ligne droite, le Problème seroit impossible, parce que les perpendiculaires étant parallèles ne se rencontreroient jamais : au lieu qu'il est toujours possible quand ils sont en deux différentes lignes, parce que les lignes qui les couperont perpendiculairement se rencontreront. VI. 34.

II. COROLLAIRE.

Deux circonférences ne peuvent avoir trois points communs, qu'elles ne les aient tous. Car par le premier Corollaire ces 3 points communs auront le même centre. Donc ces cercles seront concentriques. Or deux cercles étant concentriques, s'ils ont un rayon égal, tous les points des circonférences sont ensemble : comme quand un cercle de bois convexe est emboité dans un autre cercle de bois qui est creux. V.

I 4

III. Co

III. COROLLAIRE.

- VI. Deux cercles ne se peuvent couper en plus de deux points. Car s'ils se coupoient en trois, leurs circonferences auroient 3 points communs, & par conséquent les auroient tous, & ainsi ne se couperoient point.

II. THEOREME.

- VII. Les lignes qui coupent les cordes perpendiculairement & par la moitié, coupent aussi par la moitié les arcs grands & petits que soutiennent ces cordes de part & d'autre.

Soit la corde mn coupée par fg perpendiculairement & par la moitié; je dis que chacun des arcs mf , & mh , sont coupés par la moitié, l'un en f , & l'autre en h . Car fg étant perpendiculaire à mn , & ayant un de ses points, savoir le point de section, également distant d' m & n , tous les autres points, comme f & h , seront aussi également distans d' m & n , par V. 42. Donc tirant les cordes fm & fn , elles seront égales, & par conséquent les arcs qu'elles soutiennent seront égaux, par V. 26. Donc par la même raison les cordes hm & hn seront égales, & les arcs qu'elles soutiendront égaux. Donc les deux arcs mf , & mh , seront chacun partagé par la moitié par la ligne fg .



COROLLAIRE.

- VIII. Tout rayon perpendiculaire à un diamètre, coupe par la moitié la demy-circonférence que soutient

DE GEOMETRIE. LIV. VII. 201

tient ce diamètre. Car y ayant un point dans ce rayon perpendiculaire à ce diamètre également distant des extrémités de ce diamètre, sçavoir le centre : tous les autres points de ce rayon seront aussi également distans des extrémités de ce diamètre. Donc le point où ce rayon coupe cette demy-circonférence en sera également distant. Donc cette demy-circonférence sera coupée par la moitié. Par V. 26.

III. THEOREME.


LA ligne qui passant par le centre coupe un arc IX.
par la moitié, coupe aussi par la moitié & perpendiculairement la corde qui soutient cet arc. Car il y a alors deux points dans la ligne qui coupe l'arc par la moitié, le centre & le point de section de l'arc, dont chacun est également distant des deux extrémités de la corde.

IV. THEOREME.

LES cordes également distantes du centre dans le même cercle, ou dans cercles égaux, sont égales ; & les égales sont également distantes du centre ; & les plus proches du centre sont les plus grandes. X.

Cela est clair des diamètres, qui sont également proches du centre, puis qu'ils passent tous par le centre

Et il est clair aussi que tout diamètre est plus grand que toute autre corde, puisque tirant du centre deux rayons aux extrémités de toute autre corde, ces deux rayons seront égaux au diamètre & plus grands que cette corde. par V. 5.



I 5

Pour

202 NOUVEAUX ELEMENS

Pout ce qui est des autres cordes: 1. Les également distantes du centre sont égales. Car si $m n$ & $f g$ sont également distantes du centre: Donc les perpendiculaires du centre à chacune sont égales, puis que c'est ce qui mesure la distance de ces cordes d'avec le centre. V. 38:

Et de plus ces perpendiculaires les divisent chacune par la moitié, par 2. *sup.* Donc tirant les rayons $c n$ & $c g$: $l n$, & $h g$ (qui sont les moitez de chacune de ces cordes) seront égales, par V. 51. parce que les obliques $c n$ & $c g$ sont égales, & les perpendiculaires aussi $c l$ & $c h$. Donc les toutes $m n$ & $f g$ sont égales. Ce qu'il falloit démontrer.

2. Les égales sont également distantes du centre; car y ayant égalité entre les moitez de ces cordes $l n$ & $h g$, qui peuvent être considérées comme les éloignemens du perpendicule, & entre les rayons $c n$ & $c g$, qui sont les obliques: il faut qu'il y ait aussi égalité entre les perpendiculaires du centre à ces cordes qu'elles divisent par la moitié, (V. 52) & qu'ainsi ces cordes soient également distantes du centre.


3. Les plus proches du centre sont les plus longues; car si la corde $m n$ est plus proche du centre que la corde $p q$, elle doit être plus grande que la corde $p q$, parce que la perpendiculaire $c l$ étant plus cotte que la perpendiculaire $c r$, & les obliques $c n$ & $c q$ étant égales: l'éloignement du perpendicule $l n$ doit être plus grand que l'éloignement du perpendicule $r q$. (V. 55.) C'est à dire que la moitié d' $m n$ est plus grande que la moitié de $p q$.



V. THEOREME.

DANS les mêmes cercles , ou dans des cercles égaux , les plus grandes cordes soutiennent les plus grands arcs du côté que ces arcs sont plus petits que la demycirconference. x i.

Soit mn plus grande que pq ; je dis que l'arc mn est plus grand que l'arc pq . Car prolongeant la perpendiculaire CS jusques à ce qu'elle soit aussi longue que la perpendiculaire Cr , comme CS , & tirant la corde bd , qui soit perpendiculaire à CS , cette corde bd est égale à pq , par le Theoreme precedent. Et ces deux cordes mn & bd étant paralleles (par VI. 13.) ne se peuvent jamais rencontrer.



Donc l'arc mn ne pourra manquer de comprendre l'arc bd . Donc il sera plus grand que l'arc bd , puisque le tout est plus grand que sa partie.

Donc l'arc mn est plus grand aussi que l'arc pq , qui est égal à l'arc bd . Ce qu'il falloit démontrer.

*D'une autre mesure des Arcs , qui
sont les Sinus.*

DEFINITIONS.

QUAND un arc est moindre que la moitié de la demy-circonference , ou le quart de la circonference , la perpendiculaire de l'une des extrémités de l'arc sur le rayon ou le diamètre qui se termine à l'autre extrémité , s'appelle le *sinus* de cet arc ; & la partie du rayon ou diamètre qui est depuis la rencontre de la perpendiculaire , ou sinus , jusqu'à l'extrémité de l'arc , s'appelle le *sinus verse*. x i r.

204 NOUVEAUX ELEMENS

Soit une circonference, dont le centre est C , & un arc $f d$ moindre que la moitié de la demy-circonference. Soit tiré le rayon $C d$, & la perpendiculaire $f g$ du point f sur ce rayon : cette perpendiculaire $f g$ est le *sinus* de l'arc $f d$; & $g d$ en est le *sinus verse*.



I. LEMME.

- xiii. QUE si on continuë $f g$ jusqu'à h , autre point de la circonference, il est clair par le 1.^{er} Theoreme qu' $f h$ est partagée par la moitié par $C d$, & qu'ainsi le sinus $f g$ est la moitié de la corde $f h$.

II. LEMME.

- xiv. ET il est clair aussi par le 2.^d Theoreme que l'arc $f d h$, soutenu par la corde $f h$, est double de l'arc $f d$, dont $f g$ est le sinus.
D'où il s'ensuit qu'on peut encore définir le *sinus* :

(AUTRE DEFINITION DES SINUS.)

- xv. LA moitié de la corde du double de l'arc.
Car $f g$ est la moitié de la corde $f h$, laquelle corde $f g h$ soutient l'arc $f d h$, lequel est double de l'arc $f d$. Tout cela étant supposé, soit

VI. THEOREME.

- xvi. DANS le même cercle, ou dans les cercles égaux, les arcs qui ont le sinus égal sont égaux ; & les sinus égaux donneront des arcs égaux ; & les arcs qui ont les plus grands sinus, sont les plus grands. Car par le 1.^{er} Lemme les sinus égaux sont moitiéz de cordes égales. Or par

DE GEOMETRIE. LIV. VII. 205

par le 2.^d Lemme ces cordes égales soutiennent des arcs égaux qui sont doubles des arcs qui ont pour sinus ces sinus égaux. Donc les arcs doubles de ceux-là étant égaux, ceux là le sont aussi. La converse se prouve de la même sorte, sans qu'il soit besoin de s'y arrêter.

Et de mêmes quand un sinus est plus grand que l'autre, la corde dont le plus grand est la moitié, est plus grande aussi que la corde dont le plus petit est la moitié. Donc cette plus grande corde soutient un plus grand arc. Or l'arc qu'elle soutient est double de celui dont la moitié de cette plus grande corde est le sinus. Donc l'arc dont la moitié de cette plus grande corde est le sinus, est plus grand que l'arc qui a pour sinus la moitié d'une plus petite corde. (Ce qu'il falloit démonstrer.)

VII. THEOREME.

QUAND les sinus sont égaux, les sinus versés les XVII
sont aussi, & les plus grands sinus donnent les plus grands sinus versés.

Car les sinus égaux sont également distans du centre.

Or cette distance du centre ôtée du rayon, ce qui reste est le sinus versé. Donc cette distance étant égale, le sinus versé est égal.

Que si le sinus est plus grand, cette distance est plus petite. Donc ôtant moins du rayon, ce qui reste, qui est le sinus versé, est plus grand.

AVERTISSEMENT.


LES sinus ne mesurent proprement que les arcs XVIII
moindres que la moitié de la demy-circonférence. Mais cela n'empêche pas qu'on ne s'en puisse servir pour mesurer ceux qui sont plus grands. Car ce qui manque à ces plus grands arcs pour faire la

demycirconference, s'appelle le complement de ces plus grands arcs. Or ces complemens se mesurent par les sinus; & il est aisé de juger que ces complemens étant égaux, ces plus grands arcs sont égaux aussi. Mais qu'étant inégaux, celui qui a le plus petit complement est le plus grand.

VIII. THEOREME.

XXI. QUAND plusieurs circonferences sont concentriques, & que du centre on tire des lignes indefinies, les arcs de toutes ces circonferences compris entre ces deux lignes sont en même raison à leurs circonferences.

Soient autour du centre C deux circonferences concentriques, & soient tirées les deux lignes CB & CD; je dis que l'arc BD de la plus grande, & *bd* de la plus petite, sont proportionels à leurs circonferences.



Car les aliquotes quelconques de BD soient appellées X; je dis que si par tous les points de section on tire des lignes au centre, *bd* sera divisée par ces lignes en aliquotes pareilles.

Pour le prouver il suffit de considerer deux X, que je suppose être BF & FG. Tirant les lignes FC & GC, je dis que les arcs *bf* & *fg* sont égaux entr'eux aussi bien que BF & FG. Car tirant d'F une perpendiculaire sur BC & une autre sur GC, les deux perpendiculaires F*p* & F*q* seront les sinus d'arcs égaux, & par consequent égales (par 16. *sup.*) & les sinus versés de ces arcs B*p* & G*q* seront aussi égaux, (par 17. *sup.*) Donc *pb* & *qg* seront aussi égales.

Donc F*b* & F*g* sont égales, parce que ce sont les obliques dont les perpendiculaires F*p* & F*q* sont

DE GEOMETRIE. LIV. VII 207

sont égales, comme aussi les éloignemens des perpendiculaires pb & qg . V. 48.

Donc dans la ligne FC il y a deux points, sçavoir F & C , dont chacun est également distant de b & de g .

Donc FC coupe perpendiculairement & par la moitié la corde bg , & par conséquent aussi l'arc bsg , (par 7. *sup.*)

Donc l'arc bf est égal à l'arc fg . Ce qu'il falloit démontrer.

Or cela étant démontré, il est clair qu'on prouvera la même chose de toutes les aliquotes de BD en les prenant deux à deux.

Donc BD étant divisé en aliquotes quelconques, les lignes menées au centre par tous les points de section feront des aliquotes pareilles dans bd , lesquelles on pourra appeler x .

Or appliquant X pour mesurer le reste de la grande circonférence, si elle s'y trouve précisément tant de fois : menant des lignes par tous les points de section, x se trouvera aussi précisément tant de fois dans la petite circonférence. Et si ce n'est dans la grande qu'avec quelque reste, ce ne sera aussi dans la petite qu'avec quelque reste.

Donc, par la définition des grandeurs proportionnelles, BD est à la grande circonférence, comme bd à la petite, puisque les aliquotes quelconques pareilles de BD & de bd sont également contenues dans les deux circonférences.

DEFINITION,

Les arcs qui ont même raison à leur circonférence, soient appelez proportionnellement égaux, ou d'autant de degrez l'un que l'autre. Surquoi il se faut souvenir que toute circonférence grande ou

xx.

208 NOUVEAUX ELEMENS

ou petite est considérée comme divisée en 360 parties, qu'on appelle *Degrez*, & chaque degré en 60 *Minutes*, & chaque minute en 60 *Secondes*, & chaque seconde en 60 *Tierces*; & ainsi à l'infiny.

Et comme on ne regarde point la grandeur absolue des portions d'une circonférence, parce que cette grandeur nous est inconnue, mais seulement la grandeur relative, c'est à dire par proportion à la circonférence; on pourroit appeler simplement *égaux*, les arcs qui sont proportionnellement égaux, parce qu'ils sont d'autant de degrez: & appeler *tout-égaux* ceux qui le sont tout ensemble proportionnellement & absolument, comme sont les arcs d'autant de degrez dans le même cercle.

IX. THEOREME.

XXI. QUAND les cercles sont inégaux, les arcs proportionnellement égaux sont soutenus par de plus grandes cordes, & ont de plus grands sinus, dans les plus grands cercles.

Soient autour du centre C deux circonférences concentriques. Les arcs BD & *bd*, compris entre les mêmes rayons BC & DC, sont proportionnellement égaux.


Or tirant les cordes BD & *bd*, & les divisant par la moitié aussi bien que les arcs par la ligne PC, les arcs BP & *bp* sont aussi proportionnellement égaux. Or BF & *bf*, perpendiculaires sur PC, sont les sinus de ces deux arcs.

Et par VI. 12. BF est plus grande que *bf*.

Done les arcs égaux ont de plus grands sinus dans les plus grands cercles.

Et de mêmes la corde BD est plus grande que *bd* (par VI. 31.) & aussi parce que BF, moitié de BD, est plus grande que *bf*, moitié de *bd*.

Donc.




Donc les arcs $B D$ & $b d$ étant proportionnellement égaux, celui du plus grand cercle a une plus grande corde.

X. THEOREME.

LES cordes dans un même cercle ne sont point proportionnelles aux arcs, mais les plus grands arcs (j'entens toujours ceux qui ne sont pas plus grands que la demy-circonférence) ont de plus petites cordes à proportion que les plus petits. C'est à dire que la corde d'un arc qui n'est que la moitié d'un plus grand arc, est plus grande que la moitié de la corde de ce plus grand arc, XXII.

La preuve en est bien facile. Car soit l'arc $b d$ partagé en m par la moitié; $b m$ égale à $d m$ seront chacune la corde d'un arc qui n'est que la moitié de l'arc que soutient la corde $b d$. Or ces deux cordes $b m$ & $d m$ sont plus grandes que $b d$, par V. 5. Donc étant égales, chacune est plus grande que la moitié de la corde $b d$.



COROLLAIRE.

DE là il s'ensuit que plus les arcs sont grands, plus la différence est grande entre la longueur de l'arc & celle de la corde; & qu'au contraire plus les arcs sont petits plus cette différence diminue. De sorte qu'on peut prendre un si petit arc, que cette différence sera plus petite que quelque ligne qu'on ait donnée. XXIII.

SECON-

SECONDE SECTION.

DES SECANTES INTERIEURES ET
EXTERIEURES.

XXIV. Nous avons déjà dit que les lignes menées à la cir-
conférence d'un point de de-
dans le cercle autre que le cen-
tre se pouvoient appeller *des se-*
cantes interieures.

Et que quand le point étoit
hors le cercle, & qu'elles n'é-
toient point tangentes, on les
pouvoit appeller *des secantes*
exterieures.

Or pour abréger le discours
dans l'expression de ces li-
gnes, soient toujours appel-
lez

Le centre


Le point, soit dans le cercle, soit hors le cer-
cle,

La ligne menée de ce point passant par le cen-
tre,

Celle qui ne passant point par le centre est dans la
même ligne droite que celle qui y passe,

Les autres,	{	_____	$kx.$
		_____	$ky.$
		_____	$kz.$
		_____	$k\phi.$


Cela supposé, soit



I. THEOREME.

LA plus longue de ces lignes est Kg . C'est à dire celle qui passe par le centre. xxv.

Car si on la veut comparer avec $K\phi$, soit tiré le rayon $c\phi$, qui est égal à cg ; après quoi Kc plus $c\phi$, est plus grande que $K\phi$, par V. 5.



Donc Kg est plus grande que $K\phi$.

II. THEOREME.

LA plus courte de toutes ces lignes est Kf . C'est à dire celle qui ne passant point par le centre est dans la même ligne droite que celle qui y passe. xxvi.

Car comparant Kf avec Ky , & ayant tiré le rayon Cy :
Si K est au dedans du cercle,
 Ck plus Kf est égale à Cy .
Or Cy est plus courte que Ck plus Ky .

Donc Ck plus Kf est plus courte que Ck plus Ky .

Donc ôtant Ck , qui est commun, Kf est plus courte que Ky .

Que si K est hors le cercle,
 Kf plus fC est plus courte que Ky plus yC , par V. 5.

Or fC est égale à yC .

Donc Kf est plus courte que Ky .



III. THEO-

III. THEOREME.

XXVII. LES lignes menées de K à des points de la circonférence également distans d' f ou de g sont égales. Et il faut remarquer que deux points ne scauroient être également distans d' f , qu'ils ne soient aussi également distans de g . Mais on appelle également distans d' f ceux qui sont plus proches d' f que de g , & également distans de g ceux qui sont plus proches de g que d' f .

Soient les deux points également distans d' f , X & x. (*Voyez la fig. du 5^e. Theor. cy dessous.*) La corde terminée par ces deux X & x est coupée perpendiculairement par la ligne fC , (V. 32.) puisque f par l'hypothèse est également distant d'X & x, & C aussi, parce que c'est le centre du cercle.

Donc tous les points de cette ligne sont également distans d'X & x. (par V. 42.) Donc le point K, qui en est un. Donc KX & Kx sont égaux.

C'est la même chose de deux points également distans de g .

IV. THEOREME.

XXVIII. SI du centre K, intervalle Kf, ou Kg, on décrit un nouveau cercle, il touchera le premier cercle en un seul point, c'est à dire en f , ou en g , sans le couper.

Car si Kf est rayon du 2.^d cercle: comme cette ligne est la plus courte de toutes celles qui peuvent être menées de K à la circonférence du 1.^{er} cercle, (par 2.^e sup.) toute autre ligne menée à la circonférence du premier passera la circonférence du second.



Et.

DE GEOMETRIE. LIV. VII. 213


Et au contraire si Kg est le rayon du 2.^d cercle: cette ligne étant la plus longue de toutes celles qui peuvent être menées de K à la circonférence du 1.^{er} cercle, (par 2.^e sup.) toute autre ligne menée de K à la circonférence du 1.^{er} cercle ne pourra pas aller jusqu'à la circonférence du 2.^d

V. THEOREME.


Si du centre K , intervalle plus grand que Kf , & plus petit que Kg , comme pourroit être Kx , on décrit un cercle, il coupera la circonférence du premier aux points X & x ; c'est à dire en deux points également distans d' f , (ou également distans de g , si on avoit pris un point plus proche de g , pour déterminer cet intervalle,) & la partie de la circonférence du 1.^{er} cercle entre X & x , dont le milieu est f , sera au dedans du 2.^d cercle; au lieu que la partie de la même circonférence du 1.^{er} cercle entre ces deux mêmes points X & x , dont g est le milieu, sera au dehors du 2.^d cercle. Car (par 6. S.) deux circonférences ne se peuvent couper en plus de deux points.

Or cela étant: le rayon du 2.^d cercle étant Kx , toute ligne menée de K à la circonférence du 1.^{er} cercle qui sera égale à Kx , se trouvera aussi terminée à la circonférence du 2.^d cercle.

De plus, par le troisième Theoreme cette ligne égale à Kx est celle qui est terminée à un point de la circonférence du premier cercle, aussi distant d' f de l'autre côté, qu' X en est distant de son côté. Donc X & x seront les deux seuls points dans lesquels la deuxième circonférence coupera la première.



XXIX.



Or

214 NOUVEAUX ELEMENS

Or il est clair que le point f se trouvera au dedans du 2.^d cercle, parce que Kf est plus courte que Kx , qui en est le rayon. Donc tout ce qui est d'une part entre f & X , & de l'autre entre f & x , se trouvera aussi au dedans du 2.^d cercle; puis qu'il faudroit que le 2.^d cercle eût coupé le 1.^{er} en d'autres points qu' X & x , afin que quelques uns des points plus proches d' f se trouvaient ou dans la circonférence du 2.^d cercle, ou au dehors.

Et par la même raison le point g se trouvera au dehors du 2.^d cercle, parce que Kg est plus longue que Kx , qui en est le rayon: ce qui fait voir aussi que tous les points de la 1.^{re} circonférence plus proches de g qu' x se trouveront aussi au dehors du 2.^d cercle.

VI. THEOREME.

xxx.

DE toutes les lignes menées de K , celles qui sont menées à des points plus proches d' f sont les plus courtes, & celles qui sont menées à des points plus proches de g sont les plus longues.

Supposons, par exemple, que le point y est plus proche d' f que le point x ; je dis que Ky est plus courte que Kx .

Car si on décrit un cercle du centre K , intervalle Kx : par le Theorème precedent tous les points de la circonférence du premier cercle plus proches d' f qu' x se trouveront au dedans du deuxième cercle.




Or, par l'hypothèse, y est plus proche d' f , qu' x . Donc y est au dedans du 2.^d cercle. Donc Ky est plus courte que Kx , qui est un rayon du 2.^d cercle.

Que

DE GEOMETRIE. LIV. VII. 215.

Que si au contraire nous supposons que ϕ est plus proche de g que z ; je dis que $K\phi$ est plus longue que Kz . Car si on décrit un cercle du centre K , intervalle Kz : par le Theorème precedent tous les points de la circonference du premier cercle plus proches de g que z , se trouveront au dehors du deuxième cercle. Or, par l'hypothese, ϕ est plus proche de g que z . Donc ϕ est au dehors du cercle. Donc $K\phi$ est plus longue que Kz , qui est un rayon du deuxième cercle.



I. COROLLAIRE.

De nul point autre que le centre on ne peut mener trois lignes égales à la circonference. Car les trois points où ces trois lignes seroient terminées ne peuvent pas être également distans du point f , ou du point g . Donc si l'un des trois est plus proche ou plus éloigné du point f , la ligne qui y sera terminée sera plus courte ou plus longue que les deux autres. Donc, &c.

II. COROLLAIRE.

Le point d'où l'on peut mener trois lignes égales à la circonference, en est nécessairement le centre.

TROISIEME SECTION.

DES TANGENTES.

Nous avons déjà dit qu'on appelle *tangente* du cercle la ligne qui touche le cercle sans entrer dedans, quoi que prolongée.

LE THE-

I. THEOREME.

XXXIV. TOUTE ligne perpendiculaire à l'extrémité d'un rayon touche le cercle, & ne le touche qu'en un seul point; c'est à dire qu'il n'y a qu'un seul point qui soit commun à la circonférence & à cette ligne; & ce point s'appelle *le point de l'attouchement*. Car puisque le rayon est perpendiculaire à cette ligne, c'est la plus courte de toutes les lignes qui puissent être menées du centre à cette ligne. Donc toute autre menée du centre sera plus longue. Donc elle se terminera en un point hors de la circonférence. Donc nul autre point que celui où ce rayon coupe perpendiculairement cette ligne ne pourra être commun à cette circonférence & à cette ligne. Ce qu'il falloit démontrer.

II. THEOREME.

XXXV. ON ne peut faire passer aucune ligne droite entre la tangente & la circonférence, quoi qu'on en puisse faire passer une infinité de circulaires qui ne se rencontreront que dans le point de l'attouchement.


La première partie se prouve ainsi : Soit Cf un rayon, mf la tangente; soit b un point quelconque au dessous de la tangente. Tirant de b une ligne à f , elle sera oblique sur Cf , & inclinée vers C , parce que mf est perpendiculaire à Cf . Donc la perpendiculaire de C à bf sera plus courte que Cf , par V. 36. Donc elle se terminera dans le cercle (V. 27.) Donc une partie de bf sera au dedans du cercle. Donc on n'aura pas pu faire passer bf entre la tangente & la circonférence.



La deuxième partie se prouve ainsi : Soit fC pro-

DE GEOMETRIE. LIV. VII. 217

prolongée à l'infiny du côté de C , & soient tous les divers points de cette ligne au dessous de C appelez x . Toutes les circonferences qui auront l'un de ces points que j'appelle x pour centre, & $x f$ pour rayon, auront $m f$ pour tangente par le premier Theorème, & ne rencontreront, ni la circonférence qui a C pour centre, ni les unes les autres, qu'en f (par 28. S.) Donc toutes ces circonferences passeront entre la tangente & le premier cercle sans se rencontrer.



I. PROBLEME.

DECRIRE la tangente qui touche la circon- xxxvi.
ference en un point donné.

Tirer un rayon de ce point donné; la perpendiculaire à l'extrémité de ce rayon sera la tangente que l'on cherche.

II. PROBLEME.

D'un point donné hors le cercle tirer des tan- xxxvii.
gentes au cercle.

Soit le point K donné hors le cercle, dont le centre est C , & le rayon $C f$. Je décris un autre cercle du même centre, intervalle CK , & puis ayant tiré la ligne $K C$, qui coupe en f la circonférence du 1.^{er} cercle, je tire par le point f la corde du grand cercle $m n$, qui coupe perpendiculairement $K C$, ce qui fait que $m n$ touche le premier cercle en f .



K

Cela

Cela fait , du point K je prens dans le grand cercle de part & d'autre les deux arcs Kb & Kd , égaux chacun à l'arc mn ; Et je dis que les cordes Kb & Kd touchent le 1.^{er} cercle , & qu'elles le touchent au point où les rayons du grand cercle mC & nC coupent ces cordes :

Car les trois arcs du grand cercle mn , Kb , Kd étant égaux , les trois cordes qui les soutiennent sont égales aussi , & par conséquent également distantes du centre , par 10. *sup.* Or mn est distante du centre C de la longueur d'un rayon du premier cercle.

Donc les deux autres cordes Kb & Kd sont aussi distantes du centre de la longueur d'un rayon du premier cercle.

Donc ce rayon leur est perpendiculaire , puis qu'autrement il ne mesurerait pas leur distance d'avec le centre. (V. 38.)

Donc par 34. *sup.* elles sont tangentes du premier cercle.

Et elles le touchent au point où elles sont coupées par les rayons du grand cercle mC & nC . Car le point K partageant par la moitié l'arc mn , le point m partage aussi par la moitié l'arc Kb . Donc le rayon mC est perpendiculaire à la corde Kb , (V. 32.) parce que les deux points m & C ont chacun également distans de K & de b .

Donc si le point où le rayon mC coupe la corde Kb est h : ce point h sera aussi l'extrémité du rayon du premier cercle , qui est perpendiculaire à la corde Kb , puis qu'autrement il faudroit que de C on pût tirer sur Kb deux perpendiculaires différentes , ce qui ne se peut. (V. 37.)

I. COROLLAIRE.

D'un point hors le cercle on peut tirer deux tangentes au cercle, & non plus. XXXVIII.

Cela est clair par ce qui vient d'être démontré.

II. COROLLAIRE.

On peut considérer les tangentes comme terminées au point de l'attouchement ; & alors XXXIX.

Les tangentes , ou menées à un même cercle d'un même point , ou de divers points également distans du centre , ou menées à des cercles égaux de points également distans des centres de chacun , sont égales.

Car il est visible , par la solution du deuxième Problème , que dans tous ces cas , ces tangentes sont moitiez de cordes égales.

QUATRIEME SECTION.

DES CIRCONFERENCES PARALLELES.

I. LEMME.

UNE ligne droite est perpendiculaire à une circonférence , autant que la nature de l'une & de l'autre le peut souffrir , lorsqu'elle est perpendiculaire à la tangente menée au point de la section. XL.

II. LEMME.

D'où il s'ensuit , que toute ligne qui étant prolongée passe par le centre , est perpendiculaire à la circonférence. XLI.

III. LEMME.

XLII. LA distance d'un point à une circonférence se mesure par la plus courte ligne qui puisse être menée de ce point à cette circonférence. Or cette plus courte ligne est celle qui ne comprend point le centre, mais qui est dans la même ligne droite que celle qui y passe. (S. 16.)

Et par conséquent cette ligne est perpendiculaire à la circonférence, par les deux premiers Lemmes.

DEFINITION

DES CIRCONFÉRENCES PARALLELES.

XLIII. DEUX circonférences sont parallèles, lorsque tous les points de chacune sont également distans de l'autre.

C'est à dire, selon les précédens Lemmes, lorsque toutes les lignes droites menées chacune des points de l'une perpendiculairement sur l'autre, sont égales.

I. THEORÉME.

XLIV. TOUTES les circonférences concentriques (c'est à dire qui ont un même centre) sont parallèles.

Car tous les rayons de la plus grande circonférence sont perpendiculaires à l'une & à l'autre. Donc ôtant les rayons de la plus petite, ce qui restera entre les deux circonférences, sera égal, & en mesurera la distance. Donc tous les points de chacune seront également distans de l'autre. Donc elles sont parallèles.




II. THEO-

II. THEOREME.

DEUX cercles non concentriques étant l'un dans l'autre, le diametre du plus grand qui passera par les deux centres, coupera chaque circonference par la moitié; & alors il arrivera 3 ou 4 choses considerables. XCV.

1. Les parties de ce diametre qui se trouveront d'un côté & d'autre entre les deux circonférences, c'est à dire fm , gn , sont perpendiculaires à l'une & à l'autre, & mesurent fm le plus grand, & gn le plus petit éloignement de ces deux circonférences.



2. Nulle autre ligne que ces deux là qui se trouvent dans ce diametre qui passe par les deux centres, ne peut être perpendiculaire à l'une & à l'autre circonférence : toute autre ligne qui sera perpendiculaire à l'une des circonférences, étant oblique sur l'autre.

3. Tous les points d'une demy-circonférence d'une part sont inégalement distans de l'autre demy-circonférence de la même part.

4. Toutes les fois que deux points d'une circonférence sont également distans de l'une ou l'autre des extrémités de ce diametre, qui passe par les deux centres, ils sont aussi également distans de l'autre circonférence.

Tout cela est si aisé à prouver par ce qui a été dit dans la 2.^e Section, & par les trois Lemmes de celle-cy. que j'aime mieux le laisser à trouver pour exercer l'Esprit, que de perdre du temps à le démontrer.

COROLLAIRE.

IL s'ensuit de là, qu'on peut remarquer trois XLVI.

K 3

dif.

différences entre le parallélisme des lignes droites , & celui des lignes circulaires.

La 1.^{re} est, que la notion négative des parallèles droites , qui consiste à ne se rencontrer jamais quand on les prolongeroit à l'infini , n'a point de lieu dans les circulaires, qui peuvent bien se rencontrer jamais sans être parallèles , de sorte que pour l'être il faut que ce soit selon la notion positive , qui consiste en ce que les points de l'une soient toujours également distans de l'autre.

La 2.^{re} est, que deux lignes droites sont parallèles , quand une même ligne est perpendiculaire à l'une & à l'autre. Au lieu qu'il peut y avoir non seulement une ligne droite, mais deux , qui soient perpendiculaires à l'une & à l'autre circonférence , sans qu'elles soient parallèles , mais il n'y en peut pas avoir trois.

La 3.^{re} est, que deux lignes droites ne s'étant point croisées , il ne peut pas y avoir deux points de l'une également distans de l'autre , qu'elles ne soient parallèles. Au lieu que dans les circonférences non parallèles, il peut y avoir une infinité de points dans chacune , qui soient deux à deux également distans de l'autre. Mais il n'y en peut avoir trois ensemble.

Le fondement de ces différences vient d'une part de ce que la ligne circulaire est bornée en elle-même ; & de l'autre de ce qu'il en faut avoir trois points pour en avoir la position : au lieu qu'il n'en faut que deux pour avoir celle de la ligne droite.





NOUVEAUX ELEMENS
DE
GEOMETRIE.
LIVRE HUITIEME.

DES ANGLES RECTILIGNES.



*APRES avoir parlé des lignes, c'est
suivre l'ordre de la Nature que de pas-
ser aux angles, qui sont plus compo-
sez que les lignes, tenant quelque
chose des surfaces, comme nous al-
lons voir.*

1.

DEFINITION

DE L'ANGLE RECTILIGNE.

*L'angle rectiligne est une surface comprise entre
deux lignes droites qui se joignent en un point
du côté où elles s'approchent le plus, indéfinie &c*

11.

K 4

in-

224 NOUVEAUX ELEMENTS.

indeterminée selon l'une de ses dimensions, qui est celle qui répond à la longueur des lignes qui la comprennent, & déterminée selon l'autre par la partie proportionnelle d'une circonférence dont le centre est au point où ces lignes se joignent.

AUTRES DEFINITIONS.

III. LES lignes qui comprennent l'angle s'appellent les *côtés*.

IV. LE point où ces lignes se joignent s'appelle son *sommet*.

V. SI l'on joint deux points de ces côtés par une autre ligne, cette ligne s'appelle la *bâse* ou la *soutenance de l'angle*. Et l'on dit que cette ligne *soutient* l'angle, & que l'angle est *opposé* à cette ligne, ou est *soutenu* par cette ligne.

VI. CETTE bâse s'appelle *corde* quand les côtés de l'angle sont égaux, pource qu'alors ces côtés de l'angle sont considerez comme rayons d'un cercle dont cette bâse est une corde.

VII. QU'É si de l'un des côtés on peut faire descendre une perpendiculaire sur l'autre, cette perpendiculaire s'appelle le *sinus* de cet angle.

VIII. CETTE partie proportionnelle de la circonférence qui mesure la grandeur de l'angle s'appelle *l'arc que comprend l'angle*.

PROPOSITION FONDAMENTALE

DE LA MESURE DES ANGLES.

IX. LES arcs de toutes les circonférences qui ont pour centre le point où les côtés de l'angle se coupent, sont tous proportionels à leurs circonférences, & par conséquent déterminent tous la même grandeur de l'angle.

La conséquence est claire par la définition de l'angle, puisque nous avons dit que c'étoit une *sur-*

DE GEOMETRIE. Liv. VIII. 227.

surface indéterminée selon une dimension, & qui n'étoit déterminée selon l'autre que par une partie proportionnelle des circonférences qui ont pour centre le point où ses costez se joignent.

Pour montrer donc que les arcs de ces circonférences déterminent tous la même grandeur de l'angle, il ne faut que montrer que tous ces arcs sont proportionels à leurs circonférences.

Or c'est ce qui a déjà été prouvé, Livre-VII.
19.

DE LA PREMIERE MESURE DE L'ANGLE, QUI EST L'ARC COMPRIS ENTRE SES CÔTES.

IL s'ensuit delà que pour sçavoir la vraie grandeur d'un angle, il faut sçavoir la grandeur proportionnelle de l'arc compris entre ses côtes, c'est à dire de combien de degrez est cet arc. Car un degre n'est pas le nom d'une grandeur absoluë, mais proportionnelle, puisque, comme nous avons déjà dit, il signifie la trois-cent soixantième partie de quelque circonférence que ce soit, dont chacune en soy est plus grande ou plus petite selon que la circonférence est plus grande ou plus petite: & il en est de même des minutes, des secondes, & des troisièmes. C'est pourquoi on peut appeller *arcs égaux*, selon qu'il a été dit VII. 20. ceux qui sont d'autant de degrez, quoi qu'ils puissent être inégaux selon leur grandeur absoluë, & égaux en toute maniere, ou *sont égaux*, ceux qui sont d'autant de degrez, & qui sont aussi égaux selon leur grandeur absoluë, tels que sont les arcs d'autant de degrez dans les cercles égaux.

K. 5.

D. 5.

DE L'ANGLE DROIT.

XI. C'EST par là qu'on a divisé l'angle en *droit* & *non droit*, & le non droit, en *aigu* & *obtus*.

On appelle angle droit celui qui a pour mesure la moitié de la demy-circonférence. D'où il s'ensuit :

1. Que tout angle droit a de l'autre côté sur la même ligne un autre angle qui lui est égal, puisque l'angle qui est de l'autre côté a pour mesure ce qui reste de la demy-circonférence, & qu'il en reste justement la moitié.

2. Qu'un angle droit est la même chose qu'un angle de 90 degrés. Car la demy-circonférence en ayant 180, la moitié de cette demy-circonférence en a 90.

3. Que toute ligne perpendiculaire sur une ligne fait sur cette ligne deux angles droits, l'un d'un côté & l'autre de l'autre. Car elle partage en deux également la demy-circonférence qui a pour centre le point de leur section, par VII. 8.

DE L'ANGLE AIGU.

XII. ON appelle angle *aigu* celui qui est moindre qu'un droit, c'est à dire qui a pour mesure un arc moindre que la moitié de la demy-circonférence. D'où il s'ensuit :

Que tout angle moindre que de 90 degrés est aigu.

DE L'ANGLE OBTUS.

XIII. ON appelle angle *obtus* celui qui est plus grand que l'angle droit, c'est à dire qui a pour mesure un arc plus grand que la moitié de la demy-circonférence. D'où il s'ensuit :

Que

DE GEOMETRIE. LIV. VIII. 227

Que tout angle plus grand que de 90 degrez est obtus.

I. THEOREME.

TOUTE ligne qui en coupe une autre obliquement, fait d'un côté une angle aigu & de l'autre un obtus, & les deux ensemble valent deux droits. Car cette ligne pattrage inégalement la demy-circonference, & partant fait deux angles inégaux. Mais elle ne la divise qu'en deux portions, & partant les deux portions prises ensemble valent toute la demy-circonference.

XIV.



II. THEOREME.

LORSQUE plusieurs lignes droites en rencontrent une en un même point & du même côté, tous les angles que font toutes ces lignes entr'elles & avec la rencontrée valent deux droits. Car ils comprennent tous ensemble la demy-circonference, qui est la mesure de deux angles droits.

XV.



DEFINITION.

L'ANGLE aigu qui avec l'obtus vaut deux angles droits, s'appelle le *complement de l'angle obtus*.

XVI.

III. THEOREME.

LORSQUE deux lignes se coupent en passant de part & d'autre, il est bien clair que si elles se coupent perpendiculairement, elles font quatre angles égaux tous-quatre entr'eux, c'est à dire tous-quatre droits.

XVII.

Mais si elles se coupent obliquement, elles en font deux aigus & deux obtus, dont l'aigu est op-

K 6

posé

228 NOUVEAUX ELEMENTS.

posé à l'aigu & l'obtus à l'obtus, & cela s'appelle être opposé au sommet. Et les opposez sont égaux.

Car faisant un cercle du point où ces deux lignes bC & fg se coupent, chacune coupera la circonférence par la moitié, & par conséquent la moitié $b g C$ est égale à la moitié $f b g$. Or ces deux moitiés ont l'arc $b g$ de commun, qui est l'arc d'un des angles obtus: & par conséquent ôtant cet arc, l'arc de l'aigu qui reste d'une part, sera égal à l'arc de l'aigu qui reste de l'autre. On prouvera la même chose des deux angles obtus.



IV. THEOREME.

XVII. — LORSQUE plusieurs lignes droites se rencontrent en un même point étant menées de toutes parts, tous les angles qu'elles font valent quatre droits. Car ils ont tous ensemble pour mesure une circonférence entière.



DES AUTRES MESURES

DE L'ANGLE.

XIX. *Quoi que l'angle n'ait en effet de vraie & naturelle mesure que l'arc d'un cercle: néanmoins comme on ne connoist pas la longueur des lignes courbes, on est obligé d'avoir recours à d'autres mesures, mais toujours par rapport à celle-là.*

On les peut rapporter à trois, qui sont toutes prises de la base considérée diversement: ou comme corde: ou comme sinus: ou simplement comme base.

DE.

DE LA SECONDE MESURE DE L'ANGLE,

QUI EST LA CORDE.

Nous commencerons par la base considérée comme corde, sur quoi il faut remarquer xx.

1. Que pour cela il faut que les côtes de l'Angle soient pris égaux. (6. *sup.*) Car alors ils sont considerez comme rayons d'un cercle dont le centre est au sommet, & ainsi la ligne qui en joint les extremitéz est la corde de l'arc de ce cercle qui mesure cet angle.

2. Les angles ainsi considerez peuvent être appelez *isosceles*, c'est à dire à jambes égales.

3. Deux angles isosceles comparez ensemble peuvent être ou *équilateres* entr'eux, ou *inéquilateres*; c'est à dire que leurs côtes sont rayons ou de cercles égaux, ou de cercles inégaux.

Cela supposé, pour bien comprendre toute cette mesure de l'angle, il ne faut que faire attention à ces Lemmes tirez des Livres V. & VII.

I. LEMME.

DANS les cercles égaux les cordes égales soutiennent des arcs tout-égaux. Et les arcs égaux sont soutenus par cordes égales. (V. 26.) xxi.

II. LEMME.

DANS les cercles égaux les plus grandes cordes soutiennent de plus grands arcs. Et les plus grands arcs sont soutenus par les plus grandes cordes. VII. 11. xxii.

III. LEMME.

- XXIII. LES cercles étant inégaux, les cordes égales soutiennent des arcs de plus de degrez dans les plus petits cercles VII. 21.

IV. LEMME.

- XXIV. LES arcs d'un même nombre de degrez sont soutenus par de plus grandes cordes dans les plus grands cercles. VII. 21.

I. THEOREME.

- XXV. TROIS sortes d'égalitez peuvent être considérées dans deux angles isosceles.
1. L'égalité des côtez de l'un à ceux de l'autre, qui fait qu'on les appelle *équilateres entr'eux*.
 2. L'égalité des cordes, qu'elles peut faire appeler *isocordes*.
 3. L'égalité des angles mêmes.
- Or deux de ces égalitez étant données, donnent la 3.^{me}

PREMIER CAS.

- XXVI. LES angles équilateres entr'eux & isocordes sont égaux. Car ils ont pour mesure des arcs tout-égaux, puisqu'étant équilateres ils sont mesurés par des arcs de cercles égaux, & que par le 1.^{er} Lemme les cordes égales de cercles égaux soutiennent des arcs tout-égaux.

SECOND CAS.

- XXVII. LES angles équilateres & égaux sont isocordes. C'est la converse du même premier Lemme.

TROIS

TROISIÈME CAS.

LES angles ifocordes & égaux sont équilatères **xxviii.**
entr'eux. Car il est aisé de voir par le 3.^e Lemme que les cordes égales ne peuvent soutenir des arcs égaux, que dans les mêmes cercles, ou en des cercles égaux.

II. THEOREME.

QUAND il n'y a égalité que dans l'une de ces **xxix.**
trois choses, voicy ce qui arrive :

PREMIER CAS.

N'y ayant égalité que dans les côtez, les plus **xxx.**
grandes cordes donnent les plus grands angles, &
les plus grands angles ont les plus grandes cordes.
C'est le 1.^e Lemme.

SECOND CAS.

N'y ayant égalité que dans les cordes, les plus **xxxi.**
grands côtez donnent les plus petits angles, & les
plus petits angles ont les plus grands côtez. C'est
le 3.^e Lemme.

TROISIÈME CAS.

N'y ayant égalité que dans la grandeur des an- **xxxii.**
gles, les plus grandes cordes donnent les plus grands
côtez, & les plus grands côtez ont les plus gran-
des cordes. C'est le 4.^e Lemme.

I. PROBLEME.

COUPER en deux un angle donné. L'ayant **xxxiii.**
pris isoscele, il ne faut qu'en couper la corde per-
pendiculairement & par la moitié, ce qui se fait
de

de la même sorte. Car alors l'arc sera partagé par la moitié, par VII. 7.

II. PROBLEME.

- XXXIV. **A**YANT un point donné dans une ligne donnée, en élever une qui fasse sur cette ligne un angle égal à un donné. Soit l'angle donné. L'ayant fait isoscele, en marquer la corde; puis du point donné dans la ligne pris pour centre, décrire d'un intervalle égal aux côtés de l'angle donné une portion de circonférence, dans laquelle, en commençant par le point où cette circonférence coupera la ligne donnée, on prendra une corde égale à la corde de l'angle donné. La ligne menée du point donné à l'extrémité de cette corde satisfera au Probleme. Car ces deux angles seront équilatères eutr'eux & isocordes, & par conséquent égaux par le premier Theorème.

DE LA TROISIE'ME MESURE DE L'ANGLE,


QUI EST LE SINUS.

- XXXV. **L**E sinus de l'arc qui mesure un angle, peut être appelé le sinus de cet angle. D'où il s'ensuit:
- XXXVI. 1. **Q**ue comme il n'y a que les arcs moindres que la moitié de la demy-circonférence qui aient un sinus, il n'y a aussi que les angles aigus qui en aient. Ce qui n'empêche pas qu'on ne se puisse servir des sinus pour comparer ensemble deux angles obtus, en mesurant par les sinus les angles aigus qui sont les complemens de ces obtus. Voyez VII. 18.
- XXXVII. 2. **I**L s'ensuit que toute ligne menée d'un point de l'un des côtés d'un angle aigu perpendiculairement sur l'autre côté, est le sinus de l'arc qui

IDEA

mesure cet angle, & par conséquent le sinus de cet angle.

Car soit K le sommet d'un angle aigu, & que de *b*, point quelconque de l'un de ses côtés, soit menée sur l'autre la perpendiculaire *bC*. Je dis que *bC* est le sinus de l'arc qui mesure cet angle. Car ayant prolongé *KC* jusques en *d*, en sorte que *Kd* soit égale à *Kb*; si du centre K, intervalle *Kb*, on décrit un cercle, l'arc de ce cercle compris entre *d* & *b* fera la mesure de cet angle. Or *bC* est le sinus de cet arc, par VII. 12. Donc *bC* est le sinus de l'arc qui mesure l'angle K, & par conséquent de l'angle K.



3. IL s'ensuit que le côté d'un des points du- XXXVIII.
quel est menée la perpendiculaire sur l'autre côté, considéré depuis le sommet jusques à ce point, comme *Kb*, peut être appelé le rayon de cet angle, parce qu'il est le rayon du cercle dont l'arc le mesure. Et l'autre côté depuis le point où tombe la perpendiculaire ou *sinus*, peut être appelé l'*anti-sinus*, qui est toujours égal au rayon moins le *sinus verse*, D'où il s'ensuit:

4. QUE la grandeur du sinus réglant toujours XXXIX.
celle du sinus verse, (comme il a été montré VII. 17.) elle règle toujours aussi celle des *anti-sinus*, quoique par rapport au rayon, puisque l'*anti-sinus* n'est autre chose que le rayon moins le *sinus verse*; de sorte que dans deux angles différens les rayons & les sinus ne sçauroient être égaux que les *anti-sinus* ne le soient aussi.

Tout cela supposé, soient considérez les Lemmes suivans.

L E M.

I. L E M M E.

- XL. QUAND on dit que deux angles qu'on veut mesurer par les sinus ont le rayon égal, c'est de même que si l'on disoit qu'ils sont mesurez par des arcs de cercles égaux; & s'ils ont le rayon inégal, par des arcs de cercles inégaux.

II. L E M M E.

- XLI. DANS les cercles égaux les arcs égaux ont des sinus égaux; & les sinus égaux donnent des arcs égaux. VII. 16.

III. L E M M E.

- XLII. DANS les cercles égaux les plus grands arcs ont les plus grands sinus, & les plus grands sinus donnent les plus grands arcs. VII. 16.

IV. L E M M E.

- XLIII. DANS les cercles inégaux les arcs étant égaux, ceux des plus grands cercles ont les plus grands sinus. VII. 21.

V. L E M M E.

- XLIV. DANS les cercles inégaux les sinus étant égaux, ceux des plus grands cercles donnent des arcs proportionnellement plus petits, c'est à dire de moins de degrés. C'est une suite claire du Lemme précédent.

I. T H E O R É M E.

- XLV. TROIS égalitez peuvent être considérées dans les angles que l'on compare & que l'on mesure par les sinus.

1. L'éga-

DE GEOMETRIE. LIV. VIII. 235

1. L'égalité des rayons.
 2. L'égalité des sinus.
 3. L'égalité des angles mêmes.
- Or deux étant données donnent la 3.^e

PREMIER CAS.

LES angles qui ont le rayon égal & le sinus égal XLVI.
sont égaux. 1.^{er} & 2.^d Lemme.

SECOND CAS.

LES angles égaux qui ont le rayon égal, ont le XLVII.
sinus égal. 1.^{er} & 2.^d Lemme.

TROISIÈME CAS.

LES angles qui sont égaux & qui ont le sinus XLVIII.
égal, ont le rayon égal. Car s'ils avoient le rayon inégal, ils seroient mesurez par des arcs de cercles inégaux: & par conséquent (selon le 5.^e Lemme) les sinus égaux donneroient des arcs proportionnellement inégaux, & ainsi les angles ne pourroient pas être égaux.

II. THEORÈME:

N'y ayant égalité que dans l'une de ces trois XLIX.
choses, voicy ce qui arrivera:

PREMIER CAS.

N'y ayant égalité que dans le rayon, les plus
grands sinus donnent les plus grands angles, &
les plus grands angles ont les plus grands sinus.
3.^e Lemme. 1.

SECOND CAS.

N'y ayant égalité que dans les sinus, le plus
grand 1. 1.

236 NOUVEAUX ELEMENS

grand rayon donne le plus petit angle, & le plus petit angle a le plus grand rayon. 5.^{me} Lemme.

TROISIÈME CAS.

- LII. N'y ayant égalité que dans les angles, le plus grand rayon donne le plus grand sinus, & le plus grand sinus donne le plus grand rayon. 4.^{me} Lemme.

DES ANGLES FAITS PAR LES LIGNES

ENTRE PARALLÈLES.

- LIII. COMME les perpendiculaires entre les parallèles font des angles droits sur l'une & sur l'autre (ce qui est toujours la même chose :) il n'y a que les angles que font les obliques à considérer.

Mais ces obliques entre parallèles faisant d'une part un angle aigu & de l'autre un obtus, c'est l'aigu que l'on mesure premierement, & par l'aigu on connoist l'obtus. Et ainsi quand nous parlerons d'angles égaux, nous entendrons les aigus, & les obtus par conséquence seulement.

Or dans la considération de ces angles aigus faits par des obliques entre parallèles,

L'oblique est le rayon de l'angle ;

La perpendiculaire menée de l'extrémité de l'oblique (qui est un point de l'une des parallèles) sur l'autre parallèle en est le sinus.

D'où il s'ensuit, que les sinus qui mesurent les angles que font des obliques entre les mêmes parallèles sont tous égaux, parce que les perpendiculaires entre les mêmes parallèles sont égales. VI. 16.

Com-


DE GEOMETRIE. LIV. VIII. 237

Comme aussi entre différentes parallèles, pourveu que les deux parallèles d'une part soient autant distantes l'une de l'autre, que celles de l'autre part. Et c'est ce qu'on peut appeller deux espaces parallèles égaux.

On peut tirer de là diverses propositions importantes qui ne seront que des Corollaires du 1.^{er} ou du 2.^d Theoreme.

I. COROLLAIRE.

TOUTE oblique entre deux parallèles fait les angles alternes sur ces parallèles égaux, c'est à dire que l'aigu qui est d'une part est égal à l'aigu qui est de l'autre part, & par consequent l'obtus à l'obtus. LIV.



Car ces angles alternes ont pour rayon cette même ligne oblique bC , & pour sinus l'un la perpendiculaire de b sur la parallèle X , & l'autre la perpendiculaire de C sur la parallèle Z . Or ces deux perpendiculaires sont égales. Donc par 46. S.

II. COROLLAIRE.

LES obliques égales entre les mêmes parallèles font les angles égaux : par la même raison. LV.

III. COROLLAIRE.

LES obliques entre parallèles qui font les angles égaux, sont égales, S. 48. LV L.

IV. COROLLAIRE.

LES plus courtes lignes entre parallèles sont les plus grands angles, par le 2.^d Theoreme, 2.^d Cas. LVII.

V. Co.

V. COROLLAIRE.

LVIII. QUAND des lignes sont enfermées entre différentes lignes parallèles, on peut y considérer trois égalitez.

1. L'égalité des obliques.

2. L'égalité des angles.

3. L'égalité de la distance entre les unes & les autres de ces parallèles, ce qui fait que cette distance étant égale, les perpendiculaires entre ces différentes parallèles sont égales.

Or deux de ces égalitez étant données donnent la troisième.

1.^{re} CAS. Si les obliques sont égales, & les angles qu'elles font entre leurs parallèles égaux, les unes & les autres parallèles sont également distantes. Car ce sont des angles qui sont égaux, & qui ont les rayons égaux (sçavoir ces obliques.) Donc leurs sinus sont égaux, par 47.S.

Or ils ont pour sinus les perpendiculaires entre leurs parallèles.

Donc ces perpendiculaires sont égales.

2.^d CAS. Si les obliques sont égales, & les parallèles de part d'autre également distantes, les angles seront égaux, par 46.S.

3.^e CAS. Si les parallèles de part & d'autre sont également distantes, & que les angles soient égaux, les obliques sont égales, 48.S.


VI. COROLLAIRE.

LIX. LA même ligne coupant obliquement plusieurs parallèles, les coupe toutes avec la même obliquité. C'est à dire qu'elle fait sur toutes les angles aigus égaux. C'est une suite du premier Corollaire & de 14. S.

Soient trois lignes parallèles x , y , z , coupées par la ligne B en C , en D & en f . L'angle aigu vers C
au

DE GEOMETRIE. LIV. VIII. 239

au dessus d' x est égal à l'angle aigu de dessous , parce qu'ils sont opposés au sommet. (17. *sup.*) & l'angle aigu de dessous est égal à l'angle aigu vers D, au dessus d' y , parce qu'ils sont alternes, (54. *sup.*) & ce dernier est égal à l'angle de dessous y , parce qu'il est opposé au sommet. Et ce dernier à l'aigu vers f , au dessus de z , parce qu'ils sont alternes, & ainsi des autres. Donc tous les angles aigus que fait une même ligne sur diverses parallèles qu'elle coupe, sont égaux. Et de là il s'ensuit, que les obtus sont égaux aussi, parce que les aigus sont les compléments des obtus.



VII. COROLLAIRE.

Plusieurs parallèles étant également distantes les unes des autres, c'est à dire la 1.^{re} de la 2.^{de} & la 2.^{de} de la 3.^{de} & la 3.^{de} de la 4.^{de} &c. LX.

Si une même ligne les coupe toutes, toutes les portions de cette ligne comprises entre deux de ces parallèles sont égales.

Car tous les angles aigus que fait cette ligne sur ces parallèles sont égaux. Et les sinus de ces angles, qui sont les perpendiculaires entre chaque deux parallèles, sont égaux aussi par l'hypothèse.

Donc les rayons de ces angles, qui sont les portions de cette ligne comprises entre chaque deux parallèles, sont égaux. (48. *sup.*)

VIII. COROLLAIRE.

Lors que deux lignes sont menées d'un même point sur une autre ligne, c'est comme si ces lignes étoient entre parallèles. LXI.

Car


240 NOUVEAUX ELEMENTS

Car on peut par ce point tirer une parallèle à la ligne que ces deux lignes coupent.

IX. COROLLAIRE.

LXII. Tout angle plus les deux angles que font ses côtés sur la base sont égaux à deux droits.

Soient $b C$ & $b D$ les côtés d'un angle, & CD la base. Par le précédent Corollaire, on peut mener par le point b la ligne $m n$, parallèle à la base, sur laquelle parallèle les côtés de l'angle donné feront de nouveaux angles autour du donné, savoir l'angle $m b C$, & $n b D$. Or ces trois angles sont égaux à deux droits, par 15. S. Et chacun des deux qui sont à côté de l'angle donné, est égal à un de la base, savoir à son alterne, par 54. S.



Donc les deux de la base, plus l'angle donné, sont égaux à deux droits.

X. COROLLAIRE.

LXIII. Si on prolonge un côté d'un angle vers le sommet de l'angle, comme si on prolongeoit $D b$ jusques en f : l'angle que fait ce côté prolongé sur l'autre côté, comme l'angle $f b C$, est égal aux deux angles sur la base. Car cet angle, qui est appelé extérieur, plus l'angle du sommet, valent deux droits. Or les deux angles sur la base, plus l'angle du sommet valent aussi deux droits. Ostant donc l'angle du sommet qui est commun, l'angle extérieur sera égal aux deux angles sur la base.

Ce sera la même chose si on prolonge la base. Car l'angle extérieur que fera la base prolongée sur un côté,

DE GEOMETRIE. LIV. VIII. 241

côté, sera égal aux deux intérieurs opposés; c'est à dire à l'angle que fait l'autre côté sur la base, plus l'angle du sommet.

XI. COROLLAIRE.

DEUX angles sont égaux, quand les angles que les côtes de l'un font sur sa base, sont égaux à ceux que les côtes de l'autre font sur la sienne. LXIV.

III. PROBLEME.

D'UN point donné hors une ligne donnée, mener une ligne qui fasse sur la donnée un angle donné. LXV.

D'un point quelconque de la ligne donnée en élever une qui fasse sur la donnée l'angle donné, (par le 2.^d Probleme, 34. *sup.*)

La parallèle à cette ligne qui passera par le point donné & coupera la ligne donnée, satisfera au Probleme.

DE LA QUATRIÈME MESURE DE L'ANGLE,

QUI EST GÉNÉRALEMENT LA BASE.

CETTE mesure est la plus imparfaite, & ne peut servir à mesurer les angles, qu'en cas que les côtes de deux angles non isosceles soient égaux chacun à chacun, ce qui fera deux Theorèmes.


I. THEORÈME.

LORS que deux angles non isosceles sont équilatéraux entr'eux; c'est à dire que chacun des côtes de l'un est égal à chacun des côtes de l'autre: si la base est égale à la base, ces angles sont égaux. LXVI.

L

C'est

C'est ce qui se prouve ainsi : Ou l'on peut faire tomber une perpendiculaire de l'extrémité de l'un des côtés de ces angles sur l'autre côté, ou on ne le peut, comme lors qu'ils sont obtus.



1^{re}. CAS. Si on le peut, (comme lorsque les angles sont k & x ;) les perpendiculaires xP seront égales, par V. 58.

Or ces perpendiculaires sont les sinus de ces angles qui ont aussi le rayon égal, sçavoir cx . Donc ces angles sont égaux, par 46. S.

2^d. CAS. Si on ne le peut, (comme si ces angles étoient c & k des mêmes figures :) alors la perpendiculaire xP menée du sommet même de chacun des angles sur la base, feroit voir que les deux angles formez par les côtés de chacun de ces angles obtus sur cette base, sont égaux chacun à chacun, (c'est à dire l'angle k égal à l'angle k , & l'angle c à l'angle c .) Donc les angles obtus cxk seront égaux, par 64. S.

II. THEOREME.

LXVII. Deux angles égaux étant équilatères entr'eux, ont la base égale.

Ces angles égaux que l'on suppose équilatères entr'eux sont,

1. Ou droits.
2. Ou aigus.
3. Ou obtus.

1^{re}. CAS. S'ils sont droits, comme bfc & mpn : ils ont les bases cb & mn égales, par V. 48.

2^d. CAS.

DE GEOMETRIE. LIV. VIII. 243


2.^d CAS. S'ils sont aigus, comme $b d C$, $n q m$: les perpendiculaires $C f$ & $m p$, qui sont les sinus de ces angles, seront égales, par 47. S.

Donc $f d = p q$. V. 51.

Donc $b f = n p$. I. 19.

Donc $C b = m n$. V. 48.

Ce qu'il falloit démontrer.



3.^e CAS. S'ils sont obtus, comme $b g C$, & $n o m$: les angles aigus $C g f$, $m o p$, complémentes de ces obtus, seront égaux.

Donc les perpendiculaires $C f$ & $m p$, qui sont les sinus de ces angles, seront égales par 47. S.

Donc $g f = o p$. V. 51.

Donc $b f = n p$. I. 18.

Donc $C b = m n$. V. 48. Ce qu'il falloit démontrer.

OBSERVATION,

Touchant la comparaison de la première mesure des angles avec ces trois dernières.

Nous avons déjà dit qu'il n'y avoit que l'arc qui fust la mesure parfaite & naturelle de l'Angle. Mais pour le mieux voir, il faut remarquer que les trois autres mesures montrent bien si un angle est égal à un angle, ou, entre des angles inégaux, quel est le plus grand ou quel est le plus petit; mais il n'y a que l'arc qui donne la véritable proportion entre les angles inégaux. Car il est certain que si l'arc est triple, ou quadruple, ou quintuple de l'arc: l'angle sera aussi triple, quadruple, ou quintuple de l'angle. Mais cela ne se peut pas dire des trois

autres mesures : étant faux que si la corde est triple de la corde, lors même que les angles sont équilibrés entr'eux, l'angle soit triple del angle ; parce que les cordes ne sont pas proportionnelles à leurs arcs, comme il a été dit VII. 22. Et c'est d'où vient la difficulté de la trisection de l'Angle ; parce qu'il ne suffit pas pour cela de couper la corde en trois, ce qui seroit facile : mais il faut couper l'arc en trois ; ce qui ne se peut par la Geometrie ordinaire, c'est à dire en n'y employant que des lignes droites & circulaires.





NOUVEAUX ELEMENS
DE
GEOMETRIE.
LIVRE NEUFVIE'ME.

*Des Angles qui ont leur sommet hors le
centre du Cercle, dont les Arcs
ne laissent pas de les mesurer.*

L est bien aisé de reconnoître que les
Angles ne peuvent avoir pour verita-
ble mesure que les arcs d'un cercle,
& que toutes les autres mesures, com-
me les cordes, les sinus, & les ta-
ses, ne peuvent être que su'sidiaires de celle là,
& que même elles ne les mesurent qu'imparfaite-
ment.

Mais on a creu jufques icy qu'on ne pouvoit em-
ployer pour mesurer un angle que les arcs du cercle
au centre duquel est le sommet de cét angle. Et

L 3

anisi

ainsi arrivant rarement que deux angles que l'on compare ayent leur sommet au centre du même cercle: on ne pouvoit presque jamais employer la mesure des arcs dans la comparaison de plusieurs angles, & on étoit obligé d'avoir recours à de longs circuits par la conférence de plusieurs triangles; ce qui o'ligeoit à considérer tant de lignes, qu'il étoit impossible que l'Imagination n'en fût extrêmement fatiguée, qui est une des choses qu'on doit éviter autant que l'on peut dans l'étude de la Geometrie.

Cependant il est vray qu'il n'y a point d'angle qu'on ne puisse mesurer par les arcs d'un cercle, en quelque endroit qu'en soit le sommet au regard du cercle: C'est à dire,

1. Soit qu'il soit dans la circonférence du cercle:

2. Soit qu'il soit au dedans, quoi qu'ailleurs qu'au centre:

3. Soit mêmes qu'il soit au dehors, pourveu que ses côtez coupent ou touchent le cercle.

C'est ce que l'on verra par ce Livre, qui ne servira pas seulement à mesurer avec une merveilleuse facilité toutes sortes d'angles, mais donnera aussi par là de grandes ouvertures pour trouver beaucoup de nouvelles choses touchant la proportion des lignes.

Mais pour rendre les preuves plus courtes, il est bon de supposer quelques Lemmes, ou clairs d'eux mêmes, ou démontrés dans le Livre précédent, afin d'y renvoyer quand on en aura besoin.

I. LEMME. DEFINITION.

11. LORS que dans toutes ces sortes d'angles on dit qu'un tel arc du cercle auquel ils ont rapport leur sert de mesure: cela veut dire, que si ce même angle étoit au centre du cercle, il auroit cet arc,
ou

DE GEOMETRIE. LIV. IX. 247

ou un autre qui lui seroit égal, pour sa mesure. On bien cela veut dire, qu'un angle qui seroit au centre de ce cercle, & qui auroit cet arc pour mesure, seroit égal à l'angle hors le centre qu'on dit avoir cet arc pour sa mesure.

Et de là il s'ensuit, que dans ces sortes d'angles, aussi bien que dans ceux qui sont au centre du cercle, deux angles sont égaux quand ils ont pour mesure des arcs égaux : ou absolument, quand ce sont des arcs du même cercle, ou de cercles égaux : ou proportionnellement, quand ce sont des arcs de cercles inégaux ; l'arc du petit ayant la même raison à sa circonférence, que l'arc du grand à la sienne : comme si l'un & l'autre étoit la dixième partie de sa circonférence, c'est à dire de 36 degrez.

II. LEMME.

Tout angle de la demy-circonférence est *Droit.* I II.
 qui a pour mesure la } d'un arc moindre que la demy-c. *Aigu.*
 } d'un arc plus grand que la demy-c. *Obtus.*
 Mort.

Et de là il s'ensuit, que quand on dit que deux angles, ou trois angles, sont égaux à deux droits : cela veut dire que ces deux angles, ou ces trois angles, pris ensemble, ont pour mesure la demy-circonférence, c'est à dire 180 degrez.

Et quand on dit que deux angles sont égaux à un droit : cela veut dire que ces deux angles, pris ensemble, ont pour mesure la moitié de la demy-circonférence, c'est à dire 90 degrez.

III. LEMME.

QUAND un tout est partagé en plusieurs portions, comme A en b, c, d ; comme ces trois portions ensemble font le tout : les trois moitiés de Z IV.
 ces L 4

248 NOUVEAUX ELEMENS

ces portions, c'est à dire une moitié de chacune, font toutes ensemble la moitié du tout ; de sorte que ces trois expressions font la même chose :

La moitié du tout ;

La moitié des trois portions que comprend le tout ;

Les trois moitez de ces portions, c'est à dire une de chacune ; ce qui s'entend toujours, quoi qu'on ne le marque pas.

Et ainsi supposant qu' A soit une circonference, & que b , c , d , soient trois arcs qui la comprennent toute :

$\frac{1}{2}$ de l'arc b ,
 $\frac{1}{2}$ de l'arc c ,
 $\frac{1}{2}$ de l'arc d , } sont égales, prises ensemble, à la $\frac{1}{2}$ de la circonference, c'est à dire à la demy-circonference, ou à 180 degrez.

Et supposant qu' A soit une demy-circonference, & que b & c soient deux arcs qui la comprennent : deux moitez de ces arcs, une de chacun, vaut la moitié de la demy-circonference, c'est à dire 90 degrez.

Et alors on peut exprimer la moitié de l'un de ces arcs en deux manieres : ou par son propre nom, comme la $\frac{1}{2}$ d'un tel arc ; ou par la moitié du tout dont il est portion, moins la moitié de l'autre arc.

Ainsi étant donné une demy-circonference qui comprend les arcs b & c : la $\frac{1}{2}$ de l'arc b est la même chose que la moitié de la demy-circonference, moins la $\frac{1}{2}$ de l'arc c .

Enfin si un tout a deux portions : la moitié de la plus grande, moins la moitié de la plus petite, est la même chose que la moitié du tout moins la petite entiere. Car si le tout a pour portions b & c , la moitié du tout est égale à la moitié de b , plus la moitié de c . Il faut donc ôter deux fois

fois la moitié de c de la moitié du tout, pour rendre la moitié du tout égal à la moitié de b dont on auroit ôté la moitié de c .

IV. L E M M E.

ENFIN il se faut souvenir,

1. Que tout angle, plus les deux que font ses côtez sur sa base, sont égaux à deux droits.

2. Que les deux angles sur la base d'un angle droit sont égaux à un droit.

3. Que si on prolonge un côté de l'angle vers le sommet: le nouvel angle que fait ce côté prolongé sur l'autre côté, est égal aux deux angles qui sont sur la base du premier angle. Ainsi l'angle $F K b$ est égal aux angles vers b & vers c .



v.

La premiere sorte d'angles, dont le sommet est dans la circonference d'un Cercle donné.

DIVISION.

Le sommet d'un angle ne se peut terminer dans la circonference d'un cercle qu'en 3 manieres:

1. Quand l'un des côtez est au dedans du cercle, & l'autre au dehors;

2. Quand tous les deux sont au dedans;

3. Quand ils sont tous-deux au dehors du cercle. Mais parce que la premiere se subdivise en deux, on peut compter 4 genres de cette sorte d'angles.

Le 1.^{er} Quand l'un des côtez est au dedans du cercle, & en est une corde, & que l'autre



vi.

250 NOUVEAUX ELEMENS

l'autre côté qui est au dehors, touche le cercle.

Le 2.^e Quand l'un des côtez étant aussi au dedans du cercle, celui qui est au dehors coupe le cercle, & entre dans le cercle lorsqu'on le prolonge de ce côté-là: ou que ce n'est mêmes qu'une corde prolongée hors le cercle.



Le 3.^e Quand tous les deux côtez sont au dedans du cercle, & en sont deux cordes.

Le 4.^e Quand ils sont tous-deux au dehors.



Mais parce qu'alors cette sorte d'angle ne peut avoir de rapport au cercle, que parce qu'il seroit égal à un angle qu'on lui opposeroit au sommet, qui seroit nécessairement ou du 1.^{er} ou du 3.^e genre: il ne sera point nécessaire de rien dire de ce 4.^e genre, puisqu'on en pourra jauger par les autres.

Et ainsi il ne restera qu'à donner la mesure des trois premiers; ce que nous ferons par trois Theorèmes très-clairs & très-faciles, & dont même les deux derniers ne seront qu'une suite du premier: & en même temps si féconds, pour parler ainsi, qu'un très-grand nombre de propositions qui ne se prouvent dans la Geometrie ordinaire que par des voyes très-obscurés & très-embarassées, s'en déduiront sans peine, comme n'en étant que de simples Corollaires.

Mais pour cela, il est nécessaire de marquer la maniere dont on exprime les angles du premier & du troisième genre dans la Geometrie ordinaire. Car pour celui du deuxième, personne ne les a encore considérés.

PREMIER AVERTISSEMENT.

DEFINITIONS.

L'ANGLE du premier genre, qui est celui qui est compris entre une corde & une tangente, est appelé ordinairement *angle du segment*, *angulus segmenti*. VII.

Et l'angle du 3.^e genre qui est compris entre deux cordes qui se terminent d'une part à un même point de la circonference, l'*angle dans le segment*, *angulus in segmento*. Ce que pour mieux entendre, il faut remarquer, que toute corde partage le cercle en deux portions, qui sont appelées *segments*, & que ces segments sont égaux quand cette corde est un diamètre, & alors on les appelle des demy-cercles, & l'arc de chacun est une demy-circonference:

Mais qu'ils sont inégaux, quand c'est une autre corde que le diamètre, l'un étant plus petit que le demy-cercle, & l'autre plus grand. De sorte que pour abréger nous appellerons l'un le *petit segment*, & l'autre le *grand segment*.

Et delà il est clair que l'arc du petit segment est plus petit que la demy-circonference, & que l'arc du grand segment est plus grand que la demy-circonference.

Cela supposé, si on tire la corde FG, & au point F, la tangente *mn*: *FxG* est le petit segment, & *FyG* le grand segment.

Et l'angle *G F m*, l'angle *F* du petit segment; parce que la tangente *mF* est du côté de ce segment-là.

Et l'angle *G F n*, l'angle *F* du grand segment.



252. NOUVEAUX ELEMENS

Mais l'angle $F \text{ \& } G$ est l'angle dans le petit segment.

Et l'angle $F K G$, l'angle dans le grand segment.

II. AVERTISSEMENT.

- VIII. ON peut encore remarquer qu'au regard de l'angle du segment, il faut que la corde qui divise les deux segments soit décrite, parce qu'elle fait l'un des côtés de l'angle. Mais que cela n'est pas nécessaire au regard de l'angle dans le segment, parce que la corde n'est que la base de cet angle, & qu'elle est suffisamment marquée par les deux points de la circonférence auxquels aboutissent les deux côtés de l'angle. Ainsi l'angle $F K G$ est suffisamment marqué, quoi que la ligne $F G$ ne soit que sous-entendue & non tracée.



III. AVERTISSEMENT.

- IX. L'ANGLE dans le segment se peut exprimer en deux manières; ou par rapport au segment dans lequel il est inscrit, son sommet se trouvant dans l'arc de ce segment: ou par rapport à l'arc sur lequel il est appuyé. Et c'est en cette manière qu'il vaut mieux l'exprimer, quand la corde qui jointroit les extrémités de ses côtés n'est pas marquée, comme dans l'angle $F K G$, qui est appuyé sur l'arc $F Z G$; & alors on dit simplement que c'est un angle inscrit dans le cercle, sans parler de segment.

IV. AVER-

IV. AVERTISSEMENT.

IL est aisé de voir que l'angle inscrit dans un segment est toujours appuyé sur l'arc du segment opposé. Et qu'ainsi l'angle dans le grand segment est appuyé sur l'arc du petit segment : & au contraire l'angle dans le petit segment est appuyé sur l'arc du grand. X.

V. AVERTISSEMENT.

ENFIN, il faut remarquer, que quand on parle des arcs qui soutiennent les côtés d'un angle inscrit dans le cercle, on doit entendre les deux qui sont à côté l'un de l'autre, qui se joignent seulement en un point, & qui avec celui sur lequel l'angle inscrit est appuyé comprennent toute la circonférence. XI.

PREMIER THEOREME,

FONDAMENTAL DE TOUS LES
AUTRES.

TOUT angle compris entre une tangente & une corde, a pour mesure la moitié de l'arc soutenu par cette corde du côté de la tangente. XII.


Et parce que cet angle est aussi appelé l'angle du segment vers lequel est cette tangente : selon cela on doit dire, qu'il a pour mesure la moitié de l'arc de ce segment-là. De sorte que si c'est l'angle du petit segment, il a pour mesure la moitié de l'arc du petit segment ; & si c'est l'angle du grand segment, il a pour mesure la moitié de l'arc du grand segment.

Ce Théorème est le fondement de la mesure des angles par des arcs de cercles hors le centre

quels est leur sommet , & la preuve en est très-facile.

Soit la corde FG , & la ligne mn qui touche en F le cercle dont le centre est au point C . L'angle mFG est l'angle du petit segment , & nFG l'angle du grand.

Soit tiré le diamètre kK perpendiculaire à FG , & le rayon CF ; & PC perpendiculaire au diamètre kK , & par conséquent parallèle à FG . Ce diamètre kK coupera par la moitié les arcs du grand & du petit segment. (VII. 2. & 7.) D'où il s'ensuit que l'angle au centre FCk a pour mesure la moitié de l'arc du petit segment. Et qu'au contraire l'angle FCk a pour mesure la moitié de l'arc du grand segment.



De sorte que le Theorème sera démontré, (par le 1.^{er} Lemme ,) si on peut faire voir , que l'angle du petit segment mFG est égal à l'angle au centre FCk . Or cela est facile. Car CP & FG étant parallèles , les angles alternes que fait sur l'une & sur l'autre le rayon CF , (c'est à dire les angles PCF , & CFG ,) sont égaux. (VIII. 54.)

Or l'angle mFC (qui comprend l'angle du petit segment & l'angle CFG ,) est droit , (VII. 34.) & par conséquent égal à l'angle PCk , qui est droit aussi , & qui comprend les deux angles FCk & PCF . Donc ôtant de part & d'autre les angles CFG & PCF , (que l'on vient de faire voir être égaux :) l'angle du petit segment demeurera égal à l'angle FCk , qui a pour mesure la moitié de l'arc de ce petit segment.

Donc l'angle du petit segment mFG , a aussi pour

DE GEOMETRIE. Liv. IX. 255

pour mesure la moitié de cet arc du petit segment.
Ce qu'il falloit demontrer.

On fera voir de mêmes que l'angle du grand segment $\angle F G$ est égal à l'angle au centre $\angle F C K$, qui a pour mesure la moitié de l'arc du grand segment.

Car l'angle du grand segment comprend l'angle droit $\angle F C$ & l'angle $\angle C F G$. Et l'angle au centre $\angle F C K$ comprend aussi l'angle droit $\angle P C K$ & l'angle $\angle P C F$.

Or les angles $\angle C F G$ & $\angle P C F$ sont égaux, comme il vient d'être dit. Donc étant ajoutés chacun à un droit, ils rendent égaux l'angle du segment & l'angle au centre, qui a pour mesure la moitié de l'arc du grand segment.

Donc (par le 1.^{er} Lemme) l'angle du grand segment a pour mesure la moitié de l'arc du grand segment.


I. COROLLAIRE.

L'ANGLE du demy-cercle est droit.
Celui du petit segment est aigu.
Celui du grand, obtus
Cela est clair par le 2.^e Lemme.

XIII.

II. COROLLAIRE.

LORSQUE deux cercles, dont l'un est dans l'autre, se touchent toutes les cordes menées du point de l'attouchement à la circonférence du plus grand cercle soutiennent des arcs proportionnellement égaux dans les deux cercles; c'est à dire que la ligne entiere soutient dans le grand cercle un arc égal à celui que soutient dans le petit la partie $K d$ de cette même ligne.



Car

XIV.

Car les angles mKb & mKd sont le même angle. Or l'un a pour mesure la moitié de l'arc Kb , & l'autre la moitié de l'arc Kd . (12. *Sup.*) Donc ces deux arcs sont proportionnellement égaux.

II. THEOREME.

xv. Tout angle dont le sommet est dans la circonférence, & qui est compris entre une corde & la partie d'une autre corde prolongée hors le cercle du côté qu'elle est hors le cercle, a pour mesure la moitié des deux arcs qui sont à côté du sommet de cet angle, & qui sont soutenus par les deux cordes, dont l'une est le côté de l'angle, & l'autre en fait l'autre côté par sa partie prolongée hors le cercle.

Soient les deux cordes KD & KG , dont KD soit prolongée en F hors le cercle; je dis que l'angle FKG a pour mesure la moitié des deux arcs KD & KG .

Car (par VII. 36.) soit tirée par le point K la tangente mn : l'angle FKG comprend les deux angles FKn & nKG . Or l'angle FKn est égal à l'angle mKD , (VIII. 17.) parce qu'il lui est opposé au sommet. Donc l'angle FKG est égal aux deux angles nKG & mKD .



Or, par le 1.^{er} Theoreme, nKG a pour mesure la moitié de l'arc KG , & mKD a pour mesure la moitié de l'arc KD .

Donc l'angle FKG , qui est égal à tous les deux, a pour mesure l'une & l'autre moitié de ces deux arcs. C'est à dire la moitié de ces deux arcs, par le troisième Lemme.

Co-

COROLLAIRE.

Si l'on joint les extremités de deux cordes par deux autres cordes qui se croisent, & que l'on prolonge hors le cercle les deux premières cordes: les angles que le prolongement de chacune fera sur les cordes qui se croisent, seront égaux. xvi.

Soient les deux premières cordes Cf & $d g$.

Les deux qui se croisent, $f d$ & $g C$.

Les prolongemens, $K C$ & $k d$.

Je dis que les angles $K C g$ & $k d f$ sont égaux.

Car, par le précédent Théorème, l'un & l'autre a pour mesure la moitié des arcs $f C$, $C d$, $d g$.



III. THÉORÈME.

Tout angle inscrit au cercle, c'est à dire compris entre deux cordes qui ne se joignent que dans la circonférence, a pour mesure la moitié de l'arc sur lequel il est appuyé. xvii.

Et parce qu'on appelle aussi ces angles *angles dans le segment*: selon cela,

Tout angle dans un segment a pour mesure la moitié de l'arc du segment opposé. (Voyez le 4.^e Avertissement, 10. Sup.)

La preuve en est très facile par le premier Théorème.

Soit l'angle $f K g$. Je dis qu'il a pour mesure la moitié de l'arc $f g$.

Soit menée par le sommet K la tangente $m n$; l'angle inscrit $f K g$, plus les deux qui sont à côté


té

258 NOUVEAUX ELEMENS

té $f K m$ & $g K n$, valent deux droits. (VIII. 15.)

Donc ils ont pour mesure la demy-circonférence, par le 2.^e Lemme.

Donc ils ont pour mesure les trois moitiés des arcs fg , Kf , Kg , (par le 3.^e Lemme,) parce que ces trois arcs comprennent toute la circonférence.



Or l'un de ces trois angles, sçavoir $f K m$, a pour mesure la moitié de l'arc $K f$; & l'autre, sçavoir $g K n$, a pour mesure la moitié de l'arc $K g$. Donc il reste pour la mesure du 3.^e qui est l'angle inscrit, la moitié du 3.^e arc, qui est fg .

On peut encore prouver la même chose par le 2.^d Theorème. Car si on prolonge $f K$ jusqu'à i : les angles $f K g$ & $g K b$ valent deux droits, (VIII. 14.) & par conséquent ont pour mesure la moitié de la circonférence; & par conséquent aussi les trois moitiés des trois arcs $K f$, $K g$, fg .



Or l'angle $b K g$ a pour sa mesure la moitié des deux arcs $K f$ & $K g$, par le deuxième Theorème.

Reste donc pour la mesure de l'angle inscrit la moitié du troisième arc, qui est fg .

I. COROLLAIRE.

xviii. Il paroît par là, que si on ôte de la circonférence entière, c'est à dire de 360 degrés, les deux arcs que soutiennent les côtes de l'angle inscrit,

DE GEOMETRIE. LIV. IX. 239

scrit , la moitié de ce qui restera sera la mesure de l'angle inscrit ; comme si l'un de ces arcs est de 100 degrez , & l'autre de 44 : ôtant 144 de 360 , il restera 216 , dont la moitié est 108 pour la mesure de l'angle inscrit.

II. COROLLAIRE.

Il paroît aussi qu'on peut dire encore : Que XIX.
tout angle inscrit a pour mesure la demy circonférence , moins la moitié des deux arcs qui sont soutenus par ses côtez , ou moins l'arc qui est soutenu par l'un de ses côtez quand il est isoscele.

Cela est clair par la démonstration precedente , & par le troisieme Lemme.

Et cette mesure est souvent plus commode que l'autre ; comme si l'on sçait que des arcs que soutiennent les côtez de l'angle inscrit l'un est de 100 degrez , & l'autre de 44 : ôtant 50 & 22 , qui font 72 , de 180 , ce qui restera , qui est 108 , est la mesure de cet angle inscrit.

Et cela est encore plus facile quand l'angle inscrit est isoscele , comme si l'un & l'autre de ses côtez soutient un arc de 36 degrez ; car ôtant 36 de 180 , ce qui reste , qui est 144 , est la mesure de cet angle inscrit.

III. COROLLAIRE.

Tous les angles inscrits dans le même segment , XX.
ou appuyez sur le même arc , ou sur des arcs égaux , sont égaux. Car ils ont la moitié du même arc , ou de deux arcs égaux , pour mesure. Donc ils sont égaux par le premier Lemme.

Et il est clair aussi (par le premier & le deuxième Corollaire ,) que des angles inscrits sont égaux , quand les arcs que soutiennent les deux côtez de l'un , sont égaux , pris ensemble , aux arcs que soutiennent

nent les deux côtez de l'autre ; & qu'il ne peuvent être égaux que cela ne soit.

Que si, au contraire, des angles inscrits sont supposez égaux, ils faut qu'ils soient appuyez sur des arcs ou tout-égaux, si c'est dans le même cercle ou en des cercles égaux que ces angles soient inscrits : ou qui ne sont que proportionnellement égaux si c'est dans des cercles inégaux. Ce qu'il faut aussi supposer dans la première partie de ce Corollaire. Car les arcs qui ne sont que proportionnellement égaux sont autant pour l'égalité des angles, que s'ils étoient tout-égaux.

IV. COROLLAIRE.

- XXI.** Si deux angles inscrits en divers cercles sont égaux, & qu'ils soient soutenus par des cordes égales, les cercles dans lesquels ils sont inscrits sont égaux.

Car les angles inscrits en divers cercles ne scauroient être égaux, qu'ils ne soient appuyez sur des arcs proportionnellement égaux ; & des arcs proportionnellement égaux ne scauroient être soutenus par des cordes égales en divers cercles, que les cercles ne soient égaux. Donc, &c.

V. COROLLAIRE.

- XXII.** Lorsque deux cercles dont l'un est au dedans de l'autre se touchent, si du point de l'attouchement on mène deux lignes jusques à la circonférence du plus grand : les arcs de l'une & de l'autre circonférence compris entre ces deux lignes seront proportionnellement égaux. Car le même angle sera mesuré par la moitié de l'un & de l'autre de ces arcs.



VI.Co-

VI. COROLLAIRE.

Si un cercle a pour centre un point de la cir- xxiii.
conférence d'un autre cercle, &
que de ce point on tire deux li-
gnes qui coupent l'une & l'autre
circonférence: des deux arcs com-
pris entre ces deux lignes, celui
de la circonférence laquelle a ce
point pour centre, est propor-
tionnellement égal à la moitié de
l'autre, c'est à dire à la moitié
de l'arc de celle dans laquelle est ce point. Car
le même angle a pour mesure le premier arc en-
tier & la moitié de l'autre.



VII. COROLLAIRE.

Si l'angle inscrit & l'angle au centre sont ap- xxiv.
puyez sur le même arc, l'angle au centre est dou-
ble de l'angle inscrit. Car l'inscrit a pour mesure
la moitié de l'arc, qui entier est la mesure de l'an-
gle au centre.

VIII. COROLLAIRE.

Tous les angles dans un segment sont égaux xxv.
à l'angle du segment opposé. Et ainsi l'angle dans
le grand segment est égal à l'angle du petit seg-
ment; & l'angle dans le petit segment est égal à
l'angle du grand.

Car l'angle dans le grand segment est appuyé sur
l'arc du petit. Donc il a pour mesure la moitié
de l'arc du petit, qui est aussi la mesure de l'angle
du petit segment.

IX. COROLLAIRE.

- XXVI. L'ANGLE dans le demy-cercle est droit.
 Dans le grand segment, aigu.
 Dans le petit, obtus.
 Cela est clair par le deuxième Lemme.

X. COROLLAIRE.

- XXVII. LES angles inscrits en deux segmens opposez sont égaux à deux droits. Car les arcs des deux segmens comprennent toute la circonference. Donc la moitié de l'un, qui est la mesure de l'un de ces angles, plus la moitié de l'autre, qui est la mesure de l'autre angle, valent la demy-circonference, (par le troisième Lemme.) Donc pris ensemble ils ont pour mesure la demy-circonference. Donc ils valent deux droits.

XI. COROLLAIRE.

- XXVIII. Si quatre cordes ne se joignent qu'aux extrémités, elles font quatre angles inscrits, dont les opposez sont égaux à deux droits. C'est la même chose que le précédent.

XII. COROLLAIRE.

- XXIX. L'ANGLE aigu qui est dans le grand segment est le complement de l'obtus qui est dans le petit. Cela est clair, puisque les deux ensemble valent deux droits.

XIII. COROLLAIRE.

- XXX. LA moitié de la base d'un angle inscrit est son sinus, s'il est capable d'en avoir, c'est à dire s'il est aigu : ou de son complement, s'il est obtus. Car le sinus est la moitié de la corde du double de

de l'arc. (VII. 15.) Or la base d'un angle inscrit est la corde d'un arc qui est double de celui qui mesure l'angle inscrit. Donc la moitié de cette corde est son sinus, s'il est aigu : ou s'il est obtus, le sinus de son complément, c'est à dire de l'angle aigu, qui étant inscrit dans le segment opposé, a aussi cette corde pour sa base.

XIV. COROLLAIRE.


ON dit qu'un segment est capable d'un tel angle, quand tous les angles dans ce segment sont égaux à cet angle. XXXI.

Et quand cela est, il est impossible qu'un angle de cette grandeur ait pour base la corde de ce segment, que son sommet ne se trouve dans un des points de l'arc du segment.

Supposons par exemple que le segment A soit capable de l'angle K ; je dis que tout angle égal à l'angle K, qui aura b C pour base, aura son sommet dans un des points de l'arc du segment A.

Car, s'il l'avoit au dedans du cercle, comme en d : prolongeant C d jusques en f, point de la circonférence, & tirant la ligne b f, l'angle b f C sera égal à l'angle K, par l'hypothèse. Or l'angle b d C, par le 4.^{me} Lemme, est égal à l'angle b f C, plus l'angle f b d. Donc il est plus grand que le seul angle b f C. Donc il est plus grand que l'angle K.

Et si le sommet étoit hors du segment, comme en g : tirant une ligne de b au point où C g coupe le cercle, comme à f, on prouvera que l'angle b f C, égal à K, sera plus grand que l'angle



264 NOUVEAUX ELEMENS

gle $b g C$, parce qu'il sera égal à $b g C$ plus $g b f$, par le quatrième Lemme.

Donc l'angle qui a $b C$ pour base ne peut être égal à K , qui est l'angle dont le segment A est capable, qu'il n'ait son sommet dans la circonférence; puisque s'il l'avoit au dedans il seroit plus grand, & s'il l'avoit au dehors il seroit plus petit.

XV. COROLLAIRE.

XXXII. Si de l'hypoténuse ou surlendante d'un angle droit on fait le diamètre d'un cercle, le sommet de cet angle droit se trouvera dans la circonférence du cercle.

Car chaque demy-cercle est capable de cet angle droit. (26. *sup.*) Donc, par le Corollaire précédent, nul angle droit ne peut avoir pour hypoténuse la corde du demy-cercle, c'est à dire le diamètre, que son sommet ne se trouve en un des points de la demy-circonférence.

XVI. COROLLAIRE.

XXXIII. Si du sommet d'un angle on tire une ligne au milieu de la base, & que cette ligne soit égale à la moitié de cette base, l'angle est droit; mais si elle est plus longue, il est aigu; & si elle est plus courte, il est obtus.

Car faisant un demy-cercle qui ait pour centre le point du milieu de la base, & pour intervalle la moitié de la base: le sommet de l'angle se trouvera dans un des points de la demy-circonférence, si la ligne tirée du sommet au milieu de la base est égale à la moitié de la base. Donc l'angle sera droit.

Et le sommet se trouvera au dehors du demy-cercle, si elle est plus longue. Donc l'angle sera plus

DE GEOMETRIE. LIV. IX. 265

plus petit qu'un droit par le neuvième Corollaire, & par conséquent aigu.

Et il se trouvera au dedans du demy-cercle si elle est plus courte. Donc l'angle sera plus grand qu'un droit par le neuvième Corollaire. Donc il sera obtus.

XVII. COROLLAIRE.

QUAND deux cordes égales se coupent, cha- XXXV.
que partie de l'une est égale à chaque partie de l'autre.

Soient les cordes égales BC & mn , qui se coupent en o . Les arcs Bn & Cm sont égaux, (V. 26.) parce qu'ils sont soutenus par des cordes égales. Donc ôtant de ces deux arcs l'arc nC , qui leur est commun, les arcs Bn & Cm demeu-



rent égaux. Donc tirant la ligne nC , les angles inscrits nCB & Cnm sont égaux, (20. sup.) parce qu'ils sont appuyez sur des arcs égaux. Donc les deux lignes on & oC sont égales, parce qu'étant menées d'un même point elles font des angles égaux sur la même base. (VIII. 48.) Et on prouvera de mêmes, en tirant la ligne Bm , que om & oB sont égales. Donc chaque partie de l'une de ces cordes est égale à chaque partie de l'autre.

I. PROBLEME.

TROUVER l'angle droit dont on a l'hypote- XXXV.
nuse & la distance du sommet à l'hypoténuse.

Elever de l'extrémité de l'hypoténuse une perpendiculaire égale à cette distance, & tirer par l'autre extrémité de cette perpendiculaire une parallèle à l'hypoténuse.

M

L'un

L'un des deux points où cette parallèle coupera le cercle qui aura l'hypoténuse pour diamètre, ou le point de l'atouchement, si elle le touche, sera le sommet de cet angle droit qui en déterminera les côtes.

Car la distance étant donnée de ce sommet à l'hypoténuse, il ne se peut trouver ailleurs (d'un côté) qu'en quelqu'un des points de cette parallèle; & parce que cet angle est supposé droit, il faut par le 15.^e Corollaire que le sommet se trouve aussi en quelqu'un des points de la demy-circonférence. Donc en un des points où elle la coupe, ou en celui auquel elle le touche,



II. PROBLEME.

XXXVI. D'un point hors le cercle tirer les tangentes au cercle, & montrer qu'on n'en peut tirer que deux, & qu'elles sont égales.

Soit k le point hors le cercle, & C le centre du cercle. Joindre ces points par une ligne. Décrire le cercle qui aura cette ligne pour diamètre; il coupera le premier en deux points comme f & g . Enfin les lignes $k f$ & $k g$ étant tirées, elles toucheront le premier cercle en f & en g , sans qu'on en puisse tirer d'autres, & elles seront égales.



Car l'angle que l'une & l'autre fait avec le rayon du premier cercle est droit, (26. sup.) parce qu'il est dans un demy-cercle.

Et il ne peut y avoir que ces deux lignes tirées du point k qui touchent le cercle; parce que le sommet de l'angle droit, qui doit avoir pour côtes la tangente tirée de k & un rayon du premier cercle,

DE GEOMETRIE. Liv. IX. 267

cercle, doit être en un point commun aux circonférences des deux cercles. Car ce sommet doit être dans la circonférence du premier cercle, à cause qu'un rayon du premier est un de ses côtes; & dans celle du second, à cause que tous les angles droits qui ont le diamètre du second cercle pour hypoténuse doivent avoir leur sommet dans la circonférence de ce second cercle. (32. *sup.*)

Or il n'y a que les points *f* & *g* qui soient communs aux deux cercles. Donc on ne peut tirer de *k* que les deux tangentes *k f* & *k g*.

Et il est clair qu'elles sont égales, puis qu'elles soutiennent des arcs égaux dans la circonférence du nouveau cercle. (V. 26.)

III. PROBLEME.

DANS un cercle donné couper un segment qui XXXVII.

Ayant tiré une tangente au cercle, la corde qui fera avec cette tangente au point de l'attouchement un angle égal à l'angle donné, satisfera au Probleme. Car cet angle égal au donné sera l'angle d'un segment. Donc il sera égal à tout angle inscrit dans l'autre segment. (25. *sup.*) Donc cet autre segment sera capable de l'angle donné. (31. *sup.*)



IV. PROBLEME.

TROUVER le cercle dont le segment terminé par une ligne donnée soit capable d'un angle donné. XXXVIII.

Soit la ligne donnée *b d*, & l'angle donné *k*; soit tirée *b f* qui fasse sur *b d* un angle égal à l'angle *k*.

Soit élevé du point *b* une perpendiculaire à *b f*;

M 2

&

268 NOUVEAUX ELEMENTS

& qu'il y ait une autre perpendiculaire à bd qui coupe bd par la moitié ; le point C , où je suppose que ces deux perpendiculaires se rencontreront , sera le centre du Cercle qui aura Cb ou Cd pour intervalle , & fb pour tangente.

Donc le segment opposé à celui vers lequel est fb sera capable d'un angle égal à l'angle fbd , par le 8.^e Corollaire, parce que l'un sera l'angle du segment, & l'autre l'angle dans le segment opposé.



V. PROBLEME.

CONNOISSANT qu'elle est la distance de trois points l'un de l'autre , comme de b , C , d , & ne sachant d'un 4.^e comme x , si par de quel côté il est à l'égard de ces trois-là , & qu'elle est la grandeur de l'angle compris entre les lignes xb & xc , & celui qui est compris entre les lignes xc & xd : trouver ce 4.^e point.

Les lignes bC & Cd sont données par l'hypothèse.

Et les angles donnez soient f & g .

Trouver par le Probleme precedent le Cercle dont le segment terminé par bC , tourné vers x , soit capable de l'angle f .



Et trouver de même un autre Cercle dont le segment terminé par Cd & tourné vers x , soit capable de l'angle g .

Ces deux Cercles se couperont en deux points, dont l'un sera C par la construction, & l'autre x ; ce qui se prouve ainsi:

Les

DE GEOMETRIE. LIV. IX. 269

Les deux angles bxc , & Cxd , dont la grandeur est connue, ont leur sommet au même point.

Or par le 14.^e Corollaire l'angle égal à f ayant bC pour base, ne peut avoir son sommet ailleurs que dans un des points de l'arc du segment qu'on a trouvé être capable de l'angle f . Et par la même raison l'angle égal à g ayant Cd pour base, ne peut aussi avoir son sommet ailleurs que dans un des points de l'arc du segment qu'on a trouvé être capable de l'angle g . Donc il faut que ce point, qui est le sommet de tous les deux angles, soit commun à tous les deux Cercles. Donc il faut que ce soit l'un des deux points où ils se coupent. Or il est bien visible que ce n'est pas le point C . Donc l'autre point où ils se coupent est le point x que l'on cherchoit.

II.

Des Angles dont le sommet est au dedans du Cercle & ailleurs qu'au centre.

QUAND le sommet d'un Angle est au dedans du Cercle, mais ailleurs qu'au centre, comme peut être l'angle K , ses côtes doivent toujours être considerez comme terminez par la circonference, comme aux points f & g ; & de plus il les faut aussi prolonger au delà du sommet jusques à la circonference de l'autre part, en prolongeant par exemple fK jusques en C , & gK jusques en d .

Et ainsi ces angles se reduisent aux angles qui se font dans la section de deux cordes qui se coupent au dedans du Cercle, où il se fait quatre angles dont les opposez sont égaux, & qui sont appuyez chacun sur l'un des quatre arcs



270 NOUVEAUX ELEMENTS.

auxquels cette circonférence se trouve divisée par ces deux cordes.

Voicy donc le Theorème qui nous apprendra la mesure de ces angles :

IV. THEOREME.

XL I. TOUT Angle fait par la section de deux cordes qui se coupent au dedans du Cercle , a pour mesure la moitié de l'arc sur lequel il est appuyé , plus la moitié de l'arc opposé.

Soient les deux cordes ef & dg qui se coupent en K . Prenons lequel on voudra des quatre angles qu'elles font en se coupant , comme fKg ; je dis qu'il aura pour sa mesure la moitié de l'arc fg plus la moitié de l'arc opposé dc .

Soient joints les points d, f ; l'angle fKg est égal aux deux angles vers d & vers f , (par le quatrième Lemme.)

Or l'angle vers d , a pour mesure la moitié de l'arc fg sur lequel il est appuyé : (17. sup.) & l'angle vers f la moitié de l'arc dc , par la même raison.

Donc l'angle fKg qui leur est égal , a pour sa mesure les moitiés de ces deux mêmes arcs ; ce qu'il falloit démontrer.



COROLLAIRE.

XL II. QUAND deux cordes égales, moindres que des diamètres, se coupent, elles divisent la circonférence en quatre arcs, dont il y en a deux opposés qui sont égaux, & deux autres inégaux ; & alors les angles qui sont appuyés sur chacun de ces arcs égaux ont pour mesure cet arc entier.

Car les opposés étant égaux, un entier est la même chose que la moitié de l'un plus la moitié de l'autre.

Je

Je ne prouve point ce qui est supposé dans ce Corollaire, parce que c'est une suite visible de ce qui a été démontré *sup.* 34.

III

Des Angles dont le sommet est hors le Cercle que leurs côtez coupent ou touchent.

Les côtez d'un Angle dont le sommet est hors le Cercle peuvent

- Ou le couper tous-deux;
- Ou le toucher tous-deux;
- Ou l'un le couper & l'autre le toucher.

Mais quand ils le coupent, on les considère toujours comme entrans dans le Cercle selon sa convexité, & étant terminez par la circonference au dedans du Cercle selon sa concavité.

C'est pourquoy ces angles sont toujours considerez comme étant appuyez sur deux arcs du Cercle, l'un concave & l'autre convexe.

Quand les deux côtez le coupent, l'arc concave est celui qui est compris entre les deux points de la circonference où les deux côtez sont terminez. Et le convexe est celui qui est compris entre les deux points par où ils entrent dans le Cercle.

Quand tous les deux côtez touchent le Cercle, l'un & l'autre est compris entre les deux points de l'attouchement; mais l'un est concave au regard de l'angle, & l'autre convexe.



Et quand l'un touche & l'autre coupe le Cercle, le concave est compris entre le point de l'atouchement & celui où se termine l'autre côté; & le convexe entre le point de l'atouchement & celui où l'autre côté entre dans le Cercle.



Il étoit nécessaire de bien expliquer ces deux sortes d'arcs, parce que de là dépend la mesure des angles dont il s'agit, selon ce Theorème :

V. THEOREME.

- XLIV. LORS que le sommet d'un Angle est hors le Cercle, soit que ses deux côtés coupent le Cercle, ou que tous deux le touchent, ou que l'un le coupe & l'autre le touche: il a pour mesure la moitié de l'arc concave, moins la moitié de l'arc convexe.

PREUVE DANS LE PREMIER CAS.

Soit l'angle K , dont le côté Kf coupe le Cercle en C , & Kg en d ; l'arc concave est fg , & le convexe Cd . Il faut donc prouver que cet angle a pour mesure la moitié de l'arc fg , moins la moitié de l'arc Cd ; & on le prouve ainsi:

Soit tirée la ligne fd . Par le 4^e. Lemme, l'angle fdg est égal à l'angle K , plus l'angle Kfd .

Donc l'angle K est égal à l'angle fdg , moins l'angle Kfd : Donc il doit avoir pour mesure la mesure de l'angle fdg , moins la mesure de l'angle Kfd .

Or la mesure de l'angle fdg est la moitié de l'arc concave fg sur lequel il est appuyé; & la mesure de l'angle Kfd est la moitié de l'arc convexe Cd .



Donc

DE GEOMETRIE. LIV. IX. 273.

Donc l'angle K a pour mesure la moitié de l'arc concave fg , moins la moitié de l'arc convexe Cd .

PREUVE DU SECOND CAS.

Soit l'angle K , dont les côtes Kf & Kg touchent le cercle, & soit Kg prolongée jusques en b .

L'angle fgb est égal à l'angle K plus l'angle Kfg .
Donc l'angle K est égal à l'angle fgb , moins l'angle Kfg .



Or l'angle fgb a pour mesure la moitié de l'arc du grand segment fg , & l'angle Kfg a pour mesure la moitié de l'arc du petit segment fg . (12. sup.) Donc l'angle K , a pour mesure la moitié de l'arc du grand segment, qui est l'arc concave, moins la moitié de l'arc du petit segment, qui est l'arc convexe.

La preuve du troisième Cas est semblable à ces deux-là, tenant quelque chose de l'un & de l'autre. Il vaut mieux la laisser trouver.

AVERTISSEMENT.

Outre cette mesure qui est generale à toutes ces sortes d'angles, il y en a qui sont particulieres à quelques-uns qu'il est bon de marquer par des Theorèmes particuliers.

VI. THEOREME.

UN Angle ayant son sommet hors le Cercle, si l'un de ses côtes qui coupe le Cercle se termine à l'extrémité d'un diamètre auquel l'autre côté est perpendiculaire, soit en coupant le Cercle, soit

M

en

274. NOUVEAUX ELEMENS

en le touchant, soit même étant hors le Cercle, ce diamètre y étant prolongé : en tous ces cas, cet Angle a pour sa mesure la moitié de l'arc que soutient la partie de son côté non perpendiculaire au diamètre.

Il ne sera pas inutile de donner ce Theorème pour exemple des diverses voyes que les principes qu'on a établis peuvent fournir pour démontrer une même chose.

PREMIERE DEMONSTRATION.

XLVI. SOIT le diamètre K g prolongé jusques à h. Soit de K tirée une ligne infinie qui coupe le cercle en c.


Soient de divers points de cette ligne hors le Cercle comme de l, m, n, tirées sur le diamètre les perpendiculaires lf, mg, nb. J'ai à prouver que chacun de ces angles vers l, m, n, a pour mesure la moitié de l'arc cK.

Ce qu'on peut faire en cette maniere :

Chacun des angles vers l, m, n, plus l'angle vers K, valent un angle droit par le 4.^e Lemme, parce que ce sont les angles sur la base d'un angle droit. Donc chacun de ces angles, plus l'angle vers K, ont pour mesure la moitié de la demy-circonférence. Donc ils ont aussi pour mesure, par le 3.^e Lemme, les deux moitiés des deux arcs cK & cg, qui comprennent la demy-circonférence.


Or l'angle vers K a pour sa mesure la moitié de l'arc cg sur lequel il est appuyé.

Reste donc pour la mesure de chacun des autres la moitié de l'arc cK. Ce qu'il falloit démontrer.



SECONDE DEMONSTRATION.

SOIT encore tirée la ligne cg . L'angle Kcg XLVII. est droit, (26. *sup.*) parce qu'il est dans le demy-cercle. Donc l'angle cgK est égal à chacun des angles vers l , m , n : puisque chacun de ces angles, plus l'angle vers K , sont aussi égaux à un droit.




Or l'angle cgK a pour mesure la moitié de l'arc cK , sur lequel il est appuyé.

Donc la moitié de cet arc cK est aussi la mesure de chacun des angles vers l , m , n .

TROISIÈME DEMONSTRATION.

SOIT tirée la ligne cd qui coupe perpendicu- XLVIII. lairement le diamètre, ce qui fera que les arcs Kc & Kd seront égaux. (VII. 2. & 7.) Et la ligne cd étant parallèle aux lignes lf , mg , nh , les angles que font ces parallèles sur la même ligne aux points c , l , m , n , sont égaux. (VIII. 59.)



Or l'angle Kcd a pour mesure la moitié de l'arc Kd égal à l'arc Kc . Donc chacun des angles vers l , m , n , a pour mesure la moitié de l'un ou l'autre de ces deux arcs qui sont égaux, Kd & Kc . Donc on peut dire qu'ils ont pour mesure la moitié de l'arc cK . Ce qu'il falloit démontrer.

M 6

QUA-

QUATRIÈME DEMONSTRATION.

XLIX, C'EST l'application de la démonstration du Théorème général à ce cas particulier.

Je suppose que la perpendiculaire Lf coupe le Cercle en p & en q . Par la démonstration du Théorème général, l'angle L a pour mesure la moitié de son arc concave Kq , moins la moitié de son arc convexe ep .

Or l'arc concave Kq est égal aux deux arcs Ke , & ep .

Donc la moitié de l'arc Kq est la même chose que la moitié de l'arc Ke , plus la moitié de l'arc ep , par le 3.^e Lemme.

Donc la moitié de l'arc Kq , moins la moitié de l'arc ep , est la même chose que la moitié de l'arc Ke .

Donc la moitié de l'arc Ke est la mesure de l'angle L . Ce qu'il falloit démontrer.




CINQUIÈME DEMONSTRATION.

AVANT tiré la tangente PK , cette tangente sera parallèle aux lignes lf ,

mg , nb , qui sont perpendiculaires au diamètre. Donc l'angle PKC , est égal aux angles vers l , m , n . (VIII.

34.) Or l'angle PKC a pour sa mesure la moitié de l'arc KC , (par 12. *sup.*)

Donc chacun des autres angles vers l , m , n , aura aussi pour sa mesure la moitié de ce même arc. Je croi que cette démonstration est la meilleure de routes.



DES.

DES ANGLES DONT LES
DEUX COSTEZ

TOUCHENT LE CERCLE.

IL est bon d'en dire quelque chose en particulier, L II.
outre ce qu'on en a dit en general.

On les peut appeller des *Angles circonscrits*;

Et voicy une nouvelle maniere de les mesurer:

VII. THEOREME.

L'ANGLE circonscrit au Cercle, c'est à dire L II.
dont les deux côtez touchent le Cercle, a pour mesure la demy-circonference, moins l'arc convexe sur lequel il est appuyé.

PREMIERE DEMONSTRATION

SOIT l'angle K, à qui soit donnée pour base la ligne *bd*, qui joint les deux points d'attouchement. L'angle K, plus les deux angles sur la base, sont égaux à deux droits, c'est à dire ont pour mesure, pris ensemble, la demycirconference. (VIII. 62.)

Or les deux angles sur la base ont chacun pour mesure la moitié de l'arc convexe *bd*, par le 1.^{er} Theoreme.

Donc la mesure des deux est cet arc convexe tout-entier.

Donc ôtant cet arc convexe de la demycirconference, ce qui restera sera la mesure de l'angle K circonscrit au Cercle; ce qu'il falloit demontrer.



SECONDE DEMONSTRATION.

PAR la demonstration generale l'angle K a pour mesure la moitié de l'arc concave, moins la moitié de l'arc convexe. (44. *Sup.*) Or ces deux arcs comprennent toute la circonference. Donc, par le 3.^e Lemme, la moitié de toute la circonference, moins l'arc convexe entier, est la même chose que la moitié de l'arc concave, moins la moitié du convexe.

I. COROLLAIRE.

LIII. Deux angles circonscrits sont égaux quand ils sont appuyez sur des arcs convexes d'autant de degrez, & le plus grand est celui qui est appuyé sur un arc de moins de degrez.

Car si de 180 degrez on ôte un nombre égal, ce qui reste est égal, & plus le nombre qu'on en ôte est petit, plus ce qui reste est grand. Donc &c.

II. COROLLAIRE.

LIV. Si un angle circonscrit est appuyé sur un arc convexe qui soit soutenu par le côté d'un angle inscrit isoscele, l'angle inscrit & le circonscrit sont égaux.

Car ôtant cet arc de la demy-circonference, ce qui restera sera la mesure du circonscrit par 52. S. & de l'inscrit par 19. S.



III. COROLLAIRE.


LV. Il est bon de considerer toujours les côtés de l'angle circonscrit comme terminez au point de l'atouche

touchement. Et suivant cela il faut dire que tout angle circonscrit est isoscele: car les deux tangentes au Cercle menées du même point sont toujours égales, par VII. 39.

IV. COROLLAIRE.

LA ligne menée du sommet de l'angle circonscrit au centre divise toujours cet angle par la moitié. Et l'on peut appeller ces deux moitiés de l'angle circonscrit *des demy-angles circonscrits*. LVII.


Car si on tire deux rayons aux points d'atouchement, on ne pourra considérer ces deux demy-angles, qu'on ne voye sans peine que les côtes de l'un sont égaux aux côtes de l'autre; & que les rayons du même Cercle, & par conséquent les sinus, en sont égaux. Donc ils sont égaux. (VIII. 46.)



V. COROLLAIRE.

Les angles circonscrits au même Cercle sont égaux, quand les tangentes de l'un sont égales aux tangentes de l'autre. LVIII.

Soit Kb tangente de l'angle K égale à Zp , tangente de l'angle Z . Je dis que les angles K & Z sont égaux. Car tirant les lignes du centre KC & ZC , & les rayons Cb & Cp , les angles KbC & ZpC sont égaux, parce qu'ils sont tous deux droits. (13. sup.)



Et les côtes de l'un sont égaux aux côtes de l'autre, puisque par l'hypothèse Kb est égale à Zp , &

230 NOUVEAUX ELEMENS

& que que Cb & Cp sont les rayons du même Cercle.

Donc les bases KC & ZC de ces angles sont égales. (VIII. 67.)

Donc les angles bKC & pZC sont égaux, (VIII. 66.) les côtes de l'un étant égaux aux côtes de l'autre, & ayant les deux rayons pour leurs bases.

Or ces deux angles bKC & pZC sont chacun la moitié de chaque angle circonscrit, par le Corollaire précédent.

Donc les angles circonscrits sont égaux : ce qu'il falloit démontrer.

VI. COROLLAIRE.

LVIII. LES angles circonscrits au même Cercle sont égaux, quand leur sommet est également éloigné du centre, & les plus petits sont ceux dont le sommet en est plus éloigné.

Cela est facile à prouver par les demy-angles circonscrits, & je le laisse à trouver à ceux qui commencent, pour faire essai de leurs forces.

RECAPITULATION DE LA MESURE DES ANGLES.

LIX.	LE sommet de l'angle est		
	Dans le Cercle	{ Au centre.	1.
		{ Hors le centre.	2.
	Dans la Circonf.	{ L'un des côtes au dedans du Cercle,	
		{ Et l'autre au dehors,	{ le touchant. 3.
		{ Tous-deux au dedans du Cercle.	{ le coupant. 4.
			5.

Hors

Hors le Cercle	{	Les deux côtes le coupant.	6.
		Les deux le touchant.	7.
		L'un le coupant, & l'autre le touchant.	8.
		Et mêmes l'un le coupant & étant terminé à l'extrémité du diamètre, & l'autre étant hors le Cercle, mais perpendiculaire à ce diamètre prolongé.	9.

ET CES ANGLES ONT POUR MESURE,

1. L'arc sur lequel il est appuyé. VIII. 30.
2. La moitié de l'arc sur lequel il est appuyé, plus la moitié de l'arc opposé. IX. 41.
3. La moitié de l'arc que soutient le côté qui est au dedans du cercle. IX. 12.
4. La moitié de l'arc que soutient le côté qui est au dedans du Cercle, plus la moitié de celui que soutient le prolongement du côté qui est hors le Cercle. IX. 15.
5. La moitié de l'arc sur lequel il est appuyé. IX. 17.
6. } La moitié de l'arc concave sur lequel il
7. } est appuyé, moins la moitié de l'arc
8. } convexe. IX. 44.
7. La demy-circonférence, moins l'arc convexe sur lequel il est appuyé. IX. 52.
- 8 & 9. La moitié de l'arc soutenu par la partie du côté non perpendiculaire au diamètre. IX. 45.



NOU-



NOUVEAUX ELEMENS
DE
GEOMETRIE.
LIVRE DIXIÈME.

DES LIGNES PROPORTIONNELLES.

- I. **L** a proportion des lignes dépend de deux choses, des parallèles & des angles; & ainsi elle n'a pu se bien traiter qu'après l'explication de l'une & de l'autre. Et mêmes pour en bien comprendre tout le mystère, il faut reprendre beaucoup de choses des parallèles, que nous proposerons en forme de Lemmes.

I. LEMME. DEFINITION.

- II. **U** N espace compris d'une part entre deux parallèles & indéfini de l'autre, soit appelé *espace parallèle*. II. LEM.

II. LEMME. DEFINITION.

COMME on ne considère dans ces espaces que la distance entre les parallèles, leur grandeur dépend de cette distance qui est mesurée par les perpendiculaires comprises entre ces parallèles, que nous appellerons pour cette raison *les perpendiculaires des espaces*. III.

Et de là il s'ensuit que ces espaces sont égaux quand les perpendiculaires de l'un sont égales aux perpendiculaires de l'autre.

III. LEMME. DEFINITION.

ON dit qu'une ligne est dans un espace parallèle quand elle est terminée par les parallèles qui le terminent, comme la ligne *b* est dans l'espace *A*. IV.

On dit qu'une ligne est parallèle à un espace quand elle l'est aux lignes qui le terminent, comme la ligne *b* est parallèle à l'espace *A*.



IV. LEMME.

L'INCLINAISON d'une ligne dans un espace se considère par l'angle aigu qu'elle fait sur l'une & l'autre parallèle, le faisant toujours égal. V.

D'où il s'ensuit que deux lignes sont également inclinées dans le même espace, ou dans deux espaces différens, quand les angles aigus que fait l'une sont égaux aux angles aigus que fait l'autre.

Et que la moins inclinée est celle qui fait son angle aigu moins aigu & plus approchant du droit.

V. LEMME IMPORTANT.

LORSQU'ON deux ou plusieurs lignes sont menées d'un VI.

284 NOUVEAUX ELEMENS

d'un même point sur la même ligne, elles sont censées être dans un même espace parallèle. (VIII. 61.) Car il ne faut alors que concevoir une ligne menée par ce point commun, qui soit parallèle à celle qui les termine. D'où il s'ensuit que les côtes d'un angle terminées par une base sont toujours censées être dans le même espace parallèle.

VI. LEMME.

VII. DEUX angles soient appelez semblables, lors qu'étant égaux, les angles sur la base de l'un sont égaux aux angles sur la base de l'autre chacun à chacun.

Et on est assuré que cela est; 1. quand on sçait qu'ils sont égaux, & qu'un des angles sur la base de de l'un est égal à l'un des angles sur la base de l'autre: car delà il s'ensuit que l'autre est égal aussi.

2. Lors qu'étant égaux il sont de plus Isosceles.

VII. LEMME.

VIII. QUAND les sommets de deux angles sont également distans chacun de sa base, (prolongée s'il est besoin,) ces deux angles peuvent être compris dans le même espace parallèle. Car mettant ces deux bases sur une même ligne, la ligne qui passera par les deux sommets sera parallèle à celle qui comprendra les deux bases.

VIII. LEMME.

IX. DANS le même espace parallèle, ou dans les espaces parallèles égaux, toutes les également inclinées sont égales, & toutes les égales sont également inclinées. VIII. 56.

Et au contraire les espaces parallèles sont égaux quand les également inclinées y sont égales. Car de-
là.

là il est certain que les perpendiculaires se font aussi
VIII. 58.

IX. LEMME.

Lors qu'une même ligne est coupée par plusieurs lignes toutes parallèles, toutes les portions de cette ligne coupée sont également inclinées entre les parallèles qui les renferment. VIII. 59.

X.

X. LEMME.

Lors qu'il y a proportion entre quatre lignes, on dit que deux de ces lignes sont proportionnelles aux deux autres lignes; quand les deux antécédens de la proportion se trouvent dans les deux premières, & les deux conséquens dans les deux dernières. D'où il s'ensuit qu'*Alternando*, on peut prendre aussi les deux premières pour les deux termes d'une raison, & les deux dernières pour les deux termes de l'autre. (II. 36.)

XI.

PROPOSITION FONDAMENTALE

DES LIGNES PROPORTIONNELLES.

Lors que deux lignes sont également inclinées en deux différens espaces parallèles, elles sont entr'elles comme les perpendiculaires de ces espaces; & leurs éloignemens du perpendicule sont aussi en même raison.

XII.

Soient deux espaces A & E.

Soient appelées dans l'espace

ce

La perpendiculaire,

L'oblique,

L'éloignement du perpendi-


que

A.

P.

C.

B.



Et

286 NOUVEAUX ELEMENS

Et soient de même appellées
dans l'espace, E.

La perpendiculaire P.

L'oblique c.

L'éloignement du perpendi-
cule b.

Je dis que.

$P. p. :: C. c. :: B. b.$

Et en voilà la preuve tres-naturelle, dont je ne
croi pas que jamais personne se soit avisé :

Soit P divisée en quelques aliquotes que l'on
voudra, 10. 20. 500. 6000. 10000. &c. Et ces
aliquotes quelconques de P soient appellées x.

Si on tire par tous les points de cette division
quelle qu'elle soit, des paralleles à l'espace A, cet
espace sera divisé en autant de petits espaces paral-
leles qu'x sera dans P. Et ces petits espaces seront
égaux par le 1.^e. Lemme, parce qu'ils auront tous x
pour perpendiculaire.

Et de là il s'ensuit que C sera aussi divisée en ali-
quotes pareilles à celles de P; parce que les portions
de C qui se trouvent entre chacun de ces petits espa-
ces égaux y étant également inclinées par le 9.^e. Lem-
me, y sont égales par le 8.^e

Soient donc les aliquotes de C pareilles à celles
de P appellées y.

Que si de tous les points de division de C on
tire des paralleles à P, (qui seront par consequent
perpendiculaires à l'espace,) elles couperont en-
core B en aliquotes pareilles; parce que chaque y
se trouvant également inclinée en chacun de ces
nouveaux petits espaces, ils seront égaux par le
8.^e Lemme. Et par consequent les portions de B;
qui seront toutes perpendiculaires dans ces espaces
égaux, seront égales. (Et cela mêmes seroit vrai
quand elles n'y seroient pas perpendiculaires, pour-
veu qu'elles y fussent également inclinées. Ce
qu'il faut remarquer pour une autre occa-
sion.)

Cela

Cela étant fait, prenant x pour mesurer p de l'espace E , ou elle s'y trouvera précisément tant de fois, ou tant de fois plus quelque reste, c'est à dire plus une portion moindre qu' x . Et aussi tirant des lignes parallèles à l'espace E par tous les points de la division de p mesurée par x , l'espace E se trouvera divisé en autant de petits espaces égaux entr'eux, & égaux à ceux qui ont eu la même x pour perpendiculaire dans l'espace A , qu' x se sera trouvée dans p , si ce n'est qu'il y en aura un plus petit, si x ne s'y est trouvée que tant de fois plus quelque reste. Car le petit espace où sera compris ce reste sera plus petit que les autres.

Et de là il s'ensuit que e étant aussi inclinée dans E que C dans A , les portions de e comprises dans ces espaces égaux à ceux d' A seront égales aux portions de C , & ainsi se pourront aussi appeler y , & s'il y avoit eu en p un reste moindre qu' x , il y auroit aussi eu en e un reste moindre qu' y .

Donc par la définition des grandeurs proportionnelles, (II. 33.)

$$P.p. :: C.e.$$

puisque x & y , aliquotes quelconques pareilles des deux antecédens P & C , sont également contenues dans les deux conséquens p & e ; si dans l'un sans reste, dans l'autre sans reste, si dans l'un avec reste, dans l'autre avec reste.

On prouvera la même chose de B & de b . Car si e étant mesurée & divisée par y , on tire des parallèles à p (qui seront perpendiculaires à l'espace) par tous les points de la division, b sera divisée en autant de parties que e , & ces parties seront égales aux parties de B , que nous avons nommées z : si ce n'est qu'il y en aura une moindre que z , s'il y a eu un reste dans e moindre qu' y .

Donc les aliquotes pareilles de C & de B seront également contenues dans e & b .

$$\text{Donc } C.e. :: B.b.$$

Donc

Donc $P.p :: C.c :: B.b$. Ce qu'il falloit démontrer


I. THEOREME.

XIII. Si deux lignes inégalement inclinées dans le même espace le sont autant chacune, que chacune de deux autres le sont dans un autre espace, les également inclinées sont en même raison.

Soient les espaces A & E.

Soit C autant inclinée dans l'espace A que c dans l'espace E.

Et D autant inclinée dans l'espace A que d dans l'espace E.



Je dis que $C.c :: D.d$.

Car, par la Proposition précédente, C est à c, comme la perpendiculaire d'A à la perpendiculaire d'E.

Or D est aussi à d, comme ces deux mêmes perpendiculaires.

Donc $C.c :: D.d$. (II. 26.)

On le peut aussi prouver immédiatement & par soy-même sans avoir recours aux perpendiculaires, par la même voye dont on s'est servi dans la Proposition précédente, & que je ne repete point, parce qu'il est très-facile de la trouver.

I. COROLLAIRE.

XIV. Plusieurs lignes étant diversement inclinées dans le même espace parallele, si elles sont toutes coupées par des paralleles à cet espace, elles le sont proportionnellement; c'est à dire que chaque toute est à chacune de ses parties, telle qu'est la première, ou la deuxième, ou la troisième, &c. cōme chaqu'autre toute à la même pt.^e 1.^e 2.^e 3.^e &c.



C'est

DE GEOMETRIE. Liv. X. 289

C'est une suite manifeste du precedent Theoreme, puisque d'une part toutes les toutes sont dans le même espace, qui est l'espace total ; toutes les premieres parties dans le 1.^{er} espace partiel ; les 2.^{es} dans le 2.^e, & ainsi des autres. Et que de l'autre, chaque toute & chacune de ses parties sont également inclinées chacune dans son espace, par le 9.^e Lemme. Donc la 1.^{re} toute est à sa 1.^{re} partie, comme la seconde toute à sa 1.^{re} partie.

II. COROLLAIRE.

Si plusieurs lignes sont menées d'un même point sur une même ligne, elles sont coupées proportionnellement par toutes les lignes paralleles à celle qui les termine.




xv.

C'est la même chose que le precedent Corollaire ; puisque tirant par le point commun à toutes ces lignes une ligne parallele à la ligne qui les termine, elles se trouveront toutes dans le même espace parallele, & par conséquent les paralleles à cet espace les doivent toutes couper proportionnellement.

III. COROLLAIRE.

Si deux lignes comprises dans un même espace parallele se coupent, elles sont coupées proportionnellement ; c'est à dire que les parties de l'une sont proportionnelles aux parties de l'autre : outre que la toute est à la toute, comme chaque partie à la même partie, suivant le même ordre dans lequel ces parties sont proportionnelles.



xvi.

C'est encore la même chose que le 1.^{er} Corollaire ; puisque menant une parallele à l'espace par

N

le

290 NOUVEAUX ELEMENS

le point de la section, ce seront deux lignes dans le même espace total qui sont coupées par une parallèle à cet espace, & qui par conséquent le doivent être proportionnellement.

IV. COROLLAIRE.

- * VII. SI quatre lignes, dont les opposées sont parallèles, se joignent aux extremités, elles font deux espaces parallèles, l'un d'un sens & l'autre de l'autre sens; & la ligne tirée de coin en coin s'appelle *diagonale*.

Que si d'un point quelconque de cette diagonale, on tire deux lignes comprises chacune dans chacun de ces deux espaces, les parties de l'une de ces lignes seront proportionnelles aux parties de l'autre.

Car les deux parties de chacune sont proportionnelles aux deux parties de la diagonale, par le Corollaire précédent; parce que chacune de ces lignes & la diagonale sont comprises dans le même espace parallèle & s'y coupent. Donc les parties de chacune étant en même raison que celles de la diagonale, les parties de l'une doivent aussi être en même raison que les parties de l'autre, puisque deux raisons égales à une 3.^e sont égales entr'elles. (II. 26.)



II. THEOREME.

- xviii. LORSQUE deux angles sont semblables, (c'est à dire selon le sixième Lemme, lorsqu'étant égaux, les angles sur la base de l'un sont égaux aux angles sur la base de l'autre chacun à chacun:) les côtes sont proportionnels aux côtes, & la base à la base, & la hauteur à la hauteur. C'est à dire que les côtes de ces deux angles également inclinés chacun sur sa base, seront en même raison que

que les deux autres côtes & que les deux bases ,
& que les distances de chaque sommet à chaque
base : ce que j'appelle la hauteur de chaque
angle.

Soient les deux angles nommez A & E.

Soit le grand côté d'A nommé C.

Le petit D.

La base B.

La hauteur H.

Et dans l'angle E,

Le grand côté c.

Le petit d.

La base b.

La hauteur h.

Je dis que $C. e. :: D. d. :: B. b. :: H. h.$

On le peut prouver facilement de la même sorte
qu'on a prouvé la Proposition fondamentale ,
c'est pourquoi je ne le repete point.

Mais on le peut encore de cette autre sorte :

1.^o Par le 5.^e Lemme C & D sont censées être
dans le même espace parallele , &
de même c & d.

Et de plus par l'hypothese C & c
sont également inclinées chacune
dans son espace, & de même D & d.

Donc par la Proposition fon-
damentale , & par le 1.^{er} Theo-
rème,

$$C. c. :: H. h.$$

$$D. d. :: H. h.$$

Donc $C. c. :: D. d.$ & *alternando*,

$C. D. :: c. d.$

2.^o Par le 5.^e Lemme C & B sont dans le mê-
me espace parallele , & de même c & b ; & de plus
C & c sont également inclinées chacune dans son
espace , & de même B & b.

Donc par le 1.^{er} Theorème,

$$C. c. :: B. b. \text{ \& alternando, } C. B. :: c. b.$$

N 2

3.^o Par



292 NOUVEAUX ELEMENS

3.^o Par le même 5.^o Lemme D & B sont dans le même espace parallele , & de même d & b .

Et de plus , D & d sont également inclinées chacune dans son espace , & de même B & b .

Donc par le 1.^{er} Theorème ,

$$D.d::B.b.\&alternando, D.B::d.b.$$

Donc $\left. \begin{matrix} C.c. \\ D.d. \end{matrix} \right\} :: B.b.$ Ce qu'il falloit demon-
trer,

I. COROLLAIRE.

XIX. DEUX angles Isoceles étant égaux , ils sont semblables ; & par consequent les côtez sont aux côtez comme la base à la base , & la hauteur à la hauteur. Car deux angles étant Isoceles , ils ne peuvent être égaux que les angles sur la base de l'un ne soient égaux aux angles sur la base de l'autre, VIII. 62,

II. COROLLAIRE.

XX. SI un angle a deux bases paralleles , il s'y trouvera diverses sortes de proportions de grand usage.

Mais pour le mieux faire entendre , il faut considerer que les côtez de cet angle selon la derniere base comprennent les côtez selon la premiere ; & c'est pourquoy nous appellerons les uns *toutes* , & les autres les premieres ou dernieres parties de chacune de ces toutes. Soient donc nommées


Les deux toutes T, & T.

Les deux premieres parties p, & p.

Les deux dernieres q, & q.

La derniere base & la 1.^{re} B. & b.

De plus tirant par le sommet une parallele aux deux bases , ils se trouvera trois espaces paralleles :



Le

DE GEOMETRIE. LIV. X. 293

Le total entre le sommet & B, que j'appelleray

Le premier partial entre le sommet & b, A.

Le second partial entre b & B, E.

Cela étant, par le 9.^e Lemme T est autant inclinée dans ω , que p dans A, & q dans E.

Et de mêmes T autant inclinée dans ω , que p dans A, & q dans E.

Donc, par le 1.^{er} Theorème,

1. T. p. :: T. p. & *alternando*, T. T :: p. p.

2. T. q. :: T. q. T. T :: q. q.

3. p. q. :: p. q. p. p. :: q. q.

4. Par le 2.^e Theorème chaque route & sa première partie sont en même raison que la dernière base & la première.

T. p :: B. b. & *alternando*, T. B. :: p. b.

T. p :: B. b. T. B. :: p. b.

Car cet angle qui a deux bases parallèles doit être considéré comme si c'étoient deux angles égaux, dont l'un eût pour côtes & pour bases T, T, B: & l'autre p, p, b. Et ainsi les deux angles sur la base de l'un étant égaux aux deux angles sur la base de l'autre chacun à chacun, les côtes de l'un sont proportionnels aux côtes de l'autre, & les bases aussi. Et par conséquent T. p. :: T. p. :: B. b.

III. COROLLAIRE.

LORSQUE deux angles ont leur sommet également distant de leur base, & que par conséquent ils peuvent être compris dans le même espace parallèle, (selon le 7.^e Lemme:) si l'on donne à ces deux angles de nouvelles bases parallèles aux anciennes, & dont chacune en soit également distante, ces deux nouvelles bases seront proportionnelles aux deux anciennes.

XXI.

N 3


Sup-

294 NOUVEAUX ELEMENTS.

Supposons que les deux bases de ces deux angles, lesquelles j'appelleray B & B , soient sur la même ligne: la ligne qui joindra les sommets sera parallèle à cette ligne. D'où il s'ensuit,

1°. Que considérant dans chacun de ces angles un seul côté, dont j'appelleray l'un T & l'autre T , ce seront deux lignes dans le même espace parallèles.

2°. Que les deux nouvelles bases, que j'appelleray b & b , étant parallèles aux anciennes, & en devant être chacune également distantes, se trouveront nécessairement dans la même ligne parallèle à l'espace.



Donc, par le 1^{er}. Corollaire du 1^{er}. Theorème, cette ligne parallèle à l'espace coupe proportionnellement T & T ; & ainsi appellant p la première partie de T , & p la première partie de T ,

$$T.p. :: T.p.$$

Or, par le Corollaire précédent, chacun de ces angles ayant deux bases parallèles

$$T.p. :: B.b.$$

$$T.p. :: B.b.$$

Donc les deux raisons de $B:b$. & de $B:b$. sont égales, puisque chacune est égale à chacune des deux raisons $T:p$. & $T:p$. qui sont égales entr'elles. Donc

$$B.b. :: B.b. \text{ Donc } alternando, B.B. :: b.b.$$

IV. COROLLAIRE.

XXII. Si d'un même point on tire plusieurs lignes à la même ligne comprises entre la première & la dernière, & qu'on tire des parallèles à celle-là, qui soient aussi comprises entre la première & la dernière de ces lignes tirées du même



me-

DE GEOMETRIE. LIV. X. 195

me point: toutes ces paralleles seront coupées proportionnellement, c'est à dire que chaque toute & sa premiere partie seront en même raison que chaque autre toute & sa 1.^{re} partie, & ainsi du reste.

Il suffit d'examiner deux de ces paralleles, comme est la dernière, que j'appelleray *T*, & sa premiere partie *p*; & une autre que j'appelleray *T'*, & sa premiere partie *p'*. Et ainsi il faut prouver que

$$T.p. :: T'.p'.$$

Et pour cela il ne faut que considerer, 1.^o. Que ces lignes tirées d'un même point font divers angles; que la premiere & la dernière font l'angle total, qui a toutes les paralleles entieres pour ses diverses bases; que la premiere & la seconde font le premier angle partial, qui a toutes les premieres parties de ces paralleles pour ses diverses bases, & ainsi du reste.

2.^o Que tous ces angles sont dans le même espace parallele, parce qu'on peut tirer une ligne par leur sommet commun qui sera parallele à la dernière base de l'angle total.

Donc *T* étant la dernière base de l'angle total, & *p* la dernière base du 1.^{er} angle partial, laquelle est partie de la ligne *T*; & *T'* étant une autre base de l'angle total, *p'* une autre base du 1.^{er} angle partial: *T* & *p* seront aussi sur une même ligne parallele à l'espace; puisque *p* est partie de *T*.

Donc, par le Corollaire precedent, les deux dernières bases *T* & *p* de ces deux angles seront en même raison que leurs deux autres bases *T'* & *p'*.
Donc

$$T.p. :: T'.p'.$$

Donc par la même raison chaque parallele & sa 1.^{re} partie seront en même raison que chaque autre parallele & sa 1.^{re} partie.

Et on prouvera la même chose avec la même facilité.

296 NOUVEAUX ELEMENS

lité de chacune des autres parties , en comparant
roujours ensemble celles qui sont renfermées entre
les deux mêmes lignes.

V. COROLLAIRE.

XXIII. Si l'une de ces paralleles renfermées entre la 1^{re}. & la dernière de plusieurs lignes tirées du même point est divisée par ces lignes en parties aliquotes , c'est à dire en un certain nombre de parties égales : toutes les autres sont divisées par les mêmes lignes en aliquotes pareilles.

C'est une suite manifeste du precedent Corollaire. Car si chaque partie de l'une de ces paralleles est par exemple la dixième partie , il faut que chaque partie de chaque autre parallele en soit aussi la dixième partie ; puisque chaque parallele & chacune de ses parties , sont en même raison que chaque autre parallele & chacune de ses parties semblables.

VI. COROLLAIRE.

XXIV. Si un angle a plusieurs bases paralleles , toutes les lignes tirées du sommet qui couperont ces bases , les couperont proportionnellement. D'où il s'ensuit qu'en quelques aliquotes que l'une de ces bases paralleles soit divisée , toutes les autres le seront en aliquotes pareilles.


Ce n'est que les precedens Corollaires un peu autrement énoncez.

VII. COROLLAIRE.

XXV. Les deux cordes d'un cercle sont proportionnelles aux deux cordes d'un autre cercle , si les arcs que soutiennent les unes sont proportionnellement égaux aux arcs que soutiennent les autres , chacun à chacun.

Soient considérées les deux cordes d'un cercle
com-

comme jointes & faisant un angle inscrit: telles que sont bc & bd d'une part, & BC & BD de l'autre. (Car si elles ne faisoient pas d'angle inscrit dans chaque cercle, il ne faudroit qu'en prendre d'égaux à celles là qui en fissent, puisque soutenant des arcs égaux dans chaque cercle, par V. 26. ce sera la même chose pour juger de la proportion.) Cela supposé,



L'angle $c b d$ inscrit dans le premier cercle est égal à l'angle $C B D$ inscrit dans le second cercle, par IX. 20.

Et les angles que font les côtes bc & bd sur la base $d c$, sont égaux aux angles que font les côtes BC & BD sur la base $D C$, chacun à chacun, par IX. 20.

Donc par le 2.^d Théorème,

$$bc. BC. :: bd. BD. :: dc. DC.$$

VIII. COROLLAIRE.

SI deux cordes de divers cercles soutiennent des arcs proportionnellement égaux, (c'est à dire d'autant de degrez,) elles sont proportionnelles aux diametres de ces cercles. xxvi.

C'est une suite du precedent. Car les diametres soutiennent des arcs proportionnellement égaux dans chaque cercle, puisqu'ils en soutiennent la demy-circonférence. C'est donc la même preuve & encore plus facile.

IX. COROLLAIRE.

SI deux cordes égales de divers cercles soutiennent chacune autant de degrez, les cercles sont égaux. Car par le precedent Corollaire elles sont en- xxvii.

N 5

même

même raison que les diamètres des cercles. Donc si elles sont égales, les diamètres sont égaux. Donc les cercles sont égaux.

III. THEOREME.

XXVIII. Deux Angles quoy qu'inégaux ont néanmoins leurs côtez proportionnels, lorsque le côté de l'un sur sa base fait un angle égal à celui que fait aussi sur sa base l'un des côtez de l'autre; & que l'autre côté du premier angle faisant sur sa base un angle obtus, & l'autre côté du second angle faisant un angle aigu sur la sienne, l'aigu est le complement de l'obtus, en sorte que tous les deux ensemble valent deux angles droits.


Cette dernière condition se peut encore exprimer en une autre manière: qui est que ces deux côtez, l'un d'un angle & l'autre de l'autre, fassent chacun sur sa base le même angle aigu, mais que l'un le fasse en dehors sur le prolongement de la base, & l'autre en dedans sur la base même.

Cette dernière expression fait entrer plus facilement dans la démonstration de ce Theoreme.

Soient les deux angles, dont l'un ait pour côtez C & D , & pour base B . Et l'autre pour côtez c & d , & pour base b .

Je suppose, 1.^o Que les angles que les côtez C & c font chacun sur leur base sont égaux.

2.^o Que le côté D fait un angle obtus sur la base B , & d un angle aigu sur la base b , mais que cet aigu est égal au complement de cet obtus. D'où il s'ensuit



Que l'angle aigu que D fait sur la base en dehors

en

en la concevant prolongée, est égal à l'angle aigu que d fait sur la sienne en dedans.

Cela étant, je dis que $C. c. :: D. d.$

Car soient faits des deux angles deux espaces parallèles, en prolongeant les bases B & b autant qu'il est nécessaire, & tirant par chacun des sommets des parallèles à ces bases. Et celui de ces espaces dans lequel sont C & D soit appelé A , & l'autre E .

Par l'hypothèse l'angle aigu que fait C dans l'espace A est égal à l'angle aigu que fait c dans l'espace E .

Donc, par le 4.^e Lemme, C & c sont également inclinées chacune dans son espace.

De mêmes, par l'hypothèse, l'angle aigu que fait D dans l'espace A (sur la base B prolongée) est égal à l'angle aigu que fait d dans l'espace E .

Donc, par le 4.^e Lemme, D & d sont également inclinées chacune dans son espace; & il n'importe que D soit autrement tournée au regard de c , car cela ne change en rien l'inclinaison de chacune dans son espace. Donc, par le 1.^{er} Theorème,

$C. c. :: D. d.$ & *alternando*, $C. D. :: c. d.$

AUTRE DEMONSTRATION.

Si on tire du sommet sur la base B prolongée une ligne égale à D ; l'angle aigu que cette ligne, que j'appellerai P , fera sur B prolongée, sera égal au complément de l'obtus que fait D sur B , & par conséquent à l'aigu que fait d sur b .



Donc les deux angles dont l'un a pour ses côtés C & P , & l'autre c & d , sont semblables, par le 6.^e Lemme.

Donc $C. c. :: P. d.$

Or par la construction P est égale à D . Donc

$C. c. :: D. d.$

AVERTISSEMENT.

XXX. Cette dernière démonstration, quoi que moins bonne que la première, a cela d'utile, qu'elle fait voir plus clairement la différence qu'il y a entre ce 3.^e Théorème & le 2.^e; qui est que dans le 2.^e non seulement les côtés d'un Triangle sont proportionnels à ceux de l'autre, mais aussi la base: au lieu que dans celui-ci il n'y a que les côtés de proportionnels; étant bien clair que la base B, sur laquelle est l'angle obtus, doit être plus petite à proportion que la base b.


Car appellant T la base B, prolongée jusques à P, il est clair que l'angle qui a pour côtés C & P, & T pour base, est semblable à l'angle qui a pour côtés c & d, & b pour base.

Donc, par le 2.^e Théorème, $\frac{C.c.}{P.d.} :: T.b.$

Or B n'est que partie de T; donc il n'y a pas la même raison de B à b, que de C à c.

I. COROLLAIRE.

XXXI. UNE ligne, que j'appellerai la coupante, étant inclinée sur une autre, que j'appellerai la coupée, si de l'extrémité, & d'un autre point de cette coupante on tire deux lignes de part & d'autre qui fassent des angles égaux sur la coupée: la coupante entière sera à sa partie vers la coupée, comme la ligne tirée de son extrémité à l'autre ligne tirée de son autre point.




J'en laisse à trouver la démonstration, qui n'est qu'une application du précédent Théorème.

II. Co-

II. COROLLAIRE.

Si un angle a diverses bases diversement inclinées sur ses côtez : la ligne qui divisera cet angle par la moitié fera que les deux parties de chaque base seront proportionnelles aux deux côtez de cet angle selon cette base. Il suffira de le démontrer en une seule base.

Soit un angle divisé par la moitié par la ligne p . Soit l'un de ses côtez appelé C & l'autre c ; la partie de la base qui joint C appelée D , & l'autre d .



Si on tire par les extrémités de la base des parallèles à p , il y aura deux espaces parallèles.

Celui dans lequel sont C & D soit appelé A , & l'autre E . Par le 9.^e Lemme D & d sont également inclinées chacune dans son espace.

Et par l'hypothèse C & c sont aussi également inclinées chacune dans le sien, puisque les angles aigus que chacune fait sur p sont égaux.

Dont, par le 1.^{er} Theorème,

$C. c. :: D. d.$ & *alternando*, $C. D. :: c. d.$

III. COROLLAIRE.

Si la ligne qui divise un angle en divise aussi la base proportionnellement aux côtez, c'est à dire en sorte que les deux côtez de l'angle soient en même raison que les deux parties de la base, l'angle est divisé par la moitié.

C'est la Converse du précédent Corollaire, qui se prouve en cette manière :

N. 7

Soit

302. NOUVEAUX ELEMENS.

Soit l'angle $b k d$ divisé par $k e$, en sorte que

$$b e . e d . :: k b . k d .$$

Si nous supposons que ce même angle est divisé par la moitié par $k x$, il s'ensuit par le precedent Corollaire que

$$b x . x d . :: k b . k d .$$

$$\text{Donc } b x . x d . :: b e . e d .$$

$$\text{Donc componendo, } b d . x d . :: b d . e d . \quad (II.)$$

47.)

Donc les point x & e ne sçauroient être que le même point, & $k x$ & $k e$ la même ligne. Donc $k e$ divise l'angle par la moitié. Ce qu'il falloit demontrer.



I. PROBLEME.

xxxiv. Trouver une 4.^e proportionnelle. C'est à dire ayant la 1.^{re} la 2.^e & la 3.^e de 4 lignes proportionnelles, trouver la 4.^e

Ou ayant les deux premiers termes d'une raison, & l'antecedent de la 2.^e en trouver le consequent.

Le moyen le plus facile est de se servir pour cela du 2.^e Corollaire du second Theorème. (20. sup.) Et ainsi donnant les mêmes noms aux trois données & à la 4.^e qui est à trouver, j'appellerai

La 1.^{re}.

p .

La 2.^e.

q .

La 3.^e.

p .

Et la 4.^e à trouver,

q .

Cela étant, il faut

1.^o. Mettre p & q sur une même ligne.

2.^o. Faire un angle de p la 3.^e avec p la 1.^{re}

3.^o. Joindre par b les extremités de la 1.^{re} & de la 3.^e

4.^o Pro-



DE GEOMETRIE. LIV. X. 303.

4°. Prolonger indefiniment p la 3.°


5°. De l'extremité de q la 2.° tirer B parallele à b , jusqu'à la rencontre de p prolongée.

Le prolongement de p jusqu'à la rencontre de B sera la 4.° que l'on cherche. Car il est clair par le Corollaire sus-dit (20. sup.) que

$$p. q. :: p. q.$$

ON peut encore faire la même chose d'une autre maniere, qui est de renfermer la plus petite des deux premieres données dans la plus grande : & alors la plus grande s'appellera T , & la plus petite, qui en est partie, p . xxxv.

Mais il faut prendre garde si la premiere des données est la plus petite ou la plus grande. Car si c'est la plus grande, il faudra commencer par T , & la 3.° sera aussi T . Et alors pour trouver p , qui sera la 4.° que l'on cherche: après avoir joint par B les extremités de T & de p , b parallele à B étant tirée de l'extremité de p sur T donnera p . Car il est encor clair par le même Corollaire que



$$T. p. :: T. p.$$

Que si la 1.° des deux données est la plus petite, la 3.° sera p , & la 4.° à trouver sera T . De sorte qu'après avoir joint par b les extremités de p & p , il faudra prolonger p ; & tirant de l'extremité de T sur le prolongement de p , B parallele à b , on aura T pour la 4.° à trouver. Car par le même Corollaire (20. sup.) *permutando*,

$$p. T. :: p. T.$$

COROLLAIRE.

TROUVER une 3.° proportionnelle; c'est à dire xxxvi.
faire que l'une des deux données soit moyenne proportionnelle entre l'autre donnée & la trouvée.
C'est

304 NOUVEAUX ELEMENS.

C'est la même chose que le précédent, excepté qu'une seule des deux données tient lieu de la 2.^e & de la 3.^e

II. PROBLEME.

XXXVII. TROUVER la ligne qui soit à une ligne donnée en raison donnée.

Soit la ligne donnée p ; la raison donnée $m. n$; la ligne que l'on cherche x . Ainsi il faut trouver
 $x.p. :: m.n.$

Or pour cela il ne faut que transposer les termes en commençant par n , & les mettant ainsi :

$$n.m. :: p.x.$$

& puis trouver x par le Probleme précédent. Ce qu'étant fait, on aura ce que l'on cherche ; parce que si

$$n.m. :: p.x.$$

permutando


$$x.p. :: m.n.$$

Ce qu'il falloit démontrer.

III. PROBLEME.

XXXVIII. DIVISER une ligne donnée en quelques aliquotes que l'on voudra.

Soit D la ligne à diviser. Tirer au dessous ou au dessus une parallèle indéfinie que j'appellerai P. Prendre dans P autant de parties égales qu'on veut en avoir en la division de D, & prendre garde qu'elles soient notablement plus grandes ou plus petites que ne peuvent être celles de D. Puis des deux points entre lesquels sont comprises toutes les parties égales qu'on a prises dans P, tirer deux lignes par les extrémités de D, jusques à ce qu'elles se joignent en un point.



DE GEOMETRIE. Liv. X. 305

point. Toutes les lignes tirées de ce point là à tous les points de la division de P qui couperont D , la diviseront en autant de parties égales qu'on en aura pris dans P.

La preuve en est cy-dessus dans le 3.^e Corollaire du 2.^e Theorème. (23. sup.)



NOU-



NOUVEAUX ELEMENS
DE
GEOMETRIE.
LIVRE ONZIE'ME.

DES LIGNES RECIPRO-
QUES.

Cet Livre cy sera encore de la proportion des Lignes, & contiendra plusieurs choses nouvelles que l'on jugera peut être plus belles & plus generales que tout ce qu'on a trouvé jusques icy sur cette matiere des Proportions, en ne se servant que des lignes droites & des Cercles.

Pour les mieux faire entendre nous proposerons quelques Lemmes, qui seront voir aussi en quoi est different ce que l'on traite dans ce Livre de ce qui vient d'être traité dans le Livre precedent, & nous le diviserons en 7 Sections.

SECTION

SECTION I.

Lemmes , & de ce qu'on entend par les Antiparalleles : avec le plan des principales choses qu'on doit traiter dans ce Livre.

I. LEMME.

QUAND il y a proportion entre 4 lignes , on y doit remarquer en les comparant deux à deux , deux rapports fort differens.

L'un est celui qui fait dire que les unes sont proportionnelles aux autres.

Et l'autre , que les unes sont reciproques aux autres.

Car si on compare ou la 1.^{re} & la 3.^e avec la 2.^e & la 4.^e , c'est à dire les deux antecedens avec les deux consequens ;

Ou les deux premieres avec les deux dernieres , c'est à dire le 1.^{er} antecedent & son consequent avec le 2.^e antecedent & son consequent : on dit alors que les unes sont *proportionnelles* aux autres.

Mais si on compare la 1.^{re} & la 4.^e avec la 2.^e & la 3.^e c'est-à-dire les extremes avec les moyens : on dit alors que les unes sont *reciproques* aux autres.

Tout ce que nous avons dit dans le Livre precedent ne regarde que le premier rapport.

Et tout ce que nous dirons dans celui-cy ne regarde presque que le second , & c'est pourquoy nous l'avons intitulé *Des Lignes Reciproques*.

II. LEMME.

II. LEMME.

- II. UNE seule ligne peut être dite reciproque à deux lignes, & deux lignes être reciproques à une seule. Mais c'est lors seulement que cette ligne que l'on compare seule avec deux autres est moyenne proportionnelle entre ces deux autres. Car alors elle en vaut deux, parce qu'elle fait deux termes de la Proportion; le premier & le dernier, quand on commence par elle: comme si je dis, une ligne de 6 pieds est à une de 4, comme une de 9 à une de 6; ou le 2.^e & le 3.^e quand on la met au milieu: comme si je dis, 4. 6. :: 6. 9. Et il faut remarquer que quoique cette dernière disposition soit la plus ordinaire, il y a néanmoins des rencontres où il est utile de se servir de la première, comme on pourra voir à la fin de ce Livre.

III. LEMME.

- III. LORSQU'un Angle a deux bases, & que les deux angles sur une base sont égaux aux deux angles sur l'autre base chacun à chacun, cela peut arriver en deux manieres.

La première est quand l'angle que l'une des bases fait sur un côté est égal à l'angle que l'autre base fait sur le même côté. (J'appelle le même côté la même ligne droite tirée du sommet, quoique considérée selon les diverses bases elle tienne lieu de deux côtes.)

Or il est visible que cela ne peut être que quand les bases de cet angle sont paralleles, comme l'on a vu X. 20.

La seconde maniere est quand l'angle qu'une base fait sur un côté est égal à l'angle que l'autre base fait sur l'autre côté. Et alors on peut appeller ces bases *antiparalleles*, pour marquer leur effet opposé à celui

celui des bases paralleles. Ce sont ces sortes de bases qui font presque toutes les preuves dans tout ce Livre.

IV. LEMME.

LES bases paralleles d'un même angle ne peuvent être disposées que d'une seule maniere, qui est d'être toutes séparées l'une de l'autre. Car c'est le propre des paralleles de ne se pouvoir jamais joindre. Mais les antiparalleles peuvent être disposées en trois manieres differentes.

IV.

PREMIERE DISPOSITION DES ANTIPARALLELES.

LA premiere ressemble à celle des paralleles, les deux antiparalleles étant aussi toutes séparées, & alors il est visible que les côtez de cet angle selon la derniere base que nous appellerons *B*, comprennent les côtez de ce même angle selon la premiere base que nous appellerons *b*: & ainsi de ces lignes ou côtez les uns sont *toutes*, & les autres leurs premieres parties, c'est à dire leur partie la plus proche du sommet, (& remarquez que dans tout ce Livre ce sera toujours celle-là que nous entendrons par le nom de *partie*, ou de 1.^{re} *partie*.)



C'est pourquoy nous appellerons toujours, comme dans le Livre precedent, les deux toutes *T. T.*

& leurs parties

p. p.

de sorte que *p* de caractère Romain sera toujours la partie de *T* du même caractère Romain: Et *p* de caractère Italique sera toujours la partie de *T* de caractère Italique.

Or afin que les bases *B* & *b* soient antiparalleles, il est clair qu'il faut

Que

310 NOUVEAUX ELEMENS

Que l'angle que T premiere toute fait sur B , soit égal à l'angle que p partie de la seconde toute fait sur b . Et que l'angle que T seconde toute fait sur B , soit égal à l'angle que p partie de la premiere toute fait sur b .

SECONDE DISPOSITION DES ANTI-PARALLELES.

VI. LA seconde est quand elles se croisent. Et alors ce ne sont pas les deux toutes qui sont les côtes au regard d'une base, & les deux parties qui le sont au regard de l'autre, comme dans la premiere disposition.

Mais les côtes au regard de chaque base sont une toute & la partie de l'autre toute. Et ainsi pour distinguer les deux bases, nous appellerons B celle qui se trouve terminée par l'extrémité de T , & l'autre b .



Or afin que les bases soient antiparalleles dans cette disposition, il est clair qu'il faut que les angles que les deux toutes font, l'une sur B & l'autre sur b , soient égaux; & que ceux que les deux parties font, l'une sur B & l'autre sur b , soient égaux aussi.

TROISIÈME DISPOSITION DES ANTIPARALLELES.

VII. LA troisième est quand les deux bases se joignent en un même point de l'un des côtes. Et alors comme ce côté n'est point partagé, & que seul il tient lieu d'une toute & de sa partie, nous l'appellerons M ; appellaut à l'ordinaire la dernie-



re

re base B, la premiere b , le côté partagé T, & sa partie p.

Or afin que les bases B & b soient antiparalleles, il faut que l'angle que T fait sur B soit égal à l'angle que M fait sur b ; & que l'angle que M fait sur B, (qui comprend celui qu'elle fait sur b ,) soit égal à l'angle que p fait sur b .

V. LEMME.

LORSQUE deux lignes se coupant font 4 angles VIII. qui sont deux à deux opposez au sommet, & par consequent égaux: on peut donner des bases à deux de ces angles opposez au sommet, qui soient telles que ces angles soient semblables; c'est à dire, que les deux angles sur la base de l'un soient égaux aux deux angles sur la base de l'autre chacun à chacun. Mais cela peut arriver en deux manieres; que pour mieux faire entendre, p & q de caractère Romain marqueront les deux parties d'une même ligne, & p & q de caractère Italique les deux parties de l'autre ligne. Et de plus, comme chaque angle doit avoir pour ses côtez la partie d'une ligne & la partie d'une autre ligne: p & p seront les côtez d'un angle, & q & q les côtez de l'autre.

Soit enfin appelée B la base de l'angle qui a p & p pour ses côtez; & b , celle de l'angle qui a q & q pour ses côtez. Cela étant, voici les deux manieres dont ces angles opposez au sommet peuvent être semblables:

La 1.^{re} est quand ce sont les angles alternes qui sont égaux sur les deux bases. C'est à dire quand ce sont les deux parties d'une même ligne, comme p & q, qui font des angles égaux p sur B, & q sur b , & ainsi des deux autres; & alors il est clair que ces deux bases doivent être parallèles.



I X.

La 2.^e est quand ce sont les angles de proche en proche qui sont égaux sur les deux bases; de sorte que ce sont p & q , parties l'une d'une ligne & l'autre de l'autre, qui sont les angles égaux p sur B , & q sur b ; & p & q qui sont aussi les angles égaux p sur B , & q sur b .



Ce sont encore ces bases que nous appellerons *antiparalleles*, pour marquer leur effet contraire à celui des paralleles.

VI. LEMME.

X.

COMME lorsqu'un angle a deux bases paralleles, on peut & on doit considerer les côtes selon une base dans un espace parallele, & ses autres côtes selon l'autre base dans un autre espace parallele: il en est de même quand les bases sont antiparalleles; avec cette difference,

Que quand les bases sont paralleles, une seule ligne tirée par le sommet fait trois espaces paralleles: le 1.^{er} compris entre le sommet & la dernière base; le 2.^e entre le sommet & la 1.^{re} base; le 3.^e entre les deux bases.

Mais quand elles sont antiparalleles, ce 3.^e espace ne peut pas être parallele. Et pour les deux autres, on ne les peut concevoir qu'en s'imaginant deux lignes différentes tirées par le sommet, l'une parallele à B , & l'autre parallele à b . Car B & b n'étant pas paralleles entr'elles; il est visible qu'une seule ligne ne peut pas être parallele à l'une & à l'autre; mais il suffit de s'imaginer ces lignes tirées par le sommet, sans qu'il soit nécessaire de les décrire.

Et ainsi nous devons toujours nous imaginer dans ces angles qui ont deux bases antiparalleles deux espaces paralleles. L'un que j'appelleray A ,
com.

compris entre le sommet & B. Et l'autre que j'appelleray E, compris entre le sommet & b.

Et de plus il faut remarquer,

Que dans la 1.^{re} disposition des bases antiparalleles les deux routes T & T sont dans l'espace A, & les deux parties p & p dans l'espace E.

Que dans la seconde, qui est quand les bases se croisent, T & p sont dans l'espace A; & T & p dans l'espace E.

Que dans la troisième, qui est quand elles se joignent en un seul point d'un côté, M se trouve dans l'un & l'autre espace. Car l'espace A comprend T & M; & l'espace E comprend M & p.



XI.



XII.



XIII.

VII. LEMME.

IL en est de même quand les angles opposés au sommet ont leurs bases antiparalleles. XIV.

Car il se faut imaginer deux lignes tirées par le sommet commun, dont l'une soit parallèle à B & l'autre à b; & ainsi l'on aura deux espaces parallèles, l'un compris entre le sommet & B, (dans lequel sont p & p,) que nous appellerons A. Et l'autre compris entre ce même sommet & b, (dans lequel sont q & q,) que nous appellerons E. (9. sup.)


VIII. LEMME.

TOUT ce qu'on aura à prouver dans ce Livre le fera par le premier Théorème du Livre précédent, XV.

314 NOUVEAUX ELEMENS

dent, que je repeteray encore ici, afin qu'on l'ait plus présent dans l'Esprit.

Si deux lignes (comme C & D) sont dans un même espace parallele, comme est l'espace A:



Et que deux autres lignes comme (c & d) soient dans un autre espace parallele, comme est l'espace E:



Si C & c sont également inclinées, C dans A, & c dans E; & que D & d soient aussi également inclinées D dans A & d dans E: les deux également inclinées entr'elles sont proportionnelles aux deux qui le sont aussi entr'elles.

C. c. :: D. d. & *alternando*, C. D. :: c. d.

IX. LEMME.

XVI. POUR ne se point brouiller en disposant les termes, il est bon de s'astreindre à donner toujours pour premier & deuxième termes de la Proportion les également inclinées dans les deux differens espaces paralleles, & de même au regard du troisième & du quatrième. Et pour premier & troisième termes, celles qui sont dans le même espace parallele. Et de même au regard du deuxième & du quatrième. Sauf à les disposer apres autrement, *Alternando*.

I. PROPOSITION FONDAMENTALE

DES RECIPROQUES.

XVII. LORSQU'UN même angle à deux bases antiparalleles, une toute & sa partie sont reciproques à l'autre toute & à sa partie. C'est à dire que


T. p. :: T. p. ou T. T. :: p. p.

PRE-

PREMIERE PREUVE
DANS LA PREMIERE
DISPOSITION DES ANTI-
PARALLELES.

DANS cette disposition les deux toutes T & T' XVIII, sont dans l'espace A, & les deux parties p & p' sont dans l'espace E. (par 11. S.)

Or (par 5. *sup.*) T & p sont également inclinées, T dans A, & p dans E. De même aussi T' & p' sont également inclinées, T' dans A, & p' dans E.



Donc (par 15. *sup.*) $T.p. :: T'.p.$

Or T & la partie p sont les extremes de la Proportion, dont T' & la partie p' sont les moyens.

Donc une route & la partie sont reciproques à l'autre route & à la partie.

SECONDE PREUVE
DANS LA SECONDE
DISPOSITION DES ANTI-
PARALLELES.

DANS cette 2.^e disposition T & p (partie de l'autre route) sont dans l'espace A; & T' & p' dans l'espace E. (par 12. *sup.*)

Or (par 6. *sup.*) T & T' sont également inclinées, T dans A, & T' dans E. Et de même p & p' également inclinées, p dans A & p' dans E.



Donc (par 15. *sup.*) $T.T. :: p.p.$

O 2

Je

Je reserve la 3.^e disposition pour un Corollaire à part.

COROLLAIRE.

xx. QUAND un angle a deux bases antiparalleles dans la 3.^e disposition, qui est quand elles se joignent en un seul point d'un côté : ce côté est moyen proportionel entre l'autre côté entier & la partie; c'est à dire que

$$T. M. :: M. p.$$

Car (par 13. *sup.*) dans cette disposition M est dans l'un & l'autre espace; parce que T & M sont dans l'espace A, & M & p dans l'espace E.

Or (par 7. *sup.*) T & M sont également inclinées, T dans l'espace A, & M dans l'espace E.

Et M & p sont également inclinées, M dans l'espace A, & p dans l'espace E.

Donc (par 15. *sup.*) $T. M. :: M. p.$



II. PROPOSITION FONDAMENTALE

DES RECIPROQUES.

xxi. QUAND deux lignes se coupant font deux angles opposez au sommet qui ont des bases antiparalleles, les parties de l'une de ces lignes qui se coupent en ce sommet sont reciproques aux parties de l'autre. (*Voyez la figure du N. 9.*)

Car (par 14. *sup.*) p & p sont dans l'espace A, & q & q sont dans l'espace E.

Or (par 9. *sup.*) p & q sont également inclinées, p dans A, & q dans E.

Et p & q également inclinées, p dans A & q dans E.

Donc

Donc (par 15. *sup.*)

$p.q. :: p.q.$

Or p & q sont les parties de la même ligne : & p & q sont les parties de l'autre ligne.

Donc les parties d'une ligne sont reciproques aux parties de l'autre.

COROLLAIRE.

Si une de ces lignes qui en se coupant font des angles opposez au sommet, qui ont des bases antiparalleles, est divisée par la moitié : une seule de ces moitez est moyenne proportionnelle entre les parties de l'autre ligne. XXII.

Cela est clair, puisque c'est la même chose de donner pour les moyens de cette Proportion les deux moitez de la même ligne, ou une seule moitié prise deux fois.

PLAN GENERAL DE CE QUE L'ON PRETEND MONTRER DANS LA SUI- TE DE CE LIVRE.

Nous avons déjà dit que les extremes d'une Proportion comparez aux moyens s'appellent reciproques : & qu'ainsi il y en a dans toute Proportion. XXIII.

Mais ce que l'on pretend principalement faire dans ce Livre, est de montrer comment deux lignes droites qui se rapportent à une même, (ou parce qu'elles en sont les deux parties, ou parce que l'une est la toute, & l'autre une partie de cette toute,) sont reciproques à deux autres lignes, qui se rapportent de la même sorte à une même ligne, ou quelquefois même à une seule qui étant repetée deux fois sera on les deux extremes ou les deux moyens de la Proportion.

Il faut pour cela que les deux lignes à chacune desquelles deux se rapportent, & que par cette raison on peut appeller les principales, ayent un point commun; ce qui peut être en deux manieres: Ou parce qu'elles se croisent & se coupent effectivement en un point, & y font des angles opposez au sommet; & alors ce point s'appellera pour cette raison point de section: (Voyez la fig. du N. 9. sup.) Ou parce qu'elles se terminent à un même point & y font un angle seulement sans passer plus outre; & alors ce point commun s'appellera terminant. (Voyez les trois dernieres figures. Sup.)

Quand le point commun est de section, chaque ligne étant coupée en deux, ce sont les deux parties d'une même ligne qui doivent être reciproques aux deux parties de l'autre. Et alors ce point commun aux deux principales l'est aussi aux 4 lignes: quoy que ce ne soit qu'au regard des principales qu'il soit point de section: car les parties ne s'y coupent pas, mais y aboutissent.

Mais quand le point est terminant au regard des principales: parce que cela seul ne donneroit que deux lignes, & qu'il en faut 4, ou au moins 3, il est necessaire que ces lignes principales qui sont terminées par ce point commun, soient encore toutes deux coupées en quelque autre endroit, (ou au moins l'une,) afin que cela puisse faire 4 lignes, ou au moins 3. Et alors ce sont les deux toutes, & la la partie de chacune vers le point commun, qui font les 4 lignes: & il faut que ce soit chaque toute & sa partie vers le point commun qui soient reciproques à l'autre toute & à sa premiere partie.

Quand le point est de section, les deux principales se coupant font 4 angles dans ce point de section; mais il suffit d'en considerer deux opposez au sommet. Et il faut alors que ces deux Angles qui sont égaux ayent leurs bases antiparalleles, selon ce qui vient d'être dit N. 9.

Mais

DE GEOMETRIE. LIV. XI. 319

Mais quand le point est terminant, c'est le même angle qui doit avoir deux bases antiparalleles, & l'une des trois manieres qu'on a été représentées S. 18. 19. 20.

Il n'est donc question que de chercher les voyes generales pour trouver ces bases antiparalleles.

Or voici ce qui m'est venu en pensée sur cela :

J'ai reconnu qu'il n'y a point de voye generale pour couper tous d'un coup les côtez d'un angle, ou les côtez de deux angles opposez au sommet, par des bases antiparalleles, qu'en y employant la circonference d'un Cercle; c'est pourquoi on ne peut trouver sans cela la moyenne proportionelle entre deux lignes données.

J'ai inferé de là qu'il falloit que le point commun dont nous venons de parler, soit qu'il soit de section, ou terminant, ait rapport à la circonference d'un Cercle. C'est à dire qu'il faut qu'il soit

- On { 1. Dans le Cercle.
2. Hors le Cercle.
3. Dans la circonference du Cercle.

Quand le point commun est au dedans du Cercle, c'est toujours un point de section, & ce sont deux angles opposez au sommet qui ont leurs bases antiparalleles. (Voyez la fig. du N. 27. ci apres.) Car il faut que les 4 lignes dont deux sont reciproques aux deux autres, soient les deux parties de chacune des principales qui se coupent en un point quelconque au dedans du Cercle, & qui se terminent de part & d'autre à 4 points differens de la circonference.

Quand le point commun est hors le Cercle, c'est toujours un point terminant. (Voyez les fig. des N. 31, 32, & 33. ci apres.) Car ce sont deux toures qui partant de ce point qui est hors le Cercle coupent chacune la circonference du Cercle en un point de sa convexité, & se terminent à un autre point

point de sa concavité ; & alors ce sont chaque toute & sa partie hors le Cercle qui sont reciproques à l'autre toute & à sa partie qui est aussi hors le Cercle. Mais il peut arriver que l'une de ces lignes ne faisant que toucher le Cercle sans passer plus outre , le point auquel elle aboutira tenant lieu de convexité & de concavité , elle sera toute seule reciproque à l'autre toute & à sa partie , c'est à dire qu'elle sera moyenne proportionnelle entre cette toute & sa partie.

Mais quand le point commun est dans la circonférence même du Cercle , on a besoin , pour avoir des reciproques , d'une ligne droite indefinie , outre la circulaire , qui coupe perpendiculairement celle qui peut être menée indefiniment du point commun en passant par le centre. Et alors cette ligne indefinie ou coupe le Cercle , (comme dans les fig. des N. 40, 41, 42, 43, & 44. ci apres ,) ou le touche , (comme dans les fig. des N. 46, & 47. ci apres ,) on est au dessous , ou est au dessus. J'appelle au dessous , celle qui est telle , que le Cercle est entre cette ligne & le point commun , (comme dans la fig. du N. 48 , ci apres ;) j'appelle au dessus , celle qui est à l'opposée , (comme dans la fig. du N. 49. ci apres.)

Dans les trois premiers cas , le point commun est toujours un point terminant , & chacune des deux lignes qui en partent , ou coupe le Cercle & est terminée par l'indefinie , (comme dans les fig. des N. 41, 46 & 48 ; ci apres ;) ou coupe l'indefinie & est terminée par le Cercle , (comme dans la fig. du N. 40. ci apres ;) ou l'une coupe le Cercle & est terminée par l'indefinie , & l'autre coupe l'indefinie & est terminée par le Cercle , (comme dans la fig. du N. 42, ci apres.) Et alors chaque toute & sa partie sont reciproques à l'autre toute & à sa partie. Mais il y en peut avoir une qui se terminera à un point commun à la circonférence & à l'indefinie , (comme

(comme dans les fig. des N. 43 & 44, ci apres;) & alors elle sera moyenne proportionnelle entre l'autre toute & sa partie.

Mais dans le 4.^e cas, c'est à dire quand l'indéfinie est au dessus du point commun, (Voyez la fig. du N. 49, ci apres :) ce point commun ne peut être qu'un point de section. Car toutes les fois que des lignes se couperont dans ce point & se termineront d'une part à la circonference, & de l'autre à l'indéfinie, les parties de l'une sont reciproques à celles de l'autre.

Il faut relire tout le Livre IX. Car c'est sur ce qui y est dit que sont fondées les demonstrations de celui-ci.

DEUX AVIS DE LOGIQUE.

I.

Quand on a à prouver qu'un angle ayant deux bases, les angles sur une sont égaux aux angles sur l'autre chacun à chacun, on est assuré que cela est, quand on a prouvé que l'un des angles sur une base est égal à l'un des angles sur l'autre, parce qu'il s'ensuit de là nécessairement que l'autre est égal aussi à l'autre. XXIV.

Cette preuve est convainquante, & on s'en doit passer quand on ne peut mieux. Mais il faut avouer qu'elle n'est pas si bonne & ne fait pas si bien entrer dans la nature des choses, que celle qui montre positivement que l'un & l'autre angle d'une base est égal à l'un & l'autre angle de l'autre. Et c'est pourquoi je ne me contenteray point de la première sorte de preuve, & je me serviray toujours de cette dernière.

XXV. Quand on a à prouver de plusieurs binaires de lignes, qu'ils sont reciproques les uns aux autres, on en est assuré quand on peut montrer qu'ils sont tous reciproques à un même binaire, ou qu'ils ont tous la même moyenne proportionnelle.

Mais quoique cela soit convainquant, l'Esprit ne reçoit pas la même clarté & ne demeure pas si satisfait, que si on montrait immédiatement de chaque binaire qu'il est reciproque à chaque autre.

Et ainsi, quoi qu'il me fût facile d'employer la première voye, je me suis résolu de n'employer que cette dernière, comme plus parfaite & plus lumineuse, pour parler ainsi; & peut être qu'on trouvera que ces deux exemples sont remarquables, pour faire voir la différence qu'il y a entre convaincre l'Esprit en le mettant hors d'état de pouvoir douter qu'une chose soit: & le satisfaire pleinement en lui donnant toute la clarté qu'il peut raisonnablement désirer.

Reprenons maintenant la division proposée; qui est que le point commun aux lignes reciproques par la section du Cercle, est nécessairement

1. Ou dans le Cercle.
2. Ou hors le Cercle.
3. Ou dans la circonférence du Cercle.

SECTION II.

Première voye generale pour trouver des Reciproques, quand le point commun est au dedans du Cercle.

CETTE voye est pour trouver que les parties d'une ligne sont reciproques aux parties d'une autre ligne, ou à une ligne quand elle est moyenne proportionnelle. Et ainsi elle est toute appuyée sur la 2.^e Proposition fondamentale & son Corollaire (21. & 22. *sup.*) qui est des angles opposez au sommet qui ont leurs bases antiparalleles. xxvii

I. THEOREME.

Si deux cordes se coupent dans le Cercle, les parties de l'une sont reciproques aux parties de l'autre. xxviii

Soient Les cordes cf & dg qui se coupent en k . Soient tirées les bases à deux angles opposez cg , df . Je dis qu'elles sont antiparalleles.



Car (par IX. 20.) les angles vers g & vers f sont égaux, parce qu'ils sont appuyez sur le même arc cd . Et par la même raison les angles vers c & vers d sont égaux aussi, étant appuyez sur le même arc gf .

Donc les bases cg & df sont antiparalleles. (9. *sup.*)

Donc par la 2.^e Proposition fondamentale (21. *sup.*)

$$kf. kg :: kd. ke$$

$$p. q :: p. q$$

O 6

II. THEOREME

II. THEOREME,

COROLLAIRE DU PREMIER.

XXVIII. Si une des lignes est coupée par la moitié, une de ces moitez est moyenne proportionnelle entre les deux parties de l'autre.

C'est le Corollaire même de la 2.^e Proposition fondamentale.

COROLLAIRE.

XXIX. Si d'un point quelconque d'un diametre on élève une perpendiculaire jusques à la circonference, cette perpendiculaire sera moyenne proportionnelle entre les deux parties du diametre.

Car il est clair que cette perpendiculaire est la moitié de la corde qui couperoit le diametre perpendiculairement par ce point. Donc, par le Theorème precedent, elle doit être moyenne proportionnelle entre les parties du diametre.

SECTION III.


Seconde voie generale pour trouver des Reciproques, quand le point commun est hors le Cercle.

XXX. QUAND le point commun est hors le Cercle, les côtez de l'angle qui a ce point pour sommet peuvent être coupez chacun deux fois par la circonference du Cercle; une fois par la convexité en entrant dans le Cercle, & une fois par la concavité, où on les suppose terminés; si ce n'est que que le point de l'attouchement tenant lieu tout seul de la convexité & de la concavité, un des côtez peut n'être terminé qu'à ce point. Et alors il sera tangente du Cercle,

ele, & les deux bases antiparalleles n'auront que trois points differens. C'est ce qu'on verra dans les deux Theorèmes suivans.

III. THEOREME.

LORSQUE d'un point hors le Cercle on tire des **xxxix.** lignes qui coupent le Cercle en sa convexité, & sont terminées en sa concavité : chaque toute & sa partie hors le Cercle, sont reciproques à chaque autre toute & à sa partie hors le Cercle.



Soient tirées kf , qui coupe la circonference en c ; & kg qui la coupe en d . Je dis que les bases fg & cd sont antiparalleles.

Car (par IX. 15.) l'angle kcd a pour mesure la moitié des deux arcs cd , & cf . Or la moitié de ces deux arcs cd & cf est aussi la mesure de l'angle kfg . (par IX. 17.) Donc les angles kcd & kfg sont égaux.

On prouvera de la même sorte l'égalité des angles kdc & kfg .

Donc les bases fg & cd sont antiparalleles. (3. sup.).

Donc $kf \cdot kd :: kg \cdot kc$.

T. p. :: T. p.

On peut aussi prouver ce Theorème en croisant les **xxxix.** bases, en montrant que les bases fd & gc sont antiparalleles.

Car les angles vers f & vers g sont égaux, étant appuyez sur le même arc cd .

Et pour les angles kcg & kdf , ils sont égaux; parce que si on les examine, on trou-



re la moitié des trois arcs fc , cd , dg . (IX. 15.)

Donc les bases fd & gc sont antiparalleles.

Donc $kf.kg :: kd.kc$.

T.T. :: p.p.

IV. THEOREME,

COROLLAIRE DU TROISIEME.

XXXIII. Si l'une de ces lignes tirées d'un point hors le Cercle est une tangente, cette tangente est moyenne proportionnelle entre chaque toute & sa partie hors le Cercle.

Soit tirée kf qui coupe le Cercle en c , & la tangente ke ; je dis que les bases fe & ce sont antiparalleles. Car (par IX. 17.) l'angle kfe , a pour mesure la moitié de l'arc ce , qui est aussi la mesure de l'angle kce (par IX. 12.)

Et l'angle kef , (par IX. 12.) a pour mesure la moitié des deux arcs ec & cf , qui est aussi la mesure de l'angle kce , par IX. 15.

Donc les bases fe & ce sont antiparalleles.

Donc, par 10. *sup.*

$kf.ke :: ke.kc$.

T.M. :: M.p.



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT.

Il n'y a rien jusqu'ici qui ne soit dans toutes les Geometries : si ce n'est qu'il est prouvé d'une maniere nouvelle. XXXIV.

Mais on le pourroit encore faire comprendre d'une maniere plus naturelle & plus simple sans considerer aucuns angles, faisant seulement attention à la nature du Cercle : ce qui fera voir aussi pourquoi on a besoin d'un Cercle pour couper des lignes Reciproquement.

Soit que le point commun soit au dedans du Cercle, ou au dehors, on peut considerer entre toutes les lignes qui se coupent dans ce point ou qui partent de ce point, celle qui passe par le centre que nous appellerons la centrique, & les autres excentriques.

Quand le point est au dedans du Cercle, la centrique est un diametre, & par consequent la plus grande ligne qui puisse passer par le point commun que nous supposons n'être pas le centre, mais c'est aussi la plus inégalement partagée. Car comme il paroît par VII. 25. la plus petite partie d'une excentrique quelconque, est plus grande que la plus petite partie de la centrique; & en récompense la plus grande partie de l'excentrique est plus petite que la grande partie de la centrique. Et l'uniformité de la ligne circulaire fait que cette compensation est si juste, qu'il ne faut pas s'étonner si les deux parties de la centrique sont reciproques aux deux parties de toute excentrique, c'est à dire si la petite partie de la centrique est à la plus petite partie de l'excentrique, comme la plus grande de l'excentrique est à la plus grande de la centrique. D'où il s'ensuit aussi que les deux parties d'une excentrique quelconque doivent être reciproques aux deux parties de toute autre excentrique.

Il en est de même quand le point est hors le Cercle. Car la centrique est aussi la plus longue de toutes, (VII. 25.) & sa partie qui est hors le Cercle est au contraire plus courte, que la partie de toute autre qui est aussi hors le Cercle. Ce qui faisant une compensation juste à cause de l'uniformité du Cercle, on juge aisément que la centrique & sa partie hors le Cercle doivent être reciproques à toute excentrique & sa partie hors le Cercle; & qu'il en est de même des excentriques comparées les unes aux autres; celles qui approchent le plus de la centrique étant toujours les plus longues, & ayant toujours aussi leurs parties de dehors plus courtes.

SECTION IV.

Troisième voie generale pour trouver des Reciproques, quand le point commun est dans la circonference du Cercle.

XXXV. Je ne croi pas que ce que l'on va dire se trouve nulle part.

Nous avons déjà remarqué (23. sup.) que cette dernière voie generale se pouvoit diviser en deux manieres: Dans l'une desquelles le point commun étoit terminant, & dans l'autre de section.

Qu'il étoit terminant, quand la ligne droite indéfinie, dont nous allons parler, ou coupoit le Cercle, ou le touchoit, ou étoit au dessous du Cercle.

Et qu'il étoit de section, c'est à dire que les deux lignes principales s'y coupoient, quand cette ligne indéfinie étoit au dessus du Cercle. Il faut donc traiter séparément ces deux manieres.

PREMIERE MANIERE DE LA
III. VOIE GENERALE :

*Quand l'indefinie coupe , ou touche , ou
est au dessous du Cercle.*

*Une seule Proposition comprendra la maniere de
trouver une infinité de Reciproques. Et il est peut-
être difficile de s'imaginer rien de plus general
sur la proportion des lignes par la Geometrie or-
dinaire.*

PROPOSITION GENERALE.

SI d'un point dans la circonference on tire une XXXVI.
ligne indefiniment par le centre, & qu'on en tire
une autre indefinie que j'appelleray y , qui coupe
perpendiculairement celle qui passe par le centre :
en quelque endroit qu'elle la coupe, soit en cou-
pant aussi le Cercle, soit en le touchant, soit tout
à fait hors le Cercle & au dessous : toutes les li-
gnes tirées du point dans la circonference qui se-
ront ou coupées par y , & terminées par la cir-
conference: ou coupées par la circonference & ter-
minées par y : seront telles, que chaque toute &
sa partie vers le point commun seront reciproques
à chaque autre toute & à sa partie ; & chaque
toute & sa partie auront pour moyenne proportio-
nelle celle qui sera terminée à un point commun
à y & à la circonference.

CETTE proposition est si vaste & comprend XXXVII.
tant de cas qu'on n'en sçauroit bien voir la verité,
qu'en la considerant dans ces cas particuliers qui sont
trois principaux.

Le 1.^{er} Quand la ligne y coupe le Cercle.

Le 2.^e Quand elle le touche.

Le

330 NOUVEAUX ELEMENS

Le 3.^e Quand elle est tout à fait hors le Cercle, & au dessous.

C'est ce que nous traiterons par divers Theorèmes.

PREMIER CAS.

XXXVIII. LE 1.^{er} Cas est quand y coupe le Cercle. Et alors il n'est point nécessaire de dire que cette ligne doit être perpendiculaire à celle qui étant tirée du point K passe par le centre : car il suffit de dire, (ce qui est la même chose,) qu'elle doit couper le Cercle en deux points, que j'appelleray E & E , qui soient également distans de K . Cela étant vrai; voici le 1.^{er} Theorème :

V. THEOREME.

XXXIX. Si la ligne y coupe le Cercle en deux points également distans de K , toutes les tirées du point K qui seront ou coupées par y , & terminées par la circonférence : ou coupées par la circonférence, & terminées par y : seront telles que chaque toute & sa partie vers K seront reciproques à chaque autre toute & à sa partie vers K .

On peut faire sur cela trois comparaisons :

La 1.^{re} De deux lignes qui sont toutes deux coupées par y & terminées par la circonférence.

La 2.^e De deux lignes qui sont toutes deux coupées par la circonférence, & terminées par y .

La 3.^e De deux lignes, dont l'une est coupée par y , & terminée par la circonférence; & l'autre coupée par la circonférence, & terminée par y .

PREMIERE COMPARAISON.

XL. SOIENT tirées Kf , qui coupe y en c ; & Kg qui la coupe en d : je dis que les bases fg & cd sont antiparalleles. Donc tout le reste s'ensuit, par la 1.^{re} Proposition fondamentale, *sup.* 17.

Car

DE GEOMETRIE. Liv. XI. 331

Car (par IX. 41.) l'angle $K \epsilon E$, a pour mesure la moitié de l'arc $K E$ plus la moitié de l'arc $E f$; & l'arc $K E$ étant égal à l'arc $K E$, cette mesure est. égale à la moitié des deux arcs $K E$ & $E f$. Or la moitié des deux arcs $K E$ & $E f$ est la mesure de l'angle inscrit $K g f$, parce que l'arc $K E f$, sur lequel il est appuyé, comprend ces deux-là.



Donc l'angle $K \epsilon E$ (ou $K \epsilon d$) est égal à l'angle $K g f$. On prouvera la même chose des angles $K d \epsilon$ & $K f g$. Donc ces deux bases sont antiparallèles.

Donc (par la 1.^{re} Proposition fond. *sup.* 17.) la toute d'une part & sa partie, sont reciproques à l'autre toute & à sa partie. Ce qu'il falloit demon-


$$K f. K d. :: K g. K \epsilon.$$

$$T. p. :: T. p.$$

SECONDE COMPARAISON.

SOIENT tirées $K f$ qui coupe la circonference en c , & $K g$ qui la coupe en d ; je dis que les bases $f g$ & $c d$ sont antiparallèles. 111

Car (par IX. 45.) l'angle $K f g$ a pour mesure la moitié de l'arc $K \epsilon$, qui est aussi la mesure de l'angle inscrit $K d \epsilon$. Donc les angles $K f g$ & $K d \epsilon$ sont égaux.



On prouvera de la même sorte que les angles $K g f$ & $K \epsilon d$ sont égaux.

Donc

332 NOUVEAUX ELEMENTS

Donc les bases fg & cd sont antiparallèles.

Donc $Kf. Kd. :: Kg. Ke.$

$T.p. :: T.p.$

TROISIÈME COMPARAISON.

XLII. SOIENT tirées Kf qui coupe la circonférence en c , & Kg qui coupe y en d .

Dans cette comparaison les bases se croisent. Car il faut prendre pour les deux bases fd & gc .

Or pour prouver qu'elles sont antiparallèles, il faut montrer que les angles

Kfd , ou KfE , & Kgc ,

sont égaux. Ce qui est facile,

puisque'il est clair (par ce

qui vient d'être dit 41. *sup.*)

que l'un & l'autre a pour mesure

la moitié de l'arc Kc ; &

pour les deux autres KdE &

Kcg , cela se prouve aussi facilement

(par ce qui a été dit 40 *sup.*) de l'égalité

entre les angles Kdf (ou KdE), & Kcg .

Donc les bases fd & gc sont antiparallèles.

Donc $Kf. Kd. :: Kg. Ke.$

$T.p. :: T.p.$



VI. THEOREME,

COROLLAIRE DU CINQUIÈME.


XLIII. LA ligne tirée de K au point commun à la circonférence & à y (c'est à dire KE ou KE), est moyenne proportionnelle entre chaque route & sa partie, soit qu'elle soit coupée par y & terminée par la circonférence, soit qu'elle soit coupée par la circonférence & terminée par y .

PRE-

PREMIERE COMPARAISON.

Soit tirée Kf qui coupe ye en c , & KE ; il ne faut que prouver que les bases fE & cE sont antiparallèles. Ce qui est facile.

Car les angles inscrits KfE & KEc (ou KEE ,) sont égaux; parce que (par IX. 17.) l'un est appuyé sur l'arc KE , & l'autre sur l'arc KE , qui sont égaux.



Et pour les angles KcE , & KEf , leur égalité se prouve de la même sorte que l'égalité des angles Kfg & Kdc , dans le 5.^e Theorème, 1.^{re} Comparaison.

Donc ces bases sont antiparallèles & disposées en la 3.^e manière expliquée dans le 4.^e Lemme.


Donc $Kf. KE. :: KE. Kc$.

T. M. :: M. p.

SECONDE COMPARAISON.

SOIT tirée Kf qui coupe la circonférence en c ; XLIV. je dis que les bases fE & cE sont antiparallèles.

Car les angles KfE & KEc ont pour mesure la moitié de l'arc Kc , selon ce qui a été dit, 5.^e Theorème, 2.^d Comparaison; & les angles inscrits KEf (ou KEE ,) & KcE , sont égaux aussi, étant appuyez sur les arcs égaux KE & KcE .



Donc $Kf. KE. :: KE. Kc$.

T. M. :: M. p.

SECOND CAS.

- XLV. Le 2.^e Cas de la Proposition generale (*sup.* 37.) est quand la ligne y touche le Cercle en un point diametralement opposé à K : ce qui comprend aussi deux Theorèmes.

VII. THEOREME.

- XLVI. QUAND y touche le Cercle en un point diametralement opposé à K : toutes les lignes tirées de K sui cette ligne, (qui ne peuvent pas n'être point coupées par le Cercle,) sont telles, que chaque toute & sa partie sont reciproques à chaque autre toute & à sa partie.

Si les deux lignes étoient tirées de deux differens côtez, il n'y auroit rien qui n'eust déjà été prouvé 41. *sup.* C'est pourquoy nous les proposerons du même côté. Ce qui pourra aussi servir au cas semblable du 3.^e Theorème.

Soient tirées du même côté Kf , coupée par la circonference en e , & Kg coupée par la circonference en d ; il faut prouver que les bases fg & ed sont antiparalleles. Or il y a sur chacune un angle aigu Kgf (ou Kge ,) & Ked ; & un obtus Kfg & Kde .

Pour les aigus, ils sont égaux; parce qu'ils ont chacun pour mesure la moitié de l'arc Kd . (par IX. 17 & 45.)

Et pour les obtus, il est aisé de prouver qu'il sont égaux, par leurs complemens edg & kfe .

Car par IX. 15. cdg , a pour mesure la moitié des deux arcs Kd & de .

Et par IX. 45. kfe , a pour mesure la moitié de l'arc Kde , qui comprend ces deux-là.



Donc

Donc ces angles aigus sont égaux.

Donc les obtus $K d e$ & $K f g$, dont ces aigus sont les complémens, sont égaux aussi.

Donc les bases $f g$ & $c d$ sont antiparallèles.

Donc $K f. K d :: K g. K c$.

$T. p :: T. p$.

VIII. THEOREME,

COROLLAIRE DU SIXIEME.

Le diametre tiré du point K (& par consé- XLVII,
quent tout autre) est moyen proportionel entre
chaque toute & sa partie.

Soit tirée $K f$ qui soit
coupée en e ; les bases
 $f E$ & $e E$ sont antipa-
rallèles.


Car les angles $K E f$,
& $K e E$, son droits, &
par conséquent égaux.

Et les aigus $K f E$;
& $K E e$, ont chacun
pour mesure la moitié
de l'arc $K e$ (par IX. 45, & 17.

Donc les bases $f E$ & $e E$ sont antiparallèles.

Donc $K f. K E :: K E. K e$.


$T. M. :: M. p$.



TROISIEME CAS.

Le 3.^e Cas est quand la
ligne y est tout à fait hors
le Cercle & au dessous:
mais comme il n'a aucu-
ne difficulté particuliere,
nous ne nous y arrête-
rons point.

Il faut seulement remar-
quer, qu'il n'y a point



XLVIII.

de

336 NOUVEAUX ELEMENS

de moyenne proportionnelle dans ce 3.^e Cas ; parce qu'il n'y a aucun point qui soit commun à la ligne y , & à la circonférence : la ligne y étant tout à fait hors le Cercle.

SECONDE MANIERE

De la troisième voie pour trouver des Reciproques : Quand l'indefinie est tout à fait hors le Cercle & au dessus.

Nous avons vu dans le Plan, (24. S.) que l'indefinie est au dessus du point commun, quand le Cercle n'est pas entre ce point & l'indefinie. Et alors le point commun sera de section, & tout se reduira à ce Theoreme :

IX. THEOREME.

XLIX. QUAND la ligne indefinie qui coupe perpendiculairement le diametre prolongé, est au dessus du Cercle, c'est à dire quand le Cercle n'est point entre cette ligne indefinie & le point commun : toutes les lignes qui se couperont dans ce point, étant terminées d'une part par l'indefinie, & de l'autre par le Cercle, les parties de l'une seront reciproques aux parties de l'autre.

SOIT l'indefinie y , le diametre prolongé $A E$; le point commun K ; l'une des secantes $B c$, & l'autre $F G$; & une tangente au point K , qu'on appelle $m n$. Si on tire la ligne $c G$, je dis que les angles $A B c$ & $c G K$, sont égaux. Car l'indefinie



&c

& la tangente étant parallèles, les angles correspondans que chaque sécante fait sur l'une & l'autre sont égaux : c'est à dire que l'angle ABc est égal à l'angle mKc . (VIII. 59.) Or mKc , a pour sa mesure la moitié de l'arc Kc (par IX. 12.) qui est aussi la mesure de l'angle cGK (par IX. 17.) Donc les angles ABc & cGK , sont égaux. Et il en est de même des deux angles AFG , & GcK . Donc les bases Bf & Gc des deux angles opposéz en K sont antiparallèles, par 9. *sup.*

Donc les parties de la ligne Bc sont reciproques à celles de la ligne Fg , par 21. *sup.*


SECTION V.

Autres Theorèmes, ou qui n'entrent pas dans l'analogie des precedens, ou qui se peuvent rapporter à plusieurs de ces trois voies.

X. THEOREME.

Les deux côtes de tout angle inscrit au Cercle sont reciproques à la ligne entiere, qui le partageant par la moitié se termine à la circonférence, & à la partie de cette ligne comprise entre le sommet de l'angle coupé par la moitié & la base.

Soit l'angle inscrit EKE . Soit pris le point K dans le segment opposé également distant d' E & d' E . La ligne KK qui coupe la base en c partage cet angle inscrit par la moitié, puisque les deux angles EKK & EKK , étant appuyez sur des arcs égaux, sont égaux, (par IX. 20.)



Or

338 NOUVEAUX ELEMENTS

Or les angles Ekc , (qui est le même qu' EKK), & EKK , ne sont pas seulement égaux, mais ils sont aussi semblables; c'est à dire que les angles sur la base de l'un sont égaux aux angles sur la base de l'autre chacun, à chacun.

Car les angles inscrits vers E & vers K sont égaux (par IX. 20.) parce qu'ils sont appuyez sur le même arc kE .

De plus l'angle kEa pour mesure la moitié de l'arc kE sur lequel il est appuyé, plus la moitié de l'arc opposé EK . (IX. 41.) Et l'arc EK étant égal à l'arc EK , cette mesure est égale à la moitié des arcs kE & EK , qui est la mesure de l'angle inscrit kEK . (par IX. 17.)

Donc les angles kEc & kEK sont égaux.

Donc les angles Ekc & EKK sont semblables. (X. 7.)

Donc (par X. 18.)

$$kE. kK. :: kc. kE.$$

Ce qu'il falloit démontrer, puisque kE & kE sont les deux côtes de l'angle partagé par la moitié, & que kK est la ligne entière qu'il partage, & kc sa partie.

COROLLAIRE.

41. Si l'angle inscrit étoit Isoscele, chaque côté seroit moyen proportionnel entre la toute qui le diviserait par la moitié, & sa partie.

Car le côté de l'angle étant égaux, les prendre tous-deux, ou en prendre un deux fois, c'est la même chose.

Mais quand l'angle inscrit est Isoscele, la ligne qui le partage par la moitié est nécessairement un diamètre. Et de plus les deux points EE étant alors également distans de k aussi bien que de K , cela revient à ce qui a été démontré plus haut par une autre voie, & à ce qui le sera encore plus bas.

XI. THEORÉME.

Si du sommet d'un angle droit on tire une perpendiculaire sur l'hypoténuse, il y aura trois moyennes proportionnelles. LIX.

1. La perpendiculaire, entre les deux parties de l'hypoténuse.

2. Le petit côté de l'angle droit, entre la plus petite partie de l'hypoténuse qui y est jointe, & l'hypoténuse entière.


3. Le plus grand côté de l'angle droit, entre la plus grande partie de l'hypoténuse qui y est jointe, & l'hypoténuse entière.

Tout cela se peut prouver par un grand nombre de voies. Mais celle-cy me semble la plus facile & la moins embarrassée:

Soit l'angle droit kEK , & la perpendiculaire du sommet à l'hypoténuse Ec .

Si on fait un Cercle qui ait l'hypoténuse kK pour diamètre, le sommet E se trouvera dans la circonférence, par IX. 32.

Et si on prolonge Ec jusqu'à E , que je suppose être le point opposé de la circonférence, la corde EE sera coupée en c par la moitié, & les points $E E$ également distans tant de k que de K .



Donc 1. par 29. *sup.*

$k c. Ec. :: Ec. c K.$

Donc 2. par le 6.^e Theorème (43. *sup.*)

$k c. k E. :: K E. K k.$

Donc 3. par le même 6.^e Theorème,

$k c. k E. :: k E. k K.$

XII THEORÉME.

- LIII. TOUTE ligne qui coupant perpendiculairement l'hypoténuse d'un Angle droit en coupe aussi un côté, les coupe *reciproquement* ; c'est à dire que l'hypoténuse entière & sa partie vers le point qui lui est commun avec le côté coupé, sont reciproques au côté coupé entier, & à sa même partie vers le point commun. La preuve en est facile par le 3.^e Theorème (39. & 40. *sup.*) en décrivant un Cercle qui ait cette hypoténuse pour diamètre, & prolongeant la coupante, qui tiendra lieu d'*Indefinie* y ; elle se peut faire encore par d'autres voies, que je laisse à trouver.



DERNIER THEORÉME.

- LIV. UN Angle ayant deux bases, si ses côtez selon une base sont proportionnels à ses côtez selon l'autre base, les deux angles sur une base sont égaux aux deux angles sur l'autre base, chacun à chacun. C'est la converse de la plupart des Propositions de ce Livre, qui se prouve ainsi :

Les côtez sur une base ne sçauroient être proportionnels aux côtez sur l'autre base qu'en deux manieres.

La 1.^{re} est, quand la toute d'une part & sa partie sont proportionnelles à l'autre toute & à sa partie.

La

DE GEOMETRIE. Liv. XI. 341

La 2.^e quand une route & sa partie sont reciproques à l'autre route & à sa partie.

Or le premier cas ne peut être, que les bases ne soient paralleles. Et le second, qu'elles ne soient antiparalleles. Et en l'un & en l'autre les deux angles sur une base sont égaux aux deux angles sur l'autre base.


PREUVE DU PREMIER CAS.

SOIT l'Angle fKg , dont les deux bases soient fg & cd . Je dis que ces bases sont paralleles, si

L.V.

$$Kf.Kc. :: Kg.Kd.$$

Car soit menée du point c une parallele à fg , qui coupe Kg en un point que j'appelleray x .



Il est certain (par X. 20.) que

$$Kf.Kc. :: Kg.Kx.$$

Or par l'hypothese,

$$Kf.Kc. :: Kg.Kd.$$

Donc $Kg.Kx. :: Kg.Kd.$ (II. 16.)

Donc Kx & Kd sont égales, par II. 18.

Donc les points x & d ne sont qu'un même point.

Donc cx & cd ne sont que la même ligne.

Or cx est parallele à fg . Donc cd luy est aussi parallele.

Donc les angles sur la base cd sont égaux aux angles sur la base fg . Ce qu'il falloit démontrer.

PREUVE DU SECOND CAS.

2VI. SOIT l'angle fKg , qui ait deux bases fg & cd .
Je dis que ces bases sont antiparallèles, si

$$Kf.Kd. :: Kg.Kc.$$

Car soit tirée du point c une ligne qui coupant Kg , prolongée s'il est besoin, fasse sur Kg un angle égal à celui que gf fait sur Kf , & que le point où cette ligne coupera Kg soit x . Cette ligne cx sera une base de l'angle K antiparallèle à la base fg ; & par conséquent (par 18. sup.)

$$Kf.Kx. :: Kg.Kc.$$

Or par l'hypothèse,

$$Kf.Kd. :: Kg.Kc.$$

$$\text{Donc } Kf.Kx. :: Kf.Kd. \text{ (II. 16.)}$$

Donc, par II. 28. Kx est égal à Kd .

Donc les points x & d étant sur la même ligne, ne sont qu'un même point.

Donc cx & cd ne sont qu'une même ligne.

Or cx est antiparallèle à fg .

Donc cd est aussi antiparallèle à fg .

Donc les angles sur la base cd sont égaux aux angles sur la base fg . Ce qu'il falloit démontrer.



COROLLAIRE.


2VII. Si deux angles égaux ont leur côtés proportionnels, ils sont semblables; c'est à dire que les angles sur la base de l'un sont égaux aux angles sur la base de l'autre chacun à chacun.

Soient les angles égaux qui ayent leurs côtés proportionnels fKg , & hKd , en sorte que $Kf.Kc. :: Kg.Kd$.

D'où

D'où il s'ensuit que si Kf est plus grand que kc ,

Kg sera plus grand que kd . Prenant donc dans Kf , Kc égale à kc ; & dans Kg , Kd égale à kd : les angles cKd & ckd étant égaux, & les côtes de l'un étant égaux à ceux de l'autre, leurs bases seront égales, (VIII. 67.) & les angles sur la base de l'un égaux aux angles sur la base de l'autre, par VIII. 66.



Or par le precedent Theorème les deux bases de l'angle K , savoir la base cd & la base fg , sont paralleles, & les angles sur l'une sont égaux aux angles sur l'autre.



Donc dans les deux angles égaux K & k les angles sur la base de l'un sont égaux aux angles sur la base de l'autre. Ce qu'il falloit demontrer.

Remarquez que ce dernier Theorème & son Corollaire sont les converses des principaux Theorèmes de ce Livre & du Livre precedent, & qu'ils seront de grand usage dans la suite.

SECTION VI.

Problemes.

I. PROBLEME.

TROUVER la moyenne proportionnelle entre deux lignes données. Joindre les lignes données. Faire un demy-cercle, dont prises ensemble elles soient le diametre. La



P 4

per.

LXVIII.

344 NOUVEAUX ELEMENS


perpendiculaire élevée du point où se joignent ces lignes à la circonférence sera la moyenne proportionnelle entre ces lignes données (par 29. *sup.*)

On peut employer pour trouver la même chose les Theorèmes 6.^e & 8.^e *sup.* & d'autres encore. J'en laisse la recherche pour exercer l'Esprit.

II. PROBLEME.

LIX. TROUVER toutes les reciproques possibles à deux lignes données.

Mettre la plus petite dans la plus grande, comme K *f.* Faire un Cercle qui ait la plus grande pour diametre. Et du point *e*, où la plus petite se termine, tirer sur ce diametre une perpendiculaire indefinie comme *y*. Cette perpendiculaire satisfera au Probleme, comme on le peut juger, en considerant le 5.^e Theoreme (39. 40. 41. &c. *sup.*) sans qu'il soit besoin que je m'amuse à l'expliquer davantage.



III. PROBLEME.

LX. AYANT tiré à discretion d'un même point tant de lignes que l'on voudra sur une même ligne : les diviser toutes, enforte que chaque toute & sa partie vers le point commun soient reciproques à chaque autre toute & à sa même partie.



Tout


Tout Cercle dont la circonference passera par le point commun, & qui aura pour diametre, ou la perpendiculaire entiere tirée de ce point sur la ligne, ou une partie de cette perpendiculaire, satisfera au Probleme, par le 7.^e Theoreme, & ce qui a été dit du 3.^e Cas (48. *sup.*)



IV. PROBLEME.

AYANT les trois premieres lignes d'une Pro- L X I.
gression Geometri-
que, trouver toutes
les autres à l'infini.

Faire que la 2.^e
comprenne la 1.^{re},
comme K d com-
prend K c. Faire un
Cercle qui ait K d
pour diametre. De
c élever la perpendi-
culaire cL; & puis



tirer une ligne indefinie de K par L, laquelle j'appelleray x; & prolonger aussi indefiniment K d, laquelle j'appelleray z.

Tirant L d perpendiculaire sur x, & d m perpendiculaire sur x, & m f perpendiculaire sur x, & f n perpendiculaire sur x, & ainsi à l'infini :

On trouvera facilement (par 52. *sup.*) la suite infinie de la Progression Geometrique; dont les trois premiers termes auront été K c. K L. K d. qui seront suivis de K m. K f. K n. K g. &c.

V. PROBLEME.

EXII. DIVISER une ligne donnée en moyenne & extreme raison. C'est à dire en telle sorte que la plus grande partie soit moyenne proportionnelle entre la plus petite partie & la toute.

Ce qui est aussi la même chose que de trouver une ligne qui soit moyenne entre une donnée, & cette donnée moins cette moyenne, laquelle pour cette raison j'appelleray *la mediane*.

Soit la ligne donnée appelée b .

Sa plus grande partie que l'on cherche, x .


Et sa plus petite, $b - x$.

Il faut trouver une ligne qui soit telle, que b moins cette ligne, soit à cette ligne : comme cette ligne est à b .

$$b - x. x. :: x. b.$$

C'est ce qui se peut trouver par une voie fort facile.

Décrire un Cercle de l'intervalle de la moitié de b , élevée perpendiculairement sur l'une des extrémités de b .



Et tirer une secante de l'autre extrémité de b , qui passant par le centre du Cercle se termine à la circonférence.

La partie de cette secante qui est hors le Cercle sera x . C'est à dire moyenne proportionnelle entre b , & $b - x$.

Car 1. par la construction b est tangente de ce Cercle.

2. Le diamètre de ce Cercle est égal à b .

3. Et par conséquent la secante entière est $x + b$.

Or (par 33. *sup.*) b tangente est moyenne proportionnelle entre la partie de la secante qui est hors le Cercle, (c'est à dire x), & la secante entière, (c'est à dire $x + b$).

Donc

Donc $x. b. :: b. x \rightarrow b.$

Donc *permutando*, $b. x. :: x \rightarrow b. b.$

Donc *dividendo*, $b - x. x. :: x. b.$

Ce qu'il falloit demontrer.

I. COROLLAIRE.

UNE ligne étant divisée en moyenne & extreme raison, si on y ajoute sa plus grande partie, (que nous appellerons *la mediane* :) ils'en fera une nouvelle toute qui sera encore divisée en moyenne & extreme raison, la premiere toute étant la mediane. LXIII.

C'est ce qui se voit par la voie même dont on s'est servi pour diviser la premiere toute en moyenne & extreme raison ; en sorte qu'il ne faut que reconposer, pour parler ainsi, ce que l'on a divisé.

Car si $b - x. x. :: x. b.$

Componendo, $b. x. :: x \rightarrow b. b.$

Donc *permutando*, $x. b. :: b. x \rightarrow b.$

Donc la ligne $x \rightarrow b$ est divisée par b en moyenne & extreme raison, puisque b est moyenne proportionnelle entre la toute $x \rightarrow b$, & son autre partie x .

II. COROLLAIRE.

UNE ligne étant divisée en moyenne & extreme raison, sa petite partie divise la mediane en moyenne & extreme raison. LXIV.

Soit b divisée comme dessus ; & comme sa mediane est appelée x , soit la petite partie appelée y . Il faut prouver que $x - y. y. :: y. x.$

Or il ne faut pour cela que nommer b par ses parties $y \rightarrow x$.

Car, par la division de b par x en moyenne & extreme raison, $y. x. :: y \rightarrow x. x.$

Donc *permutando*, $x. y. :: y \rightarrow x. x.$

Donc *dividendo*, $x - y. y. :: y. x.$ Ce qu'il falloit demontrer.

III. COROLLAIRE.

EXV. IL est aisé de conclure de ces deux Corollaires que lorsqu'on a une ligne divisée en moyenne & extreme raison, on en peut avoir une infinité d'autres plus grandes & plus petites divisées de la même sorte.

PREUVE DES PLUS
GRANDES.

EXVI. SI on joint la mediane à la premiere toute, il s'en fait une seconde toute qui a la premiere pour sa mediane, (par le premier Corollaire.)

Donc si on joint la premiere toute à la deuxième, il s'en fait une troisième qui a la deuxième pour sa mediane.

Et joignant la deuxième à la troisième, il s'en fait une quatrième qui a la troisième pour sa mediane, & ainsi à l'infini.

PREUVE DES PLUS
PETITES.

SI on prend la mediane de la premiere toute, il s'en fait une seconde toute plus petite, qui a pour sa mediane (par le deuxième Corollaire,) la petite partie de la premiere toute.

Et cette mediane de la deuxième toute est une troisième toute qui a pour sa mediane la petite partie de la deuxième toute, & cette mediane de la troisième toute est une quatrième toute, qui a pour sa mediane la petite partie de la troisième toute, & ainsi à l'infini. Et qui peut-être considéré comme une nouvelle & très-belle preuve de la divisibilité d'une ligne à l'infini.

VI. PROBLEME.

AYANT la grandeur des côtez d'un angle qui ^{LXVII.} doive être la moitié de chacun des angles sur la base, en trouver la base.

Soit Kb la grandeur de ces côtez; & soit décrite une portion de Cercle de cet intervalle & du centre K .

Soit divisée Kb en e , en moyenne & extreme raison, enforte que

$$be. eK. :: eK. bK.$$

La corde bd de la grandeur de eK , qui est la moyenne entre be & bK , fera la base de cet angle, & Kd en fera l'autre côté.

Car soit tirée la ligne cd : je suppose que les deux angles sur la base d'un angle Isoscele sont égaux. Et ainsi j'auray prouvé que l'angle K est la moitié de chacun des angles sur la base, si je puis montrer deux choses:

La 1.^{re} Que l'angle K est égal à l'angle bdc .

La 2.^e Que l'angle bdc est la moitié de l'angle bKd .

PREUVE DE LA PREMIERE.

L'angle b a deux bases, cd & Kd ; & ses côtez selon une base sont proportionnels à ses côtez selon l'autre base, puisque par la construction

$$be. bd. :: bd. bK.$$

Donc les bases cd & Kd sont antiparalleles; & par conséquent les angles sur l'une sont égaux aux angles sur l'autre, chacun à chacun.

Donc l'angle K est égal à l'angle bdc . Ce qui est la première chose qu'il falloit démontrer.



PREUVE DE LA SECONDE.

Les deux parties de bK , base de l'angle de $b d K$, sont en même raison que les deux côtés de cet angle: puisque dK étant égale à bK , & eK à bd ,

$$bc. eK. :: bd. dK.$$

Donc l'angle $b d K$ est divisé par la moitié. (X. 33.)

Donc l'angle K étant égal à l'angle $b d e$, qui est la moitié de l'angle $b d K$, est aussi la moitié de l'angle $b d K$. Ce qu'il falloit démontrer.

COROLLAIRE.

XXVIII. Tout angle Isoscele dont la base est moyenne proportionnelle entre le côté entier & le côté moins cette base, est de 36 degrez; & chacun des angles sur la base est de 72. Car 36, plus deux fois 72 qui est le double de 36, vaut 180, qui est ce que valent les trois angles pris ensemble.

VII. PROBLEME.

XXIX. AYANT la base d'un angle Isoscele de 36 degrez, en trouver le côté.

Soit b la base donnée divisée en moyenne & extreme raison, & x en soit la plus grande partie; $x+b$ sera le côté de cet angle. C'est à dire que l'angle qui aura $x+b$ pour l'un & l'autre de ses côtés, & b pour base, sera de 36 degrez.

Car puisque par la division de b en moyenne & extreme raison

$$b-x. x. :: x. b.$$

$$\text{Componendo, } b. x. :: x+b. b.$$

$$\text{Donc permutando, } x. b. :: b. x+b.$$

Donc la base b est moyenne proportionnelle entre le côté $x+b$ & x , qui est le côté moins b .

Donc, par le precedent Corollaire, l'angle qui a $x+b$ pour chaque côté, & b pour base, est de 36 degrez. Ce qu'il falloit démontrer.

SEC.

SECTION VII.

Des Lignes Incommensurables.

Ce que nous avons dit des Grandeurs Incommensurables dans le IV. Livre donne une si grande facilité d'expliquer les Lignes Incommensurables, qu'il ne faut pour cela qu'ajouter à ce Livre trois ou quatre Propositions.

PROPOSITION
GENERALE.

Lorsque trois lignes sont continuellement proportionnelles, la raison de la première à la troisième peut-être de trois sortes : ce qui se fait en trois cas. LXX.

PREMIER CAS.

Si la raison de la première à la troisième est une raison de nombre à nombre qui ait pour ses exposans des nombres quarrés : la moyenne est à chacune des deux autres, comme le produit des racines de ces nombres quarrés, est à chacun de ces nombres quarrés ; & par conséquent la moyenne est commensurable aux deux autres.

SECOND CAS.

Si la raison de la 1.^{re} à la 3.^e est une raison de nombre à nombre, qui n'ait pas pour ses exposans des nombres quarrés : la moyenne est incommensurable en longueur & commensurable en puissance à la 1.^{re} & à la 3.^e

TROISIEME CAS.

Si la raison de la 1.^{re} à la 3.^e est une raison sourde, & non de nombre à nombre : la moyenne est incommensurable aux deux autres, tant en longueur qu'en puissance. Tous

352 NOUVEAUX ELEMENTS

Tous ces 3 Cas se prouvent des lignes, de la même sorte qu'on les a prouvez des grandeurs en general dans le IV. Livre. C'est pourquoy ce qui reste ici est d'appliquer cette doctrine generale à des exemples particuliers qui soient propres aux lignes. Ce que nous ferons par les Theorèmes suivans.

I. THEOREME.

XXXI. UN angle droit étant Isoscele, le côté & l'hypotenuse sont incommensurables en longueur, & commensurables en puissance.

Soit un angle droit Isoscele, dont
L'hypotenuse soit appelée b .
Le côté d .

La perpendiculaire du sommet à l'hypotenuse la partagera en deux également. Chaque moitié soit appelée m .



Donc $b. d. m.$ (52. sup.)

Or $b. m. :: 2. 1.$

Donc 2 & 1 n'étant pas deux nombres quarrés : par le 2.^e Cas d est incommensurable en longueur à b & à m .

Mais il leur est commensurable en puissance ; parce que par III. 34.

$$\left. \begin{array}{l} bh. d d. \\ dd. mm. \end{array} \right\} :: b. m. :: 2. 1.$$

II. THEOREME.

XXXII. QUAND l'hypotenuse est à l'un des côtez d'un angle droit, comme nombre à nombre, il est aisé de juger si l'autre côté est commensurable ou incommensurable à l'hypotenuse. Et voici comment :

Soit l'hypotenuse b .

Un des côtez c .

L'autre côté d .

Un

Une perpendiculaire étant
menée du sommet à l'hypotenuse,

Soit la portion vers e ap-
pellée k .

Et l'autre vers d appel-
lée l .



Il s'ensuit que $\begin{cases} \frac{d}{e} :: \frac{b}{k} \\ \frac{d}{e} :: \frac{b}{l} \end{cases}$

Supposant donc que b & e soient comme les
deux nombres x & z , c'est à dire que

$$b. e. :: x. z.$$

Donc la raison de $b. k$. étant doublée de la rai-
son de $b. e$. (III. 24.)

$$b. k. :: xx. zz. \text{ (III. 31.)}$$

Donc $b. b-k. :: xx. xx-zz$. (II. 48.)

Or k & l étant les deux portions de b ,

$$l = b-k.$$

Donc $b. l. :: xx. xx-zz$.

Donc si $xx-zz$ est un nombre quarré : par le
premier Cas de la Proposition generale, b est com-
mensurable à d .

Que si au contraire $xx-zz$ n'est pas un nom-
bre quarré : par le deuxième Cas b n'est point
commensurable à d en longueur, mais seulement
en puissance.

III. THEOREME.

LORSQU' un des côtez de l'angle droit est une **LXXII.**
aliquote de l'hypotenuse, l'autre côté est incom-
mensurable à l'hypotenuse en longueur, & com-
mensurable seulement en puissance.

Car afin que e par exemple, soit une aliquote
de b , il faut que b soit à e , comme quelque nom-
bre à l'unité que je queray par un 1. (Voyez
la fig. precedente.)

Soit donc $b. e. :: x. 1$.

Donc $b. k. :: xx. 11$. (III. 31.)

Donc

354 NOUVEAUX ELEMENS

Donc $b. h - k. :: xx. xx - 11.$ (II. 48.)

Or $l = h - k.$

Donc $b. l. :: xx. xx - 11.$

Or il est impossible que $xx - 11$ soit un nombre carré. Car (11) ne fait qu'une unité, selon ce qui a été dit, IV. 9. Et deux nombres carrés ne peuvent jamais être différens seulement d'une unité.

Donc, par le second Cas de la Proposition Générale, b & d sont incommensurables en longueur, & commensurables seulement en puissance.

COROLLAIRE.

XXXIV. Si la base d'un angle Isoscele est égale au côté : la perpendiculaire du sommet à la base est incommensurable en longueur, & commensurable seulement en puissance, avec le côté.



Car alors cette perpendiculaire fait un angle droit avec la moitié de la base, & l'un ou l'autre des côtés est l'hypoténuse de cet angle droit.

Donc l'un des côtés de cet angle droit, qui est la moitié de la base, est aussi la moitié de l'hypoténuse.

Donc il est une aliquote de l'hypoténuse.

Donc, par le Théorème précédent, l'autre côté, qui est la perpendiculaire, est incommensurable en longueur, & commensurable seulement en puissance, avec l'hypoténuse de cet angle droit, laquelle est le côté de l'angle dont la base est supposée égale à chaque côté.

IV. THEORÉME.

AYANT deux lignes incommensurables en longueur, (ou par les Theorèmes precedens, ou par d'autres voies,) & ayant trouvé la moyenne proportionnelle entre ces deux lignes: elle leur sera incommensurable tant en longueur, qu'en puissance. LXXV.

Cela est clair par le 3.^e Cas de la Proposition generale.

V. THEORÉME.

QUAND une ligne est divisée en moyenne & extreme raison, la toute & ses deux parties sont incommensurables les unes aux autres. C'est ce qui a été prouvé dans le IV. Livre, Nomb. 36. LXXVI.

AVERTISSEMENT.

Il n'y a à dire de quatre lignes continuellement proportionnelles, que ce qui a été dit dans le IV. Livre de quatre grandeurs continuellement proportionnelles.



NOU-



NOUVEAUX ELEMENS
DE
GEOMETRIE.
LIVRE DOUZIE'ME.

DES FIGURES EN GENERAL
CONSIDERE'ES SELON LEURS
ANGLES
ET LEURS CÔTEZ.

3.



N appelle *Figure* dans les élémens de Geometrie, une surface plate terminée de tous côtez.

Ce qui comprend deux choses : la premiere, les extremitez de cette surface : la seconde, l'espace qu'elle comprend ; ce qui s'appelle l'*aire* de la *Figure*.

Nous les considerons dans ce Livre & le suivant selon le premier rapport ; & dans d'autres Livres nous les considererons selon le dernier.

Di-

DIVISION.

TOUTE figure considérée selon ses extrémités, est, I.
 Ou rectiligne:
 Ou curviligne:
 Ou mixte.

PREMIERE
DEFINITION.

ON appelle rectiligne celle qui est terminée par des lignes droites, qui ne peuvent être moins de trois; étant clair que deux lignes droites ne peuvent pas terminer un espace de tous côtés, puisqu'elles ne peuvent se rencontrer qu'en un point, ce qui laisse l'espace ouvert du côté opposé à ce point. II.

Il est clair aussi par là, que les lignes droites ne peuvent terminer un espace, qu'en faisant autant d'angles qu'il y a de lignes droites qui terminent l'espace. Car si un angle demande deux lignes, une ligne sert à deux angles.

Et ainsi l'on peut considérer trois choses dans l'extrémité d'une figure rectiligne. 1. Les angles. 2. Les côtés. 3. Le circuit, qu'on appelle aussi *perimètre*, qui n'est autre chose que la somme des côtés; c'est à dire tous les côtés pris ensemble.

SECONDE DEFINITION.

ON appelle curviligne celle qui est terminée par une ou plusieurs lignes courbes. Et une seule ligne courbe pouvant rentrer en elle-même peut terminer un espace. III.

Mais on ne considère icy des figures curvilignes que le seul Cercle; parce que de toutes les lignes courbes on ne considère que la circulaire.

TROIS.

TROISIÈME DEFINITION.

- VI. ON appelle figure mixte celle qui est terminée en partie par des lignes droites, & en partie par des courbes, dont on ne considère ici que les portions de Cercle, qui sont celles qui sont terminées par une corde & une portion de circonférence: ou les secteurs du Cercle, qui sont terminés par deux rayons & une portion de la circonférence, tel qu'est un quart de Cercle.

DES FIGURES
RECTILIGNES.

- VI. ON peut diviser les figures rectilignes en celles qui ont quelque angle rentrant, & celles dont tous les angles sont saillans; c'est à dire tels que leur pointe regarde toujours le dehors de la figure.

Les Geometres se sont restraints à considérer les dernières, parce qu'on y peut facilement réduire les premières.

ESPECES DES FIGURES
RECTILIGNES.

- VII. TOUTE figure rectiligne ayant autant d'angles que de côtes, on les divise indifféremment par le nombre de leurs côtes, & on les nomme selon l'un ou selon l'autre.

Ainsi on appelle *Triangle*, une figure de trois angles & de trois côtes; & *Quadrilatere*, celle de quatre angles & de quatre côtes.

Les

Les noms Grecs des figures sont pris du nombre des angles : comme

● *Pentagone*, de cinq.

Hexagone, de six.

Heptagone, de sept.

Octogone, de huit.

Enneagone, de neuf.

Decagone, de dix.

Et *Polygone*, de plusieurs angles indéterminé.

Ces noms sont si communs, qu'il est bon de ne les pas ignorer ; mais on peut se passer d'en sçavoir d'autres qui sont moins communs : & appeller les figures du nombre de leurs côtes ou de leurs angles, une figure de quinze côtes, de trente, de cent ; de mille &c.

I. THEORÉME.

Tout Polygone peut-être résolu en autant de VIII.
Triangles, qu'il a de côtes, moins
deux, & il ne le peut-être en moins.

C'est à dire, que s'il a 4 côtes, il peut-être résolu en deux Triangles ; si 5, en trois ; si 6, en quatre ; si 7, en cinq ; si 8, en six &c.



Car d'un angle quelconque tirant deux lignes de part & d'autre, qui soutiennent chacune l'angle qui le suit de part & d'autre, il s'en fait deux Triangles qui comprennent 4 côtes de la figure. Mais de ce même angle menant des lignes à chacun des autres angles, il s'en fait autant de Triangles qu'il y a de côtes outre ces 4. Donc il y aura autant de Triangles ~~qu'il y a de côtes~~ outre ces 4. Donc il y aura autant de Triangles que de côtes, moins deux ; puisqu'il y a nécessairement deux de ces Triangles qui comprennent 4 de ces côtes.

II. THEC-

II. THEOREME.

II. Tous les angles d'un Polygone quelconque sont égaux à autant de droits, que le double de ces côtez moins quatre.

Car nous avons déjà vu qu'un angle plus les deux angles que font les côtez sur la bafe, font égaux à deux droits. (VIII. 62.) Or un angle avec la bafe n'est point différent d'un Triangle. Et par conséquent les trois angles d'un Triangle valent deux angles droits, qui font six moins quatre.

Or par le precedent Theorème tout autre Polygone peut être refolu en autant de Triangles, moins deux, qu'il a de côtez; & les angles de ces Triangles comprendront ceux du Polygone. Donc si le Polygone a 7 côtez: étant refolu en 5 Triangles, les angles de ces 5 Triangles en vaudront dix droits, qui font 14 moins 4.

On le peut encore demontrer d'une autre sorte, en prenant un point quelconque au dedans du Polygone, & de ce point menant des lignes à tous les angles. Car alors l'Heptagone sera partagé en 7 Triangles, qui tous auront deux de leurs angles autour de la figure, & le 3.^e au dedans. Or tous les 21 angles de ces 7 Triangles en valent 14 droits; & les 7 du dedans de la figure valent 4 droits; (& quand il y en auroit mille, ou tant que l'on voudra, ils ne vaudront jamais que 4 droits, par VIII. 18.) Donc les 14 autres, qui sont égaux à ceux de l'Heptagone, valent 14 droits moins 4; c'est à dire 10 droits.

DIVISION.

Les figures de ces deux especes se peuvent confiderer ou chacune à part, ou en les comparant deux ensemble.

FIGU-

FIGURES CONSIDEREES 'A PART.

DÉFINITIONS.

1. CELLES dont tous les angles sont égaux, s'appellent *Equiangles*. X.

2. Celles dont tous les côtez sont égaux, s'appellent *Equilateres*.

3. Celles qui sont tout ensemble équiangles & équilateres, s'appellent *Regulieres*.

Et on met aussi le Cercle entre les regulieres, à cause de sa parfaite uniformité, & qu'on le peut considerer comme un Polygone regulier d'une infinité de côtez.

4. Celles dont les angles ou les côtez seroient alternativement égaux; c'est à dire le premier égal au 3.^e 5.^e 7.^e 9.^e & le second égal au 4.^e 6.^e 8.^e 10.^e se peuvent appeller *alternativement équiangles* ou *équilateres*.

Mais il faut remarquer que cela ne peut être que quand le nombre des angles ou des côtez est pair. Car s'il étoit impair, le dernier & le premier se trouveroient égaux; & par conséquent le penultième & le premier seroient inégaux: & par conséquent ils ne seroient pas tous alternativement égaux.

FIGURES COMPAREES.

DÉFINITIONS.

QUAND on compare deux figures de même genre, c'est à dire d'un nombre égal de côtez: XI.

1. Si les angles de l'une sont égaux aux angles de l'autre, on les appelle *Equiangles*; & ce mot

Q

ne

362 NOUVEAUX ELEMENS

ne marque pas alors que les angles de chaque figure sont égaux entr'eux ; mais seulement que ceux de l'une sont égaux à ceux de l'autre , chacun à chacun.

2. Si les côtez de l'une sont égaux aux côtez de l'autre , on les appelle *Equilateres* , ou *Equilateres entr'elles*.

3. Si elles sont tout-ensemble équiangles & équilateres entr'elles , on les peut appeller *Tout-égales* ; ce qu'il faut bien distinguer de celles qu'on appelle simplement *Egales*.

4. Si elles sont équiangles , & que les côtez de l'une soient proportionels aux côtez de l'autre , on les appelle *Semblables*.

Ce qui fait voir que les *sout-égales* sont toujours *semblables* , puisqu'il y a même raison entre les côtez de l'une & de l'autre , qui est la raison d'égalité. Au lieu que les *semblables* ne sont pas toujours *sout-égales* : puisqu'il peut y avoir une autre raison que celle d'égalité , qui soit la même entre les côtez de l'une & de l'autre.


Les côtez des figures semblables , entre lesquels il y a même raison , s'appellent les côtez *Homologues* , qui sont toujours le plus grand côté de l'une & de l'autre : & toujours ainsi. Et c'est ce qui produit ce Theorème ;

I. THEOREME.

KII. LES circuits de deux figures semblables sont en même raison que leurs côtez homologues.

Car soient les trois côtez de l'une de ces figures , *a, b, c* ; & de l'autre *b, c, d*.

Puisque B est à *b* , comme C à *c* , & D à *d* :



Les.

DE GEOMETRIE. LIV. XII. 363

Les trois d'une part , (qui font le circuit de la premiere figure ,) font aux trois de l'autre part , (qui font le circuit de la seconde ,) en même raison que chacun d'une part à chacun de l'autre. C'est ce qui a été démontré II. 52.

AUTRES DEFINITIONS.

QUAND on compare deux figures de même XIII.
ou de différentes especes :

5. Si le circuit de l'une est égal au circuit de l'autre, on les appelle *Isoperimetres*.

6. Si l'espace que comprend l'une est égal à l'espace que comprend l'autre , on les appelle *égales*. Ce qui appartient au Livre où l'on traitera des figures considérées selon l'*aire*. Et ce qu'il ne faut pas confondre , comme il a déjà été dit , avec celles qu'on appelle *tout-égales*.

DES FIGURES INSCRITES OU CIRCONSCRITES AU CERCLE.

DES INSCRITES.

ON dit qu'une figure rectiligne est *inscrite au Cercle* , quand les sommets de ses angles se trouvent dans la circonférence de ce Cercle. D'où il s'ensuit , XIV.

1. Que les angles de cette figure inscrite se doivent alors considérer comme des angles inscrits au Cercle, dont il a été dit dans le Livre IX.

2. Qu'ainsi les angles d'une figure inscrite ne sauroient être égaux , que quand les deux arcs que soutiennent les deux côtes de chaque angle sont égaux , pris ensemble , aux deux arcs que soutiennent

Q 2

les

les deux côtez de chaque autre angle : parce que chacun de ces angles a pour mesure la demi-circconférence , moins la moitié des deux arcs que soutiennent les côtez. IX. 19. D'où s'ensuit ce Théorème :

II. THEOREME.

XV. UNE figure inscrite au Cercle ne scauroit être équiangle , qu'elle ne soit équilatérale , ou absolument , ou alternativement ; & en ce dernier cas , il faut que le nombre de ses côtez soit pair.

Car afin que les angles d'une figure inscrite au Cercle , (qui sont des angles inscrits ,) soient tous égaux : il faut & il suffit que les deux arcs que soutiennent les côtez de chaque angle pris ensemble soient égaux aux arcs que soutiennent aussi les côtez de tout autre angle , comme il vient d'être dit.



Or cela est quand tous ces arcs sont égaux : ce qui arrive quand la figure est absolument équilatérale ; parce que tous les côtez étant égaux , tous les arcs qu'ils soutiennent le sont aussi.

Mais cela arrive encore quand ces arcs ne sont qu'alternativement égaux , pourveu qu'ils soient en nombre pair ; parce qu'alors la moitié de ces arcs étant petits & tous égaux entr'eux , & l'autre moitié étant plus grands & tous égaux aussi entr'eux , & ~~un petit arc~~ toujours suivi d'un grand : les deux arcs soutenus par les côtez d'un angle inscrit pris ensemble , seront toujours égaux à deux autres arcs soutenus par les côtez de tout autre angle. Et ainsi ces angles seront égaux. Or pour cela

cela il fuffit que les côtez de la figure foient alternativement égaux; parce qu'alors ils fôûtiendront des arcs alternativement égaux.

Mais il eft bien vifible qu'il faut en ce cas-là que le nombre des côtez foit pair. Car s'il étoit impair, comme de 9: il y auroit neceffairement deux côtez, fçavoir le 1.^{er} & le 9.^e qui feroient de fuite tous-deux grands, ou tous-deux petits; & ainfi l'angle compris entre le 1.^{er} & le 9.^e côté feroit ou plus grand, ou plus petit, que les autres.

Donc une figure infcrite en un Cercle ne fçauroit être équiangle, fi elle n'eft ou absolument équilatérale ou alternativement; & en ce dernier cas il faut que le nombre de fes côtez foit pair.

DES CIRCONSCRITES AU CERCLE.

ON dit qu'une figure eft *circonfcrite à un Cercle*, quand tous les côtez de la figure touchent le Cercle. Et de-là il s'enfuit, XVI.

1. Que les angles de la figure font des angles circonfcrits; & par conféquent il eft bon de les confiderer comme des angles compris entre deux tangentes, que l'on doit prendre comme fi chacune étoit terminée au point de l'attouchement. D'où il s'enfuit encore,

2. Que ces angles circonfcrits font toujours ifofceles; parce que les tangentes menées d'un même point font égales, VII. 39.

3. Que les angles circonfcrits font égaux, quand les tangentes de l'un font égales aux tangentes de l'autre. IX. 57.

4. Que chaque côté d'une figure circonfcrite eft composé de deux tangentes, qui viennent de deux différens angles.

Et de-là s'enfuit ce Theorème:

Q 3

III. THEO.


III. THEORÉME.

XVII. UNE figure circonscrite au Cercle ne sçauroit être équilaterale, qu'elle ne soit équiangle, ou absolument ou alternativement; & en ce dernier cas il faut que le nombre de ses angles soit pair.

Car afin qu'une figure circonscrite au Cercle soit équilaterale, il faut & il suffit que les deux tangentes dont est composé chaque côté de cette figure circonscrite prises ensemble, soient égales aux deux autres tangentes dont sera composé tout autre côté.

Or cela est quand toutes ces tangentes sont égales, ce qui arrive quand tous les angles de cette figure sont égaux; car alors toutes les tangentes sont égales aussi.

Mais cela arrive encore quand les angles de la figure ne sont qu'alternativement égaux, pourveu qu'ils soient en nombre pair, en sorte que la moitié des angles n'ait que deux petites tangentes, (ce qui fait néanmoins les plus grands angles,) & l'autre moitié deux plus grandes tangentes, & que toutes les petites soient égales entr'elles, & les grandes aussi, & qu'un petit angle soit toujours suivi d'un grand.



Car alors chaque côté sera composé d'une petite & d'une grande tangente, (parce que chaque côté, comme il a été dit, est composé de deux tangentes de deux différens angles.) Donc tous les côtés seront égaux.

Donc une figure circonscrite au Cercle ne peut être équilaterale, si elle n'est équiangle, ou absolument

lument ou alternativement ; & en ce dernier cas il faut que le nombre des angles soit pair. Ce qu'il falloit démontrer.

DES FIGURES REGULIERES.

Le meilleur moyen de bien concevoir les figures régulières, est de les considérer comme inscrites en un Cercle ; parce qu'elles peuvent toutes y être inscrites, selon ce Théorème ;

IV. THEOREME.

TOUTE figure régulière peut-être inscrite & circonscrite au Cercle ; parce qu'il y a toujours dans ces figures un point qui en est le centre, dont toutes les lignes menées à tous les angles, (qu'on appelle *rayons* ,) sont égales , & dont toutes les perpendiculaires menées au côté , (qu'on peut appeler *les rayons droits* ,) sont aussi égales entr'elles. XIX.

Soit une figure régulière de tant de côtés & d'angles que l'on voudra ; il suffira d'en considérer 4 ou 5 angles, dont j'appelleray les sommets *b, d, f, g, h*.

Si de *p* milieu du côté *bd*, & de *q* milieu du côté *bh*, on élève deux perpendiculaires, elles se rencontreront étant prolongées, par VI. 34.


Et le point *c* où elles se rencontrent sera le centre de la figure :

Car du point *c*, intervalle *cb*, décrivant une circonférence, elle passera par les points *b, d, f, g, h*. VII. 3.

Donc les trois rayons *cb, ch, & cd*, seront égaux.

Q 4

Donc



368 NOUVEAUX ELEMENS

Donc les 4 angles $c b b$, $c b b$, $c b d$, $c d b$, seront égaux, par VIII. 66.

Donc chacun de ces trois rayons $e b$, $c b$, $c d$, partage par la moitié l'angle de la figure.

Donc l'angle $c b g$, étant égal à l'angle $c b b$, $c g$ base de l'angle $c h g$, doit être égale à $c b$, base de l'angle $c b b$, par VIII. 67.

Donc ce 4.^e rayon $c g$ est égal aux trois autres.

Et il est clair que quand cette figure reguliere auroit cent mille angles, on prouveroit la même chose de toutes les lignes menées de c aux angles, qui sont les rayons.

Donc si de ce point c , & de l'intervalle d'un rayon, on décrit un Cercle, la figure sera inscrite en ce Cercle, puisque tous les rayons étant égaux, les sommets de tous les angles se trouveront dans la circonference de ce Cercle.

Et delà il s'ensuit que tous les côtez de cette figure seront des cordes égales du même Cercle.

Donc les perpendiculaires du centre aux côtez sont égales, par VII. 10.

Or ces perpendiculaires en font les rayons droits.

Donc si on décrit un autre Cercle de l'intervalle d'un rayon droit, c'est à dire d'une perpendiculaire à un côté: cette figure sera circonscrite à ce Cercle; puisque tous ces rayons droits étant égaux, il n'y aura aucun côté qui ne touche le Cercle.

COROLLAIRE.

x x.

Il est évident qu'il y a trois choses importantes dans chaque espece de figure reguliere.

La premiere, de combien de degrez est l'arc que

DE GEOMETRIE. Liv. XII. 369

que soutient le côté de la figure, que j'appelleray simplement *l'arc de la figure*.

La seconde, de combien de degrez est l'angle de la figure, c'est à dire l'angle compris entre les deux côtés de la figure.

La troisième, quel est aussi l'angle que fait un rayon sur un côté. C'est ce qui se verra par ces trois Problemes:

I. PROBLEME.

DETERMINER la grandeur de l'arc de toute XXI.
espece de figure reguliere.

La circonference étant divisée en 360 degrez, ou 21600 minutes, ou 1296000 secondes: si on divise ce nombre par celui des côtés de la figure, le quotient fera voir de combien de degrez, ou de minutes, ou de secondes, est l'arc de la figure.

Ainsi l'arc d'une figure de 15 côtés est de 24 degrez; parce que 15 divisant 360, le quotient est 24.

L'arc d'une figure de 3600 côtés est de 6 minutes; parce que 21600 minutes étant divisées par 3600, le quotient est 6.

II. PROBLEME.

DETERMINER la grandeur de l'angle de toute XXII.
espece de figure reguliere.

Ayant trouvé l'arc par le premier Probleme, ôter les degrez de cet arc de 180; qui est la demi-circonference; ce qui restera sera la mesure de l'angle de la figure.

Car tout angle d'une figure reguliere peut être considéré comme un angle isoscele inferit dans le Cercle, qui a pour mesure la demi-circonference, moins l'arc que soutient un de ses côtés. IX. 19.

Q 5

Et

370 NOUVEAUX ELEMENS

Et ainsi pour avoir la grandeur de l'angle d'une figure de 15 côtez, il ne faut qu'ôter de 180 les 24 degrez de l'arc que soutient le côté de cette figure; & ce qui restera, qui est 156, sera la mesure de l'angle d'une figure de 15 côtez.

Et pour avoir l'angle d'une figure de 3600 côtez, il faut ôter 6 minutes de 180 degrez, & ce qui restera, qui est 179 d. 54'. sera la mesure de l'angle de cette figure.

III. PROBLEME.

xxiii. DETERMINER la grandeur de l'angle que fait le rayon sur le côté de toute figure reguliere.

Il ne faut pour cela que prendre la moitié du nombre des degrez que vaut l'angle de la figure. Parce que tout rayon partage par la moitié l'angle de la figure.

Ainsi l'angle du rayon sur le côté dans une figure de 15 côtez, est de 78 degrez, qui est la moitié de 156. Et l'angle du rayon sur le côté d'une figure de 3600 côtez, est de 89. d. 57'.

CONSIDERATION SUR LE CERCLE.

xxiv. LES Geometres considerent souvent le Cercle comme un Polygone d'une infinité de côtez: & selon cela, voicy de quelle sorte on devroit marquer les trois choses que nous venons de determiner dans tout autre Polygone.

Puisque l'arc d'un Polygone regulier est d'autant plus petit, que le nombre de ses côtez est plus grand, & que le Polygone d'une infinité de côtez soit infiniment petit, & qu'ainsi il ne puisse être marqué que par un zero.

Or

DE GEOMETRIE. LIV. XII. 371

Or si l'on ôte zero de 180 degrez , il restera 180 pour l'angle de ce Polygone infini.

Et si l'on prend la moitié de 180 degrez , il viendra 90 degrez , (qui est la mesure d'un angle droit ,) pour l'angle du rayon sur le côté de ce Polygone infini.

Aussi il est vray que l'angle du rayon sur la circonference d'un Cercle est droit en sa maniere , puisque le rayon coupe perpendiculairement la circonference ; & que si cet angle est plus petit qu'un angle droit rectiligne , ce n'est que de l'espace qui est entre la circonference & la tangente , qui est plus petit que tout angle aigu ; quoy qu'il n'y ait point d'angle aigu qui ne puisse être divisé en une infinité de plus petits.

Et on peut dire aussi que tout point de la circonference est comme le sommet d'un angle de 180 degrez ; puis qu'étant partagé par le rayon en deux angles égaux , chacun de ses angles de part & d'autre est droit en sa maniere , & qu'ainsi chacun est de 90 degrez.

DES FIGURES REGULIERES COMPAREES ENSEMBLE.

V. THEOREME.

Les figures regulieres de même espece , c'est à dire d'autant de côtez , sont toujours semblables ; & les circuits sont en même raison que les côtez. xxv.

Car, par ce qui vient d'être dit , les angles des deux figures regulieres sont nécessairement égaux ; leur grandeur étant mesurée par les arcs des figures , & ces arcs l'étant par le nombre des côtez de la figure.

Q 6

Et

372 NOUVEAUX ELEMENS

Et pour ce qui est des côtez, ceux de chaque figure étant égaux, on peut appeler les uns *b*, & les autres *c*.

Or il est bien clair que $b. c. :: b. c.$

Et il est clair aussi que *b* est à *c*, comme 10 *b* à 10 *c*, ou 100 *b* à 100 *c*, ou 1000 *b* à 1000 *c*. (Il. 15.)

Donc les circuits ne sçauroient manquer d'être en même raison que les côtez,

VI. THEOREME.

XXVI. DEUX figures regulieres étant de même espece, ces 4 choses de l'une, *rayon*, *rayon droit*, *côté*, *circuit*, sont en même raison avec ces 4 autres mêmes choses de l'autre : c'est à dire que le rayon de l'une est au rayon de l'autre, comme le rayon droit au rayon droit, le côté au côté, le circuit au circuit.

Ces deux derniers viennent d'être prouvez ; mais ils ne laisseront pas d'entrer dans la preuve générale des autres.

Il ne faut pour cela que considerer dans chacune de ces figures un angle compris entre un rayon, & un rayon droit, qui a pour base la moitié du côté.

Ces deux angles sont semblables en toutes les figures regulieres de même espece ; c'est à dire que l'angle est égal à l'angle, & que les angles sur la base de l'un sont égaux aux angles sur la base de l'autre.

Car chacun de ces angles a pour mesure la moitié de l'arc de la figure, puisque la base est la moitié du côté. Or dans toutes les figures de même espece, l'arc est à l'autant de degrez qu'en l'autre.

Pour les angles sur chacune des bases, cela est encore plus clair, puisque l'un est droit en l'un &

DE GEOMETRIE. LIV. XII. 373

en l'autre, sçavoir celui qui est fait par le rayon droit; & que l'autre est la moitié de l'angle de la figure, qui est égal en toutes les figures de même espèce.

Or puisque ces angles sont semblables, les côtez sont proportionels aux côtez, & la base à la base. (X. 18.) C'est à dire que

Le rayon est au rayon, comme le rayon droit au rayon droit, & la moitié du côté à la moitié du côté, & par conséquent comme le côté au côté, & le circuit au circuit.

I. COROLLAIRE.

Les côtez & les circuits de deux figures régulières de même espèce sont en même raison, que les diametres des Cercles dans lesquels elles sont inscrites. XXVII.

Car ces diametres sont le double des rayons de ces figures. Donc &c.

II. COROLLAIRE.

Les circonferences des Cercles sont en même raison que leurs diametres. XXVIII.

Car les Cercles sont comme des Polygones d'une infinité de côtez; & leur circonferance est comme le circuit comprenant cette infinité de côtez. Donc, par le precedent Corollaire, ce circuit d'une infinité de côtez d'une part, est au circuit d'une infinité de côtez de l'autre, comme le diametre au diametre.

C'est la seule voye dont on peut prouver la proportion des circonferences & des diametres. Car n'y en ayant point pour le faire directement & immédiatement, on se réduit à y employer l'analogie des Polygones semblables d'un si grand nombre de côtez que l'on voudra, qu'on peut concevoir être inscrits dans l'un & l'autre Cercle:

Q 7

comme

374 NOUVEAUX ELEMENS

comme de cent mille côtez, de cent millions, de cent mille millions, & ainsi jusqu'à l'infini.

Car plus ces Polygones ont de côtez, moins il y a de difference entre la circonference du Cercle & leur circuit, VII. 23. Et ainsi quelque petite que soit une ligne donnée, quand cent seroit que la cent milliême partie de l'épaisseur d'une feuille de papier; on peut concevoir un Polygone de tant de côtez inscrit dans l'un & dans l'autre Cercle, que la difference de son circuit d'avec la circonference de ces Cercles sera moindre que cette ligne donnée.

Or de quelque grand nombre de côtez que soient ces Polygones, leurs circuits seront toujours en même raison que les diametres, par le Corollaire precedent.

Donc on doit conclure par une analogie très-certaine, que les circonférences sont aussi en même raison que les diametres.

III. COROLLAIRE.

XXIX. Si deux figures regulieres de même espece ont de l'égalité en l'une de ces quatre choses, rayon, rayon droit, côté, circuit: elles l'ont en tout, & sont tout-égales.

C'est une suite évidente du sixième Theorème, 26. *Sup.*

IV. COROLLAIRE.

XXX. L'UNE de ces quatre choses étant donnée, la grandeur de la figure reguliere est determinée: c'est à dire qu'elle ne peut être que d'une sorte, quoy qu'il soit toujours facile de la décrire; que souvent il est aisé ou de trouver le côté d'une figure reguliere en ayant le rayon, ce qui est la même chose que de l'inscrire en un Cercle donné: ou d'en trouver le rayon en ayant le

le côté, ce qui est la même chose que de trouver le Cercle dans lequel une figure dont le côté est donné puisse être inscrite. C'est dequoy nous allons traiter.

DE L'INSCRIPTION OU CIRCONSCRIPTION

*d'une figure reguliere, de telle espeece
qu'on voudra, dans un Cercle
donné.*

IL est bien facile par ce qui a été dit, une figure reguliere étant décrite, d'en trouver le rayon pour l'inscrire dans un Cercle : mais il n'est pas aussi facile d'inscrire dans un Cercle donné, telle figure reguliere que l'on voudra. Et souvent mêmes on ne le peut que mechaniquement, & non Geometriquement, au moins par la Geometrie ordinaire ; parce qu'elle ne donne pas le moyen de diviser un arc donné, en 3, en 5, en 7 &c. ce qui seroit souvent necessaire pour inscrire en un Cercle donné telle figure que l'on voudroit. XXXI.

Ainsi je pense que tout ce que l'on peut faire de mieux se réduit à ces deux regles generales, & à quelques Problemes particuliers :

PREMIERE REGLE GENERALE.

LORSQU'ON sçait inscrire en un Cercle donné une certaine espeece de figure reguliere : il est bien facile d'inscrire toutes les autres qui ont le même nombre de côtez, selon la progression double. XXXII.

C'est à dire qui en ont deux fois moins, 4 fois moins, 8 fois moins &c. jusques à ce qu'on soit ar-

376 NOUVEAUX ELEMENS

arrivé ou à 4, ou à un nombre impair, qui ne se puisse plus diviser par la moitié.

Ou qui en ont deux fois plus, 4 fois plus, 8 fois plus &c. jusqu'à l'infini.

Supposons, par exemple, qu'on sçache inscrire dans un Cercle donné une figure de 32 côtés. La corde qui soutiendra deux arcs de cette figure, sera le côté d'une figure de 16. Et celle qui soutiendra deux arcs de la figure de 16 côtés, sera le côté d'une figure de 8. Et ainsi de suite.

Et au contraire la corde qui soutiendra la moitié de l'arc de cette figure de 32 côtés, sera le côté d'une figure de 64. Et celle qui soutiendra la moitié de l'arc d'une figure de 64 côtés, sera le côté d'une figure de 128 côtés. Et ainsi à l'infini.

SECONDE REGLE GENERALE.

XXXIII. Lorsque l'on sçait inscrire une certaine espèce de figure régulière en un Cercle donné, on la sçait aussi circoncrire.

Car ayant les points de tous les sommets des angles de l'inscrite, les tangentes au Cercle à ces mêmes points étant prolongées jusques à ce qu'elles se rencontrent, font une figure semblable circonscrite au même Cercle; puisque d'une part tous les angles circonscrits de cette figure sont égaux, étant appuyez sur des arcs convexes égaux; & que de l'autre chacun de ces angles est égal à l'angle de la figure inscrite. IX. 53 & 54.

PROBLEMES PARTICULIERS.

I. PROBLEME.

INSCRIRE un Quadrilatere regulier (qui xxxiv.
s'appelle *Quarré*) dans un Cercle donné.

Deux diametres qui se coupent perpendiculairement, partagent la circonference en 4 parties, dont chacune est l'arc du *Quarré* inscrit dans le Cercle.

COROLLAIRE.

INCRIRE dans un Cercle donné une figure xxxv.
de 8 côtez, de 16, de 32; & ainsi a l'infini.
1.^{re} Regle generale.

II. PROBLEME.

INSCRIRE en un Cercle donné un Hexagone xxxvi.
ne regulier.

Le demi diametre ou rayon est le côté de l'Hexagone. Car ayant fait un angle compris par deux rayons, & ayant pour base une ligne égale au rayon: cet angle est de 60 degrez, puisqu'il est égal à chacun des angles sur la base, & que les trois ensemble valent 180 degrez. (VIII. 62.) Donc chacun est de 60 degrez. Or 60 degrez est l'arc de l'Hexagone. Donc le demi diametre est le côté de l'Hexagone.



I. Co-

I. COROLLAIRE.

XXXVII. INSCRIRE en un Cercle donné un Triangle regulier.

Doubler l'arc de l'Hexagone , par la 1.^{re} Regle generale.

II. COROLLAIRE.

XXXVIII. INSCRIRE en un Cercle donné une figure de 12. côtez , de 24 , de 48 ; & ainsi à l'infini. 1.^{re} Regle generale.

III. PROBLEME.

XXXIX. INSCRIRE en un Cercle donné un Decagone , ou figure de dix côtez.

Ayant divisé le demy diametre en moyenne & extreme raison , (par XI. 62.) la plus grande partie de cette ligne ainsi divisée est le côté du Decagone. Car elle soutient un arc de 36 degrez , par XI. 68.

I. COROLLAIRE.

XL. INSCRIRE en un Cercle donné un Pentagone ou figure de cinq côtez.

Doubler l'arc du Decagone , par la 1.^{re} Regle generale.

II. COROLLAIRE.

XLI. INSCRIRE en un Cercle donné une figure de 20 côtez , de 40 , de 80 ; & ainsi à l'infini. 1.^{re} Regle generale.

IV. PROBLEME.

XLII. INSCRIRE en un Cercle donné une figure de 15 côtez. De

DE GEOMETRIE. Liv. XII. 379

De l'arc de l'Hexagone, qui est de 60 degrez,
ôter l'arc du Decagone, qui est de 36: il restera
un arc de 24 degrez, qui est l'arc d'une figure de
15 côtez; parce que 24 fois 15 font 360.

COROLLAIRE.

INSCRIRE en un Cercle donné une figure de XLIII.
30 côtez, de 60, de 120; & ainsi à l'infini.
I.^{re} Regle generale.




NOU-



NOUVEAUX ELEMENS
DE
GEOMETRIE.
LIVRE TRE'ZIE'ME.

DES TRIANGLES
ET QUADRILATERES
CONSIDEREZ SELON
LEURS CÔTEZ
ET LEURS ANGLES.

 PRE'S ce qui a été dit des figures en
general, il ne reste plus que d'expli-
quer particulier aux Trian-
gles, & aux Quadrilateres.

PRE-

PREMIERE SECTION.

Des Triangles.

I. LEMME.

UN Angle avec sa base, est la même chose qu'un Triangle. Et ainsi tout ce qui a été dit dans les Livres des Angles, des Proportionnelles, des Reciproques, & des Angles considerez avec leur base, se peut sans peine appliquer aux Triangles.

I.

II. LEMME.

TOUT Triangle se peut inscrire en un Cercle. Car il ne faut que trouver la circonference qui passe par les trois sommets des trois angles, par VII. 4.

II.

III. LEMME.

DEFINITION.

Le côté quelconque d'un Triangle en peut être appelé *la base*; & les deux autres, *ses côtés*: & alors l'angle soutenu par la base est appelé *l'angle du sommet*; & la distance de ce sommet à la base est appelée *la hauteur du Triangle*.

III.

TRIANGLES
CONSIDEREZ 'A PART.

I. LEMME.

TOUT Triangle a ses trois angles égaux à deux droits. VIII. 6a.

I. Co.

I. COROLLAIRE.

- v. Tous les trois angles d'un Triangle peuvent être aigus; mais il n'y en peut avoir qu'un droit ou obtus.

II. COROLLAIRE.

- vi. Si l'un des angles d'un Triangle est droit, les deux autres valent un droit.

III. COROLLAIRE.

- vii. Qui connoît la grandeur de deux angles d'un Triangle, connoît la grandeur du 3.^e Car ôtant de la demy-circonference les deux dont on connoît la grandeur, ce qui reste est la grandeur du 3.^e.
 Qui connoît de combien de degrez font les deux, sçait de combien de degrez est le 3.^e Car ôtant de 180 le nombre des degrez que valent les deux, ce qui reste est le nombre des degrez que vaut le 3.^e
 Si les deux valent 108 degrez, le 3.^e en vaut 72.

II. THEOREME.

- viii. EN tout Triangle le plus grand côté soutient le plus grand angle, & le plus grand angle est soutenu par le plus grand côté. Car par le 2.^e Lemme, tout Triangle peut être inscrit dans un Cercle, & alors la circonference du Cercle est partagée en trois arcs, sur chacun desquels est apuyé chacun des angles du Triangle.

Or ces trois arcs sont :

1.^{er} CAS. Ou tous-trois moindres que la demy-cir-

conférence; & alors

l'un des angles du Triangle est aigu. (IX. 26.) Et il est clair que le plus grand an-



gle

DE GEOMETRIE. Liv. XIII. 383

gle étant apuyé sur le plus grand arc, est aussi soutenu par le plus grand côté. VII. 11.

2.^e CAS. Ou l'un de ces arcs est une demy-circonférence, & les autres moindres; & alors l'angle apuyé sur la demy-circonférence est droit, (IX. 26.) & par conséquent le plus grand de tous; comme aussi le côté qui le soutient, qui est un diamètre, est plus grand qu'aucun des deux autres. VII. 10.



3.^e CAS. Ou l'un de ces arcs est plus grand que la demy-circonférence; & alors l'angle appuyé sur cet arc est obtus, (IX. 26.) & par conséquent le plus grand de tous: comme aussi le côté qui le soutient terminant le segment dans lequel est cet angle obtus, est plus près du centre qu'aucun des deux côtés qui le comprennent, & ainsi plus grand. VII. 10.

I. COROLLAIRE.

Tous les côtés d'un Triangle étant égaux, tous les angles le sont aussi: & au contraire tous les angles étant égaux, les côtés le sont aussi.

IX.

Car étant inscrit dans un Cercle, les côtés égaux soutiennent des arcs égaux. (V. 26.) Or les angles apuyés sur des arcs égaux, sont égaux. IX. 20.

Que si au contraire on supposoit les trois angles égaux; on prouveroit de même que les côtés sont égaux. Car les angles égaux sont apuyés sur des arcs égaux. IX. 20.. Or les arcs égaux sont soutenus par des côtés égaux. V. 26.

II. Co-

IL COROLLAIRE.

- X. EN tout Triangle qui a deux côtes égaux, les deux angles soutenus par ces côtes égaux sont aussi égaux; & au contraire. En circonscrivant ce Triangle dans le Cercle, on prouvera ce Corollaire de la même sorte que le précédent.


On laisse à trouver beaucoup d'autres manieres dont on le peut demontrer.

III. THEOREME.

- XI. LES lignes qui divisent par la moitié chacun des angles d'un Triangle, se rencontrent en un même point au dedans du Triangle.

Soit le Triangle bcd .

Soit l'angle d divisé par la moitié par dq , & c divisé par la moitié par cp , & que dq & cp se coupent en r ; je dis que la ligne br divisera aussi l'angle b par la moitié.



Car (par X. 32.) l'angle d étant divisé par la moitié,

$$db. bq. :: dc. cq.$$

Et par la même raison considerant dq comme la base de l'angle c divisé par la moitié par cr :

$$cd. cq. :: dr. qr.$$

Donc $db. bq. :: dr. qr.$ (II. 26.)

Donc (par X. 33.) la ligne br divise l'angle b par la moitié. Ce qu'il falloit demontrer.

COROLLAIRE.

Les lignes coupant par la moitié les angles d'un Triangle font plusieurs proportions. On les peut reduire à 9, en commençant la comparaison par les portions des secantes.

Pour

DE GEOMETRIE. LIV. XIII. 385

Pour l'angle *b*.

$$br. rs. :: \begin{cases} bd. ds. \\ bc. cs. \end{cases}$$

Donc $bd. ds. :: bc. cs.$

Pour l'angle *c*.

$$cr. rp. :: \begin{cases} cd. dp. \\ cb. bp. \end{cases}$$

Donc $cd. dp. :: cb. bp.$

Pour l'angle *d*.

$$dr. rq. :: \begin{cases} db. bq. \\ dc. cq. \end{cases}$$

Donc $db. bq. :: dc. cq.$

I. PROBLEME.

XI.

FAIRE un Triangle de trois lignes données. Il faut que deux quelconques prises ensemble soient plus grandes que la 3.^e

De chacune des deux extrémités de l'une des données décrire un Cercle de l'intervalle de chacune des deux autres ; où ces deux Cercles se rencontreront , ce sera le point où il faudra tirer les deux côtés du Triangle :



II. PROBLEME.

XII.

FAIRE le Triangle dont on a un angle , & la grandeur des côtés qui le comprennent.

Ayant mis ces deux côtés en sorte qu'ils fassent l'angle donné : la ligne qui en joindra les extrémités achevera le Triangle.

R.

III. Pre-

III. PROBLEME.

XIV. FAIRE le Triangle dont on a un côté, & les deux angles sur ce côté.

Tirant des lignes sur les extrémités du côté donné qui fassent les angles donnez : où elles se rencontreront elles acheveront le Triangle.




IV. PROBLEME.

XV. FAIRE le Triangle dont on a un angle, un des côtés qui le comprennent, & la grandeur du côté qui le soutient.

Soit bc le côté donné comprenant l'angle donné, & cd la grandeur du côté qui doit soutenir l'angle donné. Tirant de b une ligne indéfinie qui fasse sur bc l'angle donné, & décrivant un Cercle de c , intervalle cd :

1.^{er} CAS. Ou ce Cercle ne coupera l'indéfinie qu'au point d ; ce qui arrivera toujours quand le côté qui doit soutenir l'angle donné est plus grand que celui qui le comprend: & alors le Triangle sera bcd .



2.^e CAS. Ou le Cercle coupera l'indéfinie en deux parts, comme en f & en d , & alors le Triangle pourra être bcd , ou bcf .

Et pour sçavoir lequel des deux c'est précisément: il faudroit avoir déterminé si bc doit soutenir

DE GEOMETRIE. Liv. XIII. 387

tenir un angle aigu , ou s'il doit soutenir un angle obtus.

Car si $b e$ doit soutenir un angle aigu , le Triangle est $b e d$; & s'il doit soutenir un angle obtus , le Triangle est $b e f$.

TRIANGLES COMPAREZ.

I. THEOREME.

DEUX Triangles sont tout-égaux , quand les xvi.
côtés de l'un sont égaux aux côtés de l'autre ,
chacun à chacun. Car alors les angles de l'un
sont aussi égaux aux angles de l'autre , par
VIII. 66.

II. THEOREME.

DEUX Triangles sont tout-égaux quand ils ont xvii.
un angle égal , & que les côtés qui comprennent
dans l'un cet angle égal , sont égaux à ceux qui le
compréhendent dans l'autre , chacun à chacun.
Car alors la base est aussi égale à la base , par
VIII. 67.

III. THEOREME.

DEUX Triangles sont tout-égaux quand ils ont xviii.
un côté égal , & que les angles sur ce côté égal
sont égaux chacun à chacun.

Car ces deux angles étant égaux chacun à chacun , le troisième qui est celui que soutient le côté égal , sera égal aussi. (VIII. 64.)

Si donc l'on s'imagine que ces deux Triangles
sont inscrits chacun dans un Cercle , ils
seront égaux , (par X. 27.) parce que le côté égal
soutiendra dans ces deux Cercles des arcs d'autant
de degrez.

R 2

Donc

388 NOUVEAUX ELEMENS

Donc les deux autres angles étant égaux chacun à chacun, seront appuyez sur des arcs égaux; qui étant de Cercles égaux, seront soutenus par des côtes égaux chacun à chacun. V. 26.

Donc les trois côtes de ces deux Triangles sont égaux chacun à chacun, aussi bien que les angles. Donc ils sont tout-égaux.

IV. THEOREME.



XIX.

Si deux Triangles ont ces trois choses égales,
Un angle, comme celui dont le sommet est en b .

Un des côtes qui comprennent cet angle, comme bc .

Et le côté qui le soutient, comme cd , ou cf :

Il faut outre cela afin qu'ils soient tout-égaux, ou que l'angle que soutient bc , ne soit obtus ny dans l'un ny dans l'autre, ou qu'il soit obtus dans tous-les deux.

Car supposant qu'on eût mené par e une parallèle à bd :

Ces deux Triangles seroient enfermez entre deux espaces paralleles égaux (par VIII. 58.) parce que bc est égale & fait le même angle cbd dans l'un & dans l'autre.

Donc le côté cd , ou cf , étant égal par l'hypothese, les deux Triangles : s'il est oblique dans tous-les deux vers le même endroit, il fait le même angle aigu dans l'un & dans l'autre, lorsque c'est vers le dedans du Triangle qu'il est incliné, comme quand c'est cd en l'un & en l'autre ;

ou

DE GEOMETRIE. LIV. XIII. 389

ou le même angle obtus , quand c'est vers le dehors , comme si c'est $e f$ en l'un & en l'autre. VIII. 55.

Donc les deux Triangles qui avoient déjà deux côtez égaux par l'hypothèse , se trouvant encore avoir deux angles égaux , & par conséquent trois , (VIII. 64.) seront tout-égaux par le 2.^e Theorème.

Mais si le côté qui soutient l'Angle b étoit diversement incliné dans ces deux Triangles , comme si c'étoit $e d$ dans l'un & $e f$ dans l'autre : ces Triangles n'auroient garde d'être tout-égaux ; puisque $e d$ feroit dans l'un un angle aigu , & $e f$ dans l'autre un angle obtus.

COROLLAIRE.

Dans l'hypothèse du précédent Theorème , lorsque des deux côtez supposez égaux dans les deux Triangles , celui qui soutient l'angle supposé égal est plus grand que celui qui le comprend , les deux Triangles sont certainement tout-égaux.

Car alors dans l'un & dans l'autre , l'angle $e d b$ est nécessairement aigu , par 8. S.

V. THEOREME.

Deux Triangles équiangles entr'eux sont semblables. C'est à dire que les côtez de l'un sont proportionels aux côtez de l'autre. C'est ce qui a été prouvé en diverses manieres dans les deux Livres des Proportionelles. Voyez X. 18. xxi

AVERTISSEMENT ET DEFI

EN comparant deux Triangles semblables , il faut toujours comparer le plus grand côté de l'un au plus grand côté de l'autre , le moyen au moyen

R 3

390 NOUVEAUX ELEMENS

moyen, & le plus petit au plus petit. Ainsi en deux Triangles semblables le plus grand côté étant appelé $b. b.$

Le moyen $d. d.$

Et le plus petit $h. h.$

$$b. b. :: d. d. :: h. h.$$

Et ces côtez que l'on doit comparer ensemble s'appellent *homologues*.

I. COROLLAIRE.

- XXII. Les côtez qui soutiennent les angles égaux, sont homologues. Car dans l'un & dans l'autre le plus grand côté soutient le plus grand angle, le moyen côté le moyen angle; le plus petit côté le plus petit angle. Cela se prouve encore par X. 18.

II. COROLLAIRE.

- XXIII. Deux Triangles sont équiangles, si deux angles de l'un sont égaux à deux angles de l'autre, chacun à chacun. Car il s'ensuit de-là que le 3.^e est aussi égal au 3.^e.

VI. THEOREME.

- XXIV. Lorsque deux Triangles ont un angle égal, & les côtez qui comprennent ces angles, proportionnels, ils sont semblables. Car alors la base est aussi proportionnelle à la base, & les deux angles sur cette base égaux, par XI. 57.

VII. THEOREME.

XXV. Si deux Triangles ont de même hauteur, les côtez opposés à la base également distantes de la base dans l'un & dans l'autre sont entr'elles comme ces bases.


Cela est démontré X. 20.

VIII. THEO-

VIII. THEOREME.

XXVI.

DEUX Polygones quelconques étant semblables, peuvent être partagés chacun en autant de Triangles



l'un que l'autre; qui seront tels; que ceux d'une part sont semblables à ceux de l'autre part, chacun à chacun; & les côtes homologues de deux de ces Triangles semblables, sont en même raison que ceux de deux autres semblables.

Soient deux Hexagones irreguliers semblables $BCDFGH$, & $bcdfgh$. Soient menées dans le grand des lignes de B à D , à F , à G . Et de même dans le petit.

L'un & l'autre Hexagone sera partagé en 4 Triangles,

Sçavoir $\left\{ \begin{array}{l} BCD. BDF. BFG. BGH. \\ bcd. bdf. bfg. bgh. \end{array} \right.$

Qui sont semblables deux à deux, BCD à bcd &c.

Car les angles C & c sont égaux, par l'hypothèse que les Hexagones sont semblables; & les côtes CB & CD sont proportionels aux côtes cb & cd , par la même hypothèse.

Donc les bases BD & bd sont aussi proportionelles aux côtes; & les Triangles sont semblables, par le 6.^e Theoreme.

BDF & bdf sont semblables. Car les angles CDF & cdf sont égaux par l'hypothèse, si on en ôte les angles BCD & bcd qui sont égaux aussi, (comme on le vient de voir:) les angles BDF & bdf demeureront égaux.

R 4

Or

392 NOUVEAUX ELEMENS

Or les côtez de ces angles BD & DF d'une part, & bd & df de l'autre, sont proportionels. Donc les bases BF & bf sont proportionelles aux côtez, & les Triangles $BD F$ & $bd f$ semblables. On prouvera la même chose, & de la même manière, des autres Triangles. Donc les Triangles d'une part sont semblables à ceux de l'autre.

Il reste à prouver que les côtez homologues de deux de ces Triangles semblables sont en même raison que ceux de deux autres semblables; ce qui est aisé. Car prenant dans les deux Hexagones les points B & b pour sommet commun des quatre Triangles: ils auront chacun pour base un des côtez de l'Hexagone: les deux premiers CD & cd , les deux seconds DF & df &c.

Or par l'hypothese $CD.cd::DF.df$.

Donc les bases des deux premiers Triangles sont proportionelles aux bases des deux seconds. Et ainsi des autres.

AVERTISSEMENT.

XXVII. On omet diverses choses qui pourroient être dites des Triangles semblables; parce qu'il n'y a rien en tout cela qui ne se trouve facilement par ce qui a été dit des Angles considerez avec leurs bases dans les deux Livres des Proportionelles.

DIVISION DU TRIANGLE EN SES ESPECES.

XXVIII. Le Triangle se divise selon ses côtez & selon ses angles. Si donc

Les cô-	} elle	il s'ap-	Scalène.
tez sont			
Deux égaux,			
Tous-trois égaux,	Equilateral.	Les	

DE GEOMETRIE. LIV. XIII. 393

Les angles font { Tous-trois aigus, Oxygone
 { Deux aigus & { obtus, Amblygone.
 & l'autre { droit, Rectangle.

Le Scaléne à ses trois angles inégaux.

L'Isoscèle en a deux égaux.

L'Equilateral les a tous-trois égaux.

Le Scaléne } peuvent être { Oxygone.
 L'Isoscèle } { Amblygone.
 L'Equilateral ne sçauroit être qu'Oxygone.

DES TRIANGLES OXYGONES.

THEOREME.

Si de tous les angles d'un Triangle Oxygone on tire des perpendiculaires aux côtez, elles se couperont en un même point au dedans du Triangle.

Soit le Triangle bcd , & deux perpendiculaires aux côtez dm , cn ; je dis que bp menée par le point o , qui est celui où dm & cn se coupent, sera aussi perpendiculaire à cd .

Car les Triangles cbo & dbm sont équiangles, ayant chacun un angle droit & un angle commun; & par conséquent les angles bcn & bdm sont égaux.


Et par conséquent aussi les Triangles bdm & com sont équiangles, ayant chacun un angle droit, & l'angle mco qui est égal à l'angle bam .

Donc $dm : mc :: mb : mo$; & *alternando*, $dm : mb :: mc : mo$.

R 5

Donc

XXIX.



394 NOUVEAUX ELEMENS

Donc les Triangles bmo & dmc sont semblables, par 24. *sup.* puisque dans le Triangle dmc les côtez dm & mc , qui comprennent un angle droit, sont proportionels à mb & mo qui comprennent aussi un angle droit.

Donc l'angle mbo soutenu par mo , est égal à l'angle mdc soutenu par mc .

Or les angles mob & pod sont égaux, parce qu'ils sont opposés au sommet. Donc les Triangles mob & pod sont équiangles.

Or l'angle omb est droit, par la construction.

Donc l'angle opd est droit aussi. Ce qu'il falloit demontrer.

COROLLAIRE.

xxx. CES perpendiculaires coupant les angles d'un Triangle, font 12 Triangles rectangles: 6 grands, qui ont pour hypotenuse l'un des côtez du Triangle total, & qui enferment tous quelque chose les uns des autres: & 6 petits entierement separez, & qui ont chacun pour hypotenuse la portion d'une perpendiculaire la plus proche de l'angle qu'elle coupe; & ces 12 Triangles rectangles sont équiangles 4 à 4, deux grands & deux petits. C'est un exercice d'Esprit de les trouver, & il vaut mieux le laisser à ceux qui commencent. Je diray seulement qu'entre les diverses proportions qui se font par tous ces Triangles, il y en a de deux sortes fort considerables.

La premiere est, que l'un des côtez d'un angle & sa premiere portion sont reciproques à l'autre côté & sa premiere portion; c'est à dire que le grand côté est au petit, comme la premiere

portion du grand.
 grand. petit. :: 1.^{re} port. du petit. 1.^{re} port. du grand.
 $bd. \quad bc. :: \quad bm. \quad bn.$

La

La seconde est, que les portions d'un côté du Triangle total sont reciproques à la perpendiculaire entiere, & la portion qui fait l'angle droit; c'est à dire qu'une portion du côté est à la perpendiculaire, comme la portion de la perpendiculaire qui fait l'angle droit, est à l'autre portion du côté. Exemple:

port. du côté. perp. :: port. de la perp. port. du côté.

$m c. m d. :: m a m b.$

DES TRIANGLES RECTANGLES.

THEOREME.

Si l'un des angles aigus d'un Triangle rectangle xxxi.
est double de l'autre, (ce qui ne peut être qu'il ne vaille les deux-tiers d'un angle droit, & l'autre le tiers, c'est à dire qu'il ne soit de 60 degrez, & l'autre de 30 :) le petit côté qui soutient l'angle de 30 degrez & qui en est le sinus, est la moitié de l'hypotenuse de l'angle droit, qui est aussi le rayon de cet angle de 30 degrez.

Soit le Triangle $b d c$ conforme à l'hypothese.

Tirant $d f$ égale à $d b$ sur $b c$ prolongée, l'angle $d f b$ sera égal à l'angle $d b f$, (10. sup.) & par conséquent l'un & l'autre sera de 60 degrez. Donc l'angle $b d f$ sera aussi de 60 degrez, puisque tous les trois ensemble valent deux droits, c'est à dire 180 degrez. (4. sup.)

Donc le Triangle $b d f$ est eq.
(9. sup.)

Donc $b c + c f = d b.$

R 6

Or



396 NOUVEAUX ELEMENS

Or $b c = e f$, les deux Triangles $d b c$ & $d e f$ étant tout-égaux, par 18. *sup.*

Donc $b c$ est la moitié de $d b$. Ce qu'il falloit démontrer.

PROBLEME.

- XXXII. TROUVER le Triangle rectangle dont on a
1. Ou les deux côtez comprenans l'angle droit.
 2. Ou l'hypotenuse, & un des côtez.
 3. Ou l'hypotenuse, & la perpendiculaire du sommet de l'angle droit à cette hypotenuse.
 4. Ou l'hypotenuse, & la moyenne proportionnelle entre l'hypotenuse donnée & un des côtez.
 5. Ou l'un des côtez, & la moyenne proportionnelle entre le côté donné & l'hypotenuse.
 6. Ou l'un des côtez, & la moyenne proportionnelle entre ce côté donné & l'autre côté.

PREMIER CAS.

Mettant en angle droit les deux côtez donnez : la ligne qui en joint les extremittez est l'hypotenuse.

SECOND CAS.

Décrivant la demy-circonference dont l'hypotenuse donnée est le diametre : le point de cette demy-circonference où se terminera le côté donné, sera le point du sommet de l'angle droit ; ce qui determinera l'autre côté non donné. (IX. 26.)

TROISIEME CAS.

Voyez IX. 35.

QUA-

QUATRIÈME, CINQUIÈME
ET SIXIÈME CAS.

Trois lignes étant continuellement proportionnelles, ayant la première & la seconde, qui est la moyenne, on a la 3.^e par X. 36. Et par conséquent le 4.^e & le 5.^e Cas se rapportent au 2.^e & le 6.^e au 1.^{er}

DES TRIANGLES
ISOSCELES.


I. THEORÈME

LORSQUE l'angle du sommet d'un Triangle **XXXIII.** Isoscele est de 36 degrez, chacun des angles sur la base est de 72; & la base est moyenne proportionnelle entre le côté entier, & le côté moins cette base, (c'est à dire que la base divise le côté en moyenne & extreme raison,) & la base étant ajoutée au côté, il s'en fait une ligne divisée en moyenne & extreme raison. Voyez XI. 68. 69. 63.

II. THEORÈME.

DEUX Triangles Isosceles étant semblables & in- **XXXIV.** égaux, si la même ligne est la base de l'un & le côté de l'autre : cette ligne sera moyenne proportionnelle entre le côté du Triangle dont elle est base, & la base de celui dont elle est côté.

Soit l'un des Triangles Isosceles $b c d$, & l'autre $f d$, de sorte que $c d$ soit la base de $b c d$, & le



398 NOUVEAUX ELEMENTS

le côté de efd . Je dis que ed sera moyenne proportionnelle entre be côté du premier Triangle, & fd base du second. Car ces Triangles étant semblables, be (côté du 1.^{er}) est à ed (côté du 2.^e) comme le même ed entant que base du premier, est à fd base du second. (X. 18.)

Donc $\frac{be}{ed} = \frac{ed}{fd}$. Ce qu'il falloit démontrer.

SECONDE SECTION.

Des Quadrilateres.

DEFINITIONS.

XXXV. LE Quadrilatere est une figure de 4 côtez qui ne se joignent qu'aux extremités : & par consequent de 4 angles qui tous ensemble valent quatre droits. XII. 9.

Les côtez qui comprennent un même angle s'appellent *côtez angulaires*.

Ceux qui ne comprennent point le même angle, *côtez opposés*.

Les angles de même sont *proches* ou *opposés*.

THEOREME.

XXXVI. TOUT Quadrilatere qui a les angles opposés égaux à deux droits, peut être inferit au Cercle, & nul autre n'y peut être inferit.

Soit le Quadrilatere $bcdf$, dont les angles b & d soient égaux à deux droits, & par consequent aussi les angles c & f .

Soit trouvé le Cercle dont la circonférence passe par les points $f b c$. par VI. 4. Je dis qu'elle passera aussi par le 4.^e qui est d .



Car

DE GEOMETRIE. LIV. XIII. 399

Car tout angle qui a fc pour base, & qui est inscrit dans ce Cercle du côté de d , comme fgc , plus l'angle b , vaut deux droits, IX. 28. Donc l'angle fgc est égal à l'angle d , qui avec l'angle b , vaut aussi deux droits, par l'hypothèse. Donc l'angle d est aussi inscrit dans ce Cercle par IX. 31.

DIVISION ET DEFINITIONS.

LORSQUE les côtez oppozés d'un Quadrilatere **XXXVII.** re sont paralleles, le 1.^{er} au 3.^e & le 2.^e au 4.^e on l'appelle *Parallelogramme*; sinon on l'appelle *Trapeze*, quand même deux des côtez oppozés, comme le 1.^{er} & le 3.^e seroient paralleles, si le 2.^e & le 4.^e ne le sont pas.

DES PARALLELO-GRAMMES.

I. THEOREME.

SI les côtez oppozés d'un Quadrilatere sont **XXXVIII.** égaux, ils sont paralleles; & s'ils sont paralleles, ils sont égaux. VI. 26 & 27.

II. THEOREME.

SI tous les 4 angles d'un Quadrilatere sont **XXXIX.** droits, il est Parallelogramme. VI. 13.

III. THEOREME.


SI deux côtez oppozés d'un Quadrilatere sont **XI.** égaux & paralleles, les deux autres sont aussi égaux & paralleles. VI. 28.

IV.

IV. THEOREME.

- XLII.** Les deux angles oppoſez d'un Parallelogramme ſont égaux, & les proches ſont égaux à deux droits.

Soit le Parallelogramme $b c d f$. Soit prolongé $f d$ juſques à g . L'angle $e d g$ eſt égal à l'angle c , par VIII. 14. & à l'angle f , par VIII. 33. Donc les aigus oppoſez c & f ſont égaux.



Or les deux angles vers d , l'un extérieur & l'autre intérieur, ſont égaux à deux droits. (VIII. 14.) Donc les angles intérieurs vers d & vers f ſont auſſi égaux à deux droits.

Donc les deux autres vers b & vers e ſont auſſi égaux à deux droits, puisſque les quatre valent 4 droits. (XII. 9.)

Otant donc de part & d'autre les deux aigus e & f qui ſont égaux, les obtus oppoſez b & d ſeront égaux.

I. COROLLAIRE.

- XLIII.** S'il y a un angle droit dans un Parallelogramme, tous les autres le ſont auſſi, & alors il eſt appelé *Rectangle*.

Car l'oppoſé eſt droit, puisſqu'il eſt égal à celui-là; & les proches ne peuvent valoir deux droits, que l'un étant droit, l'autre ne le ſoit auſſi.

II. COROLLAIRE.

- XLIV.** Qui connoiſt un angle d'un Parallelogramme les connoiſt tous. Car ce qui manque de la demy-circonférence à l'arc qui meſure l'angle donné,

DE GEOMETRIE. Liv. XIII. 401
né, est la mesure de l'angle proche de celui-là ,
& les deux autres sont égaux chacun à l'un de ces
deux-là.

III. COROLLAIRE.

DEUX Parallelogrammes qui ont un angle XLIV.
égal , sont équiangles.

IV. COROLLAIRE.

SI deux côtez angulaires d'un Parallelogramme XLV.
sont égaux , tous les quatre sont égaux en-
tre'eux. Car chacun des angulaires est égal à son
opposé. (38. sup.)

V. COROLLAIRE.

QUI connoît d'un Parallelogramme deux cô- XLVI.
tez angulaires & un angle , connoît tout le Paral-
lelogramme.

Car qui connoît un angle , les connoît tous ;
& qui connoît deux côtez angulaires connoît
les deux autres , chacun étant égal à son op-
posé.

PROBLEME.

ACHEVER un Parallelogramme dont on a XLVII.
deux côtez angulaires avec l'angle qu'ils com-
prennent.

De l'extrémité de l'un des côtez , & de l'inter-
valle de l'autre , décrire un Cercle. De l'extre-
mité de cet autre côté , & de l'intervalle du pre-
mier , d'écrire un autre Cercle. Les lignes me-
nées de ces extrémités au Cercle C
couperont , acheveront la description du
logramme.

V. THEORÉME.

XLVIII. DEUX Parallelogrammes sont semblables , quand ils ont un angle égal , & les côtez angulaires proportionnels.

Car l'égalité d'un angle donne celle des autres , (44. S.) & deux côtez angulaires ne sçauroient être proportionnels , que les deux autres ne le soient aussi.

DEFINITION.

XLIX. LA ligne qui joint deux angles opposés s'appelle *Diagonale* ; & elle divise le Parallelogramme en deux Triangles tout-égaux. Car les deux angles non divisez sont égaux parce qu'ils sont oppoiez (41. S.) & les parties des divisez sont alternativement égales , par VIII. 54.



VI. THEORÉME.

L. SI on tire des paralleles aux côtez angulaires qui passent par un même point de la diagonale , les parties de ces nouvelles lignes sont proportionnelles.

Demontré X. 17.



DEFINITION.

LI. QU'un Parallelogramme est décrit autour de la diagonale d'un autre Parallelogramme , quand d'un point de cette diagonale on tire deux paralleles aux deux côtez angulaires du Parallelogramme ,

DE GEOMETRIE. LIV. XIII. 403

me , qui se terminant chacune à l'un de ces côtez fassent un nouveau Parallelogramme, dont une partie de cette diagonale est encore diagonale.

VII. THEOREME.


Tout Parallelogramme décrit autour de la diagonale d'un autre, lui est semblable. LII.

$b c d f$ est semblable à $m n o f$. Car d'une part les angles $f d c$ & $f o n$ sont égaux; parce que $c d$ & $n o$ sont paralleles. (VIII. 39.)

Et par la même raison les angles $f c d$, & $f n o$ sont égaux aussi.

Donc $f d. f o :: d c. o n$. (20. sup.)

Donc ces Parallelogrammes sont équiangles, & ont les côtez angulaires proportionels. Donc ils sont semblables, par le 5.^e Theorème 48. sup.



DIVISION DU PARALLELOGRAMME. EN SES ESPECES.

Selon ses	Côt. angul.	ég.	Quarré.	Angles droits.	LIII.
			Rhombe.	Angles non dr.	
		inég.	Oblong.	Angles droits.	
			Rhomboïde.	Angles non dr.	
	Angl.	dr. rect.	Quarré.	Côtés tous ég.	AU.
			Oblong.	Côtés tous ég.	
		non dr.	Rhombe.	Côtés tous ég.	
			Rhomboïde.	Côt. non tous ég.	

AUTREMENT

Paral- lelogr.	{	rectangle	{	Tous les côtez ég. Carré.
			{	Les seuls oppos. ég. Oblong.
	{	non recta.	{	Tous les côtez ég. Rhombe.
			{	Les seuls oppos. ég. Rhomboïde.

DU PENTAGONE.

THEOREME.

LIV. LORSQUE deux lignes qui soutiennent chacune un angle d'un Pentagone regulier se coupent, elles se coupent mutuellement en moyenne & extreme raison; & la plus grande partie de chacune de ces lignes est égale au côté du Pentagone.

Soit le Pentagone inscrit dans un Cercle.

Chaque côté soutient un arc de 72 degrez. XII. 21.

Donc les angles inscrits au même Cercle qui sont soutenus par un de ces arcs, (tels que sont cbd , cdb , dcf , dfe ,) sont chacun de 36 degrez, IX. 17.

Et ceux qui sont soutenus par deux de ces côtez, (comme l'angle bce ,) sont de 72. *Ibid.*

Et les angles opposez au sommet (bge & fgd) sont chacun aussi de 72 degrez, par IX. 42. Et par consequent bg est égale à bc côté du Pentagone, par 10. *sup.*

Donc l'angle cbg est tel par 33. *sup.* que la base

est une ligne divisée en

moyenne & extreme raison.

Or gd est égale à la base ge ,



DE GEOMETRIE. Liv. XIII. 405
 par 10 *sup.* ou par IX. 34. Donc la toute *bd* est
 divisée en moyenne & extreme raison. C'est-à-dire
 que,

$$b d. b g. :: b g. g d.$$

COROLLAIRE.

Un Hexagone & un Decagone étant inscrits LV.
 dans le même Cercle, le côté de l'un ajouté au
 côté de l'autre fait une ligne divisée en moyenne &
 extreme raison.

Car l'angle compris entre deux demy-diametres,
 qui a pour base le côté du Decagone, est
 un angle de 36 degrez (XII. 21.) Donc ajoutant
 le côté à la base, il s'en fait une ligne divisée
 en moyenne & extreme raison. 33. *sup.*

Or le côté de cet angle, qui est le demy-dia-
 metre, est aussi le côté de l'Hexagone inscrit
 dans ce Cercle-là, XII. 36.



NOU.



NOUVEAUX ELEMENS
DE
GEOMETRIE.
LIVRE QUATORZIEME.

*DES FIGURES PLANES
considérées selon leur aire : c'est à
dire selon la grandeur des surfaces
qu'elles contiennent.*

Et premierement des Rectangles.

IDE'E GENERALE
DE LA MESURE
DES SURFACES.



la longueur.

*A surface étant une Etendue de deux
dimensions, longueur & largeur :
il est nécessaire pour en connoître la
grandeur, de sçavoir quelle en est
la longueur, & quelle en est la*

La

DE GEOMETRIE. LIV. XIV. 407

La longueur se mesure par une ligne droite qui donne la distance d'un point à un point. C'est pourquoy on ne peut connoître la longueur des lignes courbes que par rapport à des lignes droites.

La largeur consiste dans la distance entre deux lignes, comme entre bc & df , qui se mesure aussi par une ligne droite. C'est pourquoy les surfaces courbes ne se peuvent mesurer que par rapport à des surfaces planes.



De plus toute ligne droite n'est pas propre à mesurer la distance d'une ligne à une ligne. Car si elle tomboit d'un point d'une ligne obliquement sur l'autre, elle n'en mesurerait pas la distance; mais tombant d'un point d'une ligne perpendiculairement sur l'autre, elle mesure la distance de ce point à cette ligne.

Mais il ne s'ensuit pas que pour avoir mesuré la distance d'un des points de la ligne bc à la ligne df , elle ait mesuré la distance de tous les autres points de la ligne bc , à moins que tous les autres points de la ligne bc ne fussent également distans de la ligne df ; c'est à dire qu'elle ne lui fust parallèle.

D'où il s'ensuit que si bc n'étoit pas parallèle à df , il faudroit autant de différentes mesures pour connoître la distance de bc à df , qu'il y auroit de différens points dans bc . Ce qui étant impossible, il paroît par là qu'afin qu'on puisse avoir distinctement la distance d'une ligne à une autre, (ce qui fait la largeur,) il faut que ces lignes soient parallèles.

De plus, si ces lignes, ~~une plus grande que l'autre~~ soit plus grande que df , on ne sauroit en prendre pour la longueur, parce que cette surface se-

408 NOUVEAUX ELEMENS

seroit plus longue d'un côté que de l'autre. Et ainsi afin qu'on puisse avoir exactement la mesure d'une surface, il faut que les lignes dont la distance en fait la largeur, soient non seulement parallèles, mais aussi égales. D'où il arrivera que les autres lignes seront aussi égales & parallèles entr'elles. (VI. 28.)

Et par conséquent afin qu'une surface soit en état d'être exactement mesurée, il faut qu'elle soit terminée par 4 lignes parallèles; c'est à dire que ce soit un Parallelogramme.

Mais si les deux lignes égales & parallèles qu'on prend pour mesure de la longueur ne sont pas directement opposées, en sorte que de tous les points de l'une on ne puisse tirer des perpendiculaires sur l'autre; c'est à dire si ce Parallelogramme n'est pas rectangle, mais obliqu'angle: on aura bien alors dans la figure de quoi en mesurer la longueur, sçavoir lequel on voudra de deux côtés opposés. Mais l'autre côté angulaire étant oblique sur cette longueur, ne sera pas propre à mesurer la distance entre les deux lignes qui font la longueur. D'où il s'ensuit qu'il n'y a que le Rectangle qui ait en soi la mesure de sa longueur & de sa largeur.

Car si d f est prise pour la longueur, b d qui est la mesure de la distance de tous les points de b c à d f, en mesurera la largeur.



C'est pourquoi nulle surface ne se mesure proprement par soi-même, que le Rectangle. Et dans tout Rectangle l'un des côtés angulaires à choisir, se peut appeler la longueur, & l'autre la largeur; on pour s'accommoder davantage aux termes communs, l'un la base, & l'autre la hauteur.

Mais comme la mesure est d'autant plus parfaite qu'elle

qu'elle est plus simple, & que le Quarré qui n'a qu'une même mesure pour sa longueur & pour sa largeur, est plus simple que l'Oblong qui en a deux: il est arrivé de là que les Hommes prennent le Quarré de quelque ligne connuë, comme d'une toise, d'un pied, d'un pouce &c. pour la mesure commune de toutes les surfaces; & qu'alors seulement ils en croient connoître parfaitement la grandeur, quand ils peuvent dire qu'elle est de tant de toises quarrées, ou de tant de pieds quarréz, ou de tant de pouces quarréz &c. Et ainsi ce qu'on entend ordinairement par ces mots, (avoir l'aire d'un Plan,) c'est sçavoir combien ce Plan, de quelque figure qu'il soit, contient ou de toises quarrées, ou de pieds quarréz, ou de pouces quarréz; & quand on parle de surface, on sous entend le mot de quarré sans l'exprimer: comme quand on dit que la place d'un logis est de tant de toises, cela s'entend de toises quarrées, dont chacune vaut 36 pieds quarréz.

Neanmoins comme cela ne se peut pas toujours connoître à cause des grandeurs incommensurables, on se contente souvent en comparant des surfaces ensemble, de sçavoir que si l'une contient tant de petits Rectangles, comme 16 fois b f, l'autre en contient tant aussi; comme 25 fois le même b f.

Tout cela nous fait voir, 1.^o Que la premiere & la plus parfaite mesure est le Quarré, & que c'est par le Quarré qu'on mesure les Rectangles pour en connoître exactement la grandeur.

2.^o Que la plus parfaite apres le Quarré, & qui est mêmes parfaite en son genre, parce qu'elle contient en soi la mesure de la longueur & de la largeur, est le Rectangle oblong; & que c'est par là que l'on mesure les autres Parallelogrammes.

3.^o Que celle d'apres, & qui est imparfaite, ne contenant pas en soi la mesure de la longueur & de la largeur, est le Parallelogramme non rectangle: & que c'est

410 NOUVEAUX ELEMENS

d'ordinaire par ces Parallelogrammes que l'on mesure les Triangles, en ce qu'on les considere comme les moitiés de ces Parallelogrammes.

4°. Que le Triangle suit après, & que c'est par lui qu'on mesure d'ordinaire les autres Polygones en les reduisant en Triangles, comme ils s'y peuvent tous reduire.

5°. Qu'enfin les autres Polygones sont mesurez & ne servent point de mesure, comme le Quarré sert de mesure & n'est point mesuré si ce n'est par d'autres Quarrez plus petits; comme quand on dit que la toise quarrée contient 36 pieds quarrés.

Voilà en abrégé tout ce qu'a pu faire l'art des Hommes pour mesurer les surfaces rectilignes, sans parler des curvilignes qui ne se peuvent mesurer que par rapport à des rectilignes.

Mais comme toutes nos connoissances qui dependent de l'Art, en supposent de naturelles qu'on appelle Axiomes: voici ceux sur lesquels est fondée toute la science de la dimension des figures planes.

I. AXIOME.

11.

Tous les Quarrez de racine égale sont égaux. C'est à dire que les espaces compris dans le Quarré de la ligne b , & dans celui de la ligne m égale à b , & de quelque autre ligne que ce soit égale à b , sont égaux. Cela est clair par la notion même de la surface, qui n'ayant que deux dimensions, longueur & largeur, il n'est pas plus clair que deux lignes droites d'une même longueur sont égales, qu'il est clair que deux surfaces de même longueur & de même largeur sont égales. Or deux Quarrez sont de même longueur & de même largeur, si la ligne qui mesure dans l'un la longueur, est égale à celle qui mesure dans l'autre tant la longueur que la largeur.

C'est pourquoi aussi partout où une ligne d'une

cer-

DE GEOMETRIE. Liv. XIV. 411

certaine longueur se trouve, comme de la longueur de b , elle peut être marquée par le même caractère & appelée b . Car il ne peut y avoir de différence que de situation, ce qui n'y fait rien. Et ainsi il ne faut pas s'étonner si bb est partout égal à bb .

II. AXIOME.

Si les côtez angulaires d'un Rectangle sont égaux aux côtez angulaires d'autres Rectangles, chacun à chacun, tous ces Rectangles sont égaux. Ou ce qui est la même chose, tous ceux dont la base est égale à la base, & la hauteur à la hauteur, sont égaux. III

C'est la même chose que le precedent. Car les côtez angulaires d'un Rectangle en mesurent la longueur & la largeur; & on peut même, comme nous avons dit, en appeller l'un sa longueur, & l'autre sa largeur indifferemment. Et par conséquent tous les Rectangles dont les côtez angulaires sont égaux, chacun à chacun, ont même longueur & même largeur.

On peut encore dire que les côtez angulaires d'un Rectangle pouvant être marquez par les mêmes caractères partout où ils se rencontrent égaux, comme par b & par c : tous les Rectangles qui ont leurs côtez angulaires égaux l'un à b & l'autre à c , sont égaux; c'est à dire que $b c$ est égal à $b c$.

AVERTISSEMENT.

Ces deux Axiomes nous font voir que tout ce que nous avons dit dans le premier Livre de la multiplication des grandeurs incomplexes & complexes, & dans le 3.^e de la raison entre les grande. & planes, se peut appliquer aux Quarrez & aux Rectangles; & qu'il n'y a qu'à substituer au lieu des simples caractères. IV

C'est ce que nous verrons en peu de mots en commençant par la puissance des lignes.

DEFINITION.

- V. On appelle puissance d'une ligne le Carré de cette ligne, comme $b b$ est la puissance de b ; ou bien le Rectangle de deux lignes quand il s'agit de deux lignes, comme la puissance de b par c est le Rectangle $b c$.

DE LA PUISSANCE

D'UNE LIGNE

comparée avec la puissance de ses parties.

- VI. Tout ce qu'on enseigne de la puissance d'une ligne comparée avec la puissance de ses parties, n'est que la même chose que ce que nous avons dit dans le premier Livre de la multiplication des grandeurs complexes, & se peut reduire à cet Axiome:

III. AXIOME.


- VII. C'est la même chose de multiplier le tout par le tout, & de multiplier le tout par chacune de ses parties, ou de multiplier chaque partie par toutes les parties, en faisant autant de multiplications partiales qu'il y a d'unités dans le produit des deux nombres des parties qu'on multiplie les unes par les autres.

AVERTISSEMENT.

- VIII. Ainsi le plus grand mystere pour ne se point broûiller est de nommer chaque ligne autant que l'on peut par un seul caractère, afin que deux caractères joints ensemble puissent marquer une multiplication, c'est à dire un Rectangle; & de marquer par un même caractère les lignes égales.

Exemple: La ligne b soit divisée en trois portions égales que j'appelleray c , d , e . Il est visi-

ble que c'est la même chose de multiplier b par b , ce qui donne bb , que de multiplier b par toutes ses parties, c'est à dire par c , par d , & par f , ce qui donne $b c$, $b d$, $b f$: & par conséquent $bb = bc + bd + bf$.




Ainsi presque toutes les Propositions du second Livre d'Euclide ne sont que des Corollaires de ces Axiome & de cet Avertissement. Je ne proposerai que les principales qui sont d'usage.

Je suppose toujours qu'on mette à angles droits les lignes qui doivent faire les côtes angulaires des Rectangles, sans que je m'amuse plus à en avertir.

Et quand je parle d'une ligne coupée en plusieurs parties, j'entens toujours égales ou inégales, à moins que je n'exprime qu'on les doit prendre égales.

I. THEOREME.

AYANT deux lignes, l'une non coupée & l'autre coupée en tant de parties qu'on voudra : le Rectangle des deux entières est égal à tous les Rectangles de la non-coupée par chaque partie de la coupée. C'est à dire qu'un



Tout est égal à toutes ses parties prises ensemble.

Soit p la non-coupée, & T la coupée en parties b , c , d , f , g . Il est bien visible qu'en tirant des lignes parallèles à p , (& par conséquent qui lui sont égales,) par tous les points de division de

S 3

T : elles

414 NOUVEAUX ELEMENS

T : elles feront pb, pc, pd, pf, pg , qui pris ensemble sont égaux à pT , puisque c'en sont toutes les parties.


II. THEOREME.

X. Une ligne étant coupée en plusieurs parties, le Carré de la toute est égal aux Rectangles de chaque partie sur la toute.

C'est la même chose que le precedent ; excepté que la même ligne faisant les deux cotés du Rectangle total qui est alors Carré, on la prend une fois pour la non-coupée, & une autre fois pour la coupée.

Il est donc clair que T étant coupée en b, c, d, f, g :


T doit être égal à Tb, Tc, Td, Tf, Tg .



III. THEOREME.

XI. Une ligne étant coupée en tant de parties qu'on voudra, le Rectangle de quelque partie que ce soit par la toute, est égal au Carré de cette partie plus les Rectangles de cette partie par chacune des autres.

Soit T comme auparavant divisée en 5 parties b, c, d, f, g . Il est clair par le premier Theoreme, que



DE GEOMETRIE. LIV. XIV. 415

que le Rectangle de b par la toute est égal aux 5 Rectangles de b par chaque partie de T . Or b est l'une de ces parties, & par conséquent l'un de ces 5 Rectangles sera bb , c'est à dire le Quarré de cette partie; & les autres 4 Rectangles seront les Rectangles de b par chacune des autres parties, sçavoir bc , bd , bf , bg .

IV. THEOREME.

UNE ligne étant divisée en tant de parties que l'on voudra, le Quarré de la toute est égal aux Quarrez de chaque partie, plus deux fois autant de Rectangles, dont il y en a toujours deux qui sont les Rectangles des mêmes deux parties. XII.

	b	c	d	f	g
b	bb	bc	bd	bf	bg
c	cb	cc	cd	cf	cg
d	db	dc	dd	df	dg
f	fb	fc	fd	ff	fg
g	gb	gc	gd	gf	gg

Ce Theorème n'est que l'assemblage du 2.^e & du 3.^e

Soit T comme auparavant divisée en b, c, d, f, g . Par le 2.^e Theorème ayant fait le Quarré TT , & n'ayant divisé qu'un seul de ses côtez par b, c, d, f, g , & tiré les parallèles à l'autre côté, on a 5 bandes, dont on peut appeller chacune du nom de sa partie, sçavoir Tb , Tc , Td , Tf , Tg . Mais divisant encore l'autre côté par les mêmes b, c, d, f, g , on divise chacune des 5 bandes en 5 cellules,

416 NOUVEAUX ELEMENTS

lules, ce qui en fait 25; & dans chaque bande ainsi divisée se trouve un Quarré de la partie dont elle est bande, (dans Tb , bb ; dans Tc , cc ;) & quatre Rectangles des autres parties par celle-là. Et il est aisé de voir que dans chaque bande se trouve toujours un Rectangle de deux parties, qui se trouve encore dans une autre bande, comme dans Tb se trouve bc , qui se trouve aussi dans Tc ; & ainsi tout le Quarré contient

5 Quarez, bb . cc . dd . ff . gg .
 20 Rectangles, $2bc$. $2bd$. $2bf$. $2bg$.
 $2cd$. $2cf$. $2cg$.
 $2df$. $2dg$.
 $2fg$.

COROLLAIRE.

xiii. Le plus grand usage de ces Theorèmes est quand la ligne est coupée en deux. C'est pourquoy il faut bien retenir ces trois Propositions:

1. Le Quarré de la route est égal aux deux Rectangles de chaque partie par la route.
2. Le Rectangle d'une partie par la route est égal au Quarré de cette partie, plus le Rectangle des deux parties.
3. Le Quarré de la route est égal aux 2 Quarez de chaque partie, plus deux fois le Rectangle des deux parties.

DE LA PROPORTION entre les Rectangles.

PROPOSITION

FONDAMENTALE.

Les Rectangles qui ont un côté égal à un côté, & l'autre inégal, sont entr'eux commel'inégal. Ou,

DE GEOMETRIE. LIV. XIV. 417

Ou, les Rectangles de même hauteur sont comme leurs bases.

D'égale base sont comme leurs hauteurs.

Ou, d'égale longueur sont comme leurs largeurs.

D'égale largeur sont comme leurs longueurs.


Tout cela n'est que la même chose, & peut passer pour prouvé dans le 1.^e Livre.

Néanmoins en voicy encore la preuve. La these est

$$bc. bd. :: c. d.$$

L'aliquote quelconque de c soit appellée x .

Si par tous les points de la division on tire des paralleles à b , il est clair que bx sera au-



tant de fois dans bc , qu' x dans c . C'est à dire que bx & x seront toujours les aliquotes pareilles, l'une de bc , & l'autre de c . Car il est bien clair, que toutes les x étant égales, tous les bx seront égaux.

Que si on applique x à d , & qu'on tire aussi par tous les points de la division des paralleles à b : il est clair que bx sera autant de fois dans bd , qu' x dans d ; & que si x est précisément tant de fois dans d , bx sera aussi précisément tant de fois dans bd . Et si x n'est pas précisément tant de fois dans d , mais avec quelque reste, bx de même ne sera pas précisément tant de fois dans bd , mais avec un Rectangle de reste plus petit que bx .

Donc les aliquotes pareilles de bc & de c sont également contenues, celles de bc dans bd , & celles de c dans d .

Donc, par la definition de l'égalité des raisons, bc & bd sont en même raison que c & d ; puis-

418 NOUVEAUX ELEMENS


que les aliquotes pareilles des antecedens $b c$ & c sont également contenues dans les consequens $b d$ & d . Donc $b c. b d. :: c. d$.

I. COROLLAIRE.

XIV.

LES Rectangles sont en raison composée de la longueur à la longueur, & de la largeur à la largeur. C'est la définition même de la raison composée. III. 25 & 26.

$$b c. m n. :: b. m. + c. n.$$



II. COROLLAIRE.

XVI.


LES Rectangles semblables sont en raison doublée de leurs côtes homologues.

Car les Rectangles sont semblables, quand la longueur est à la longueur, comme la largeur à la largeur.

$b f$ & $c g$ sont semblables, si $b. c. :: f. g$.

Donc la raison de ces deux Rectangles est composée de deux raisons égales, par le premier Corollaire.

Donc cette raison est doublée de chacune, par la définition de la raison doublée. III. 24.




III.

III. COROLLAIRE.

Les Quarrez sont en raison doublée de leurs racines. C'est la même chose que le précédent.

Et ainsi si b est double de d , bb est quadruple de dd .



XVII.

IV. COROLLAIRE.

Les Rectangles reciproques sont égaux. Car on appelle les Rectangles reciproques quand la longueur du premier


est à la longueur du second, comme la largeur du second est à la largeur du premier. III. 37.

Ainsi bg & cf sont reciproques, si

$$b. c. : : f. g.$$

Or la grandeur plane des deux extremes d'une Proportion est égale à la grandeur plane des moyens.

Donc $bg = cf$. II. 73.



XVIII.

MESMES COROLLAIRES

AUTREMENT PROPOSEZ.

Si 4 lignes sont proportionnelles,

$$b. c. : : f. g.$$

XIX.

1. Le Rectangle bf des antecedens, est au rectangle cg des consequens, en raison doublée de la raison $b. c.$ ou $f. g.$ de cette Proportion. III. 29.

S 6

2. Le

420 NOUVEAUX ELEMENS

2. Le Rectangle $b c$ des deux premiers termes est au Rectangle $f g$ des deux derniers en raison doublée de la raison alterne $b. f.$ ou $e. g.$ de cette Proportion. (16. S.)

3. Le Rectangle des deux extremes est égal au Rectangle des deux moyens, $b g = e f$. II. 73.

4. Les Quarrez de ces quatre lignes sont proportionels, $bb. cc. :: ff. gg.$ par III. 32.

5. Si trois lignes sont continûment proportionnelles, le Quarré de celle du milieu est égal au Rectangle des extremes.

Si $\div b. c. d. cc = b d$. II. 73 & 82.

6. Les Quarrez des deux premiers bb & cc sont en même raison que la premiere & la troisième.
 $bb. cc :: b. d.$ par III. 34.

V. COROLLAIRE.

XX. UNE ligne étant divisée en deux parties, si deux autres lignes sont moyennes proportionelles, l'une entre la toute & la plus grande partie, & l'autre entre la même toute & la plus petite partie : les deux Quarrez de ces deux lignes sont égaux au Quarré de cette toute.

Soit b divisée en m & n .

Soit b moyenne entre b & m .

m .

Et d entre b & n .

Puisque $\div b. b. m. bb =$

hm .

Et puisque $\div b. d. n. dd = hn$.

Donc $bb + dd = hm + hn$.

Or $hm + hn = bh$. (10. sup.)

Donc $bb + dd = bh$.



AVERTISSEMENT.

On peut rapporter ici tout ce qui a été démontré des Grandeurs planes en general dans le II. & le III.

DE GEOMETRIE. LIV. XIV. 421

III. Livre. Car le Rectangle est une grandeur plane en matiere d'Etendue ou d'Espace.

APPLICATION

DE CETTE DOCTRINE

generale à quelques lignes particulieres qu'on a fait voir ci-devant être proportionelles.

I. THEORÉME.

SI deux lignes se coupent dans un Cercle, le Rectangle des portions de l'une est égal au Rectangle des portions de l'autre. Voyez XI. 27. & XIV. 18. xxix.

II. THEORÉME.

LE Quarté de la perpendiculaire d'un point de la circonference au diametre, est égal au Rectangle des portions du diametre. Voyez XI. 29. & XIV. 19. Art. 5. xxiii.

III. THEORÉME.

SI d'un point hors le Cercle deux lignes sont menées jusqu'à la concavité du Cercle: le Rectangle d'une toute & de sa portion qui est hors le Cercle, est égal au Rectangle de l'autre toute & de sa portion qui est aussi hors le Cercle. Voyez XI. 31. & XIV. 18. xxiv.

IV. THEORÉME.

SI d'un point hors le Cercle on mène une ligne qui touche le Cercle, & l'autre qui le coupe jusqu'à la concavité: le Quarré de la tangente est égal au Rectangle de l'autre toute, & de sa portion qui xxv.

422 NOUVEAUX ELEMENS

qui est hors le Cercle. XI. 33. & XIV. 19.

Art. 5.

Et si on appelle la tangente p , la sécante entière t , la partie qui est hors le Cercle b , & celle qui est au dedans d , on aura toutes ces égalitez par ce qui a été dit cy-devant :

$$pp \equiv bt.$$

$$pp \equiv bb + bd.$$

$$bb \equiv pp + bd.$$

$$tt \equiv bt + dt. (10. S.)$$

$$tt \equiv pp + dt.$$



V. THEORÉME.

xxvi. Si du sommet d'un Angle droit on tire une perpendiculaire sur l'hypoténuse,

1. Le Quarré de cette perpendiculaire est égal au Rectangle des deux portions de l'hypoténuse.

$$pp \equiv mn.$$

2. Le Quarré du grand côté de l'angle droit est égal au Rectangle de l'hypoténuse entière & de la grande portion, $bb \equiv bm$.

3. Le Quarré du petit côté est égal au Rectangle de l'hypoténuse entière & de la petite portion, $dd \equiv dn$.

4. Le Quarré de toute l'hypoténuse est égal aux Quarrés des deux côtés, $tt \equiv bb + dd$.

Les 3. premiers points sont clairs, par XI. 52. & par 19. S. Art. 5.

Et le 4.^e par le 5.^e Corollaire S.



I. COROLLAIRE.

xxi.

La diagonale d'un Rectangle peut autant que les Quarrés des deux côtés.

II.

II. COROLLAIRE.

LA diagonale d'un Carré peut 2 fois le Carré XXVII.
du côté.

III. COROLLAIRE.

LA diagonale d'un Carré est incommensurable en longueur au côté, & commensurable en puissance. XXIX.
XI. 71.

IV. COROLLAIRE.

LA hauteur d'un Triangle équilatéral, (c'est à dire la perpendiculaire du sommet à la base,) est incommensurable en longueur au côté, & commensurable en puissance; le Carré du côté étant au Carré de cette perpendiculaire comme 4 à 3. XXX.

La première partie est claire, par XI. 73.

La seconde se prouve ainsi : pd est la moitié de bd . Donc le Carré de bd est au Carré de pd comme 4 à 1. (17. Sup.) Or ce même Carré de pd , plus celui de bp , est égal au carré de bd . (26. Sup.)



Donc le Carré de bd est à celui de bp comme 4 à 3.

VI. THEOREME.

Le Carré de la base d'un angle aigu, est égal aux Carrés des côtés qui le comprennent, moins deux fois le Rectangle du côté sur lequel on mène une perpendiculaire de l'extrémité opposée de la base, & de la ligne comprise entre le sommet de cet angle aigu & cette perpendiculaire. XXXI.

Soit

214 NOUVEAUX ELEMENS

Soit la base de l'angle aigu
nommée b .

Le côté vers lequel on ne mène
point la perpendiculaire, c .

Celui sur lequel on la mène, d .

La perpendiculaire, p .

La ligne comprise entre la
perpendiculaire & le sommet de
l'angle aigu, x .

Celle qui est comprise entre la perpendiculaire
& la base, y .

Je dis que $bb = cc + dd - 2dx$.

Mais il faut remarquer qu' x est quelque-
fois $d - y$.

Quelquefois d simplement.

Et quelquefois $d + y$.

Selon que d fait sur la base, ou un angle aigu,
ou un droit, ou un obtus.

Mais quand d fait un angle droit sur b , il est plus
court de dire que bb base de l'angle aigu, est égal
à cc moins dd , comme il est clair par le préce-
dent Théorème. Et ainsi il reste seulement les
deux autres cas.

PREMIER CAS.

QUAND d fait sur la base un angle aigu, la per-
pendiculaire coupe d en deux parties.

Et ainsi $d = x + y$; & $x = d - y$.

Et alors le Théorème se prouve ainsi :

Par le précédent Théorème $bb = pp + yy$.

Et $cc = pp + xx$.

Et $dd = yy + xx + 2xy$. (par 13. Sup.).

Donc bb est moindre que $cc + dd$, de $2xx$
& $2xy$.

C'est à dire que $bb = cc + dd - 2xx - 2xy$.

Or x étant égale à $d - y$, $xx = dx - xy$.

Donc $xx + xy = dx$.

Donc.



DE GEOMETRIE. LIV. XIV. 425

Donc $2\ xx + 2\ xy = 2\ dx$.

Donc $bb = cc + dd - 2\ dx$. Ce qu'il falloit démontrer.

SECOND CAS.

Si d fait un angle obtus sur b , alors p ne tombe sur d qu'étant prolongé, & y est une ligne ajoutée à d , & x est égale à $d + y$. Ce qui fait qu'on prouve ainsi que $bb = cc + dd - 2\ dx$.

$pp = cc - xx$,
c'est-à-dire $dd - yy - 2\ dy$.



Or $bb = pp + yy$.

Donc $bb = cc - dd - 2\ dy$.

Et par conséquent $bb = cc + dd - 2\ dd - 2\ dy$.

Or $x = d + y$. Donc $dd + dy = dx$.

Donc $2\ dd + 2\ dy = 2\ dx$.

Donc $bb = cc + dd - 2\ dx$. Ce qu'il falloit démontrer.

COROLLAIRE.

De tout ceci il est aisé de conclure que si des deux extrémités de la base d'un angle aigu, on tire des perpendiculaires à chaque côté : le Rectangle d'un côté & de la ligne comprise entre le sommet de l'angle aigu & la perpendiculaire qui tombe sur ce côté, sera toujours égal au Rectangle de l'autre côté & de la ligne comprise entre le sommet de l'angle aigu & la perpendiculaire qui tombe sur cet autre côté.



VII. THEOREME.

XXXIII. Le Carré de la base d'un angle obtus est égal aux Carrés des côtés, plus deux fois le Rectangle du côté vers lequel on aura mené une perpendiculaire de l'extrémité de cette base, & de la ligne comprise entre cette perpendiculaire & le sommet de l'angle obtus.

Il est clair que cette perpendiculaire ne peut tomber sur aucun côté qu'en le prolongeant.

Soit donc la base b .

Le côté non prolongé c .

L'ajoutée y .

La perpendiculaire p .

Je dis que $bb = cc + dd + 2 dy$.

$2 dy$.

Car bb est égal au Carré de p , plus le Carré de $d+y$. C'est à dire que

$$bb = pp + yy + dd + 2 dy.$$

$$\text{Or } cc = pp + yy.$$

Donc $bb = cc + dd + 2 dy$. Ce qu'il falloit démontrer.



AVERTISSEMENT

XXXIV. On peut faire ici un Corollaire semblable à celui du Theoreme precedent. Je le laisse à chercher, & à prouver si l'on veut par les principes du Livre des Lignes proportionnelles.

VIII. THEOREME.

XXXV. Le Carré de la base d'un angle obtus qui vaut les deux-tiers de deux angles droits, (c'est à dire qui est de 120 degrez,) est égal aux Carrés des deux côtés, plus le Rectangle de ces deux mêmes côtés.

Toutes choses étant faites, & les lignes nommées

DE GEOMETRIE. LIV. XIV. 427

mées comme dans le précédent Théorème, l'angle obtus ne peut valoir 120 degrez, que l'angle que fait e sur l'ajoutée y , (qui est le complément de cet angle obtus,) ne soit de 60 degrez. Or le Triangle que font e, y, p , est rectangle. Donc y est le sinus d'un angle de 30 degrez. (VIII. 37.) Donc (par XIII. 31.) y est la moitié de c , qui en est le rayon.



$$\text{Donc } dc = 2dy.$$

Or par le précédent Théorème,

$$bb = cc + dd + 2dy.$$

$$\text{Donc } bb = cc + dd + dc.$$


IX. THÉORÈME.

Le Carré de la base d'un angle aigu de 60 de-xxxvi. grez est égal aux Carrés des côtes, moins le Rectangle des côtes.

Car par le 6. Théorème b étant la base d'un angle aigu,

$$bb = cc + dd - 2dx.$$

Or x en tous les cas, (c'est à dire soit qu' x soit ou $d-y$, ou d simplement, ou $d+y$,) est toujours le sinus d'un angle de 30 degrez dont c est le rayon, quand l'angle que soutient b est de 60 degrez.



Donc x est toujours la moitié de c , par XIII.

31.

$$\text{Donc } dc = 2dx.$$

$$\text{Donc } bb = cc + dd \left\{ \begin{array}{l} = 2dx. \\ \text{ou} \\ = dc. \end{array} \right.$$

X. THÉORÈME.

Le Carré du côté du Pentagone est égal au Carré xxxvi

428 NOUVEAUX ELEMENTS

Quarré du côté du Decagone, plus le Quarré du côté de l'Hexagone inscrits dans le même Cercle.

Soit bd le côté du Pentagone.

cb & cd deux demy-diametres du Cercle dans lequel il est inscrit, qui sont aussi les côtes de l'Hexagone, par XII. 36.

dg & gb deux côtes du Decagone.

c une ligne qui coupe perpendiculairement & par la moitié, tant le côté dg du Decagone, que l'arc dg : & qui coupe en r le côté du Pentagone.



Cela étant, je prouve 1.^o Que be (côté de l'Hexagone) est moyen proportionnel entre bd côté du Pentagone, & la partie br .

Car les deux angles vers b & vers d sont chacun de 54 degrez, XII. 23.

Or l'angle reb est aussi de 54 degrez, puis-que l'arc gb est de 36 degrez, XII. 21. & l'arc gp de 18, ce qui ensemble fait 54.

Donc les deux Triangles bed , & bre sont isosceles & semblables.

Donc par XI. 20. be est moyen proportionnel entre bd & br ; c'est à dire entre le côté du Pentagone & sa plus grande partie.

Je prouve 2.^o Que dg côté du Decagone, est moyen proportionnel entre bd côté du Pentagone, & dr sa plus petite partie.

Car rp coupant gd perpendiculairement & par la moitié, rg est égale à rd . Donc les angles que chacune fait sur gd sont égaux. XIII. 10.

Donc les deux Triangles dgb & drp sont isosceles & semblables. Donc par XIII. 34. dg (base du petit & côté du grand) est moyen proportionnel entre bd (base du grand) & rd (côté du petit.)

Donc

DE GEOMETRIE. Liv. XIV. 429

Donc le côté du Decagone est moyen proportionnel entre le côté du Pentagone & sa plus petite partie.

Donc par le 3.^e Corollaire (20. *sup.*) le Quarré du côté du Pentagone est égal au Quarré du côté de l'Hexagone, plus le Quarré du côté du Decagone inscrits dans le même Cercle. Ce qu'il falloit demontrer.

XI. THEOREME.

Si une ligne est divisée en moyenne & extre. XXXVIII.
me raison, la ligne composée de la moitié de
cette ligne & de sa plus grande partie, peut 5
fois le Quarré de la moitié.

Soit la ligne d divisée en moyenne & extrême
raison, en sorte que
 $bb = dd - db$, &
par consequent $bb +$
 $db = dd$.

Appellant m la moi-
tié de d , je dis que le
Quarré de $m + b$ vaut
5 fois le Quarré d' m .

Car m étant la moi-
tié de d , $dd = 4$

mm . Et $2mb = bd$.

Et ainsi le Quarré de $m + b$

E'tant égal à $mm + bb + 2mb$:

Il sera égal à $mm + bb + db$.

Donc à $mm + dd$.

Donc à $mm + 4mm$.

Donc à 5 mm .



XII. THEOREME.

UNE ligne étant divisée en moyenne & extre. XXXIX.
me raison, la ligne composée de la petite portion
& de la moitié de la plus grande, peut 5 fois le
Quarré de la moitié de la plus grande.

Soit

430 NOUVEAUX ELEMENTS

Soit comme auparavant la toute d , la plus grande partie b , & sa moitié n , la plus petite c ; en sorte que $de = bb$.

Or $de = cc + cb$. (13. *sup.*) Donc $cc + cb = bb$.

Cela étant, je dis que le Carré de $c+n = 5nn$.


Car ce Carré de $c+n$

Est égal à $cc + nn + 2cn$.

Donc à $cc + nn + bc$, (puisque n est $\frac{1}{2}$ de b .)

Donc à $nn + bb$, (puisque $bb = cc + bc$.)

Donc à $nn + 4nn$. Donc à $5nn$. Ce qu'il falloit démontrer.



XIII. THEOREME.

XL.

UNE ligne étant divisée en moyenne & extrême raison, le Carré de la toute, plus le Carré de la plus petite partie, valent 3 fois le Carré de la plus grande.


Soit comme auparavant $d = b + c$; & b moyenne proportionnelle entre d & c , en sorte que $bb = dc$, & par conséquent à $cc + cb$. Je dis que $dd + cc = 3bb$.

Car $dd = lb + cc + 2cb$.

Donc $dd + cc = lb + 2cc + 2cb$.

Or $2cc + 2cb = 2bb$, puisque $cc + cb = bb$.

Donc $dd + cc = 3bb$. Ce qu'il falloit démontrer.



I. PROBLEME.

XL.

TROUVER le Carré égal à un Rectangle donné.

Ou

DE GEOMETRIE. Liv. XIV. 431

Ou ayant l'aire d'un Quarré, en trouver la racine.

Il ne faut que trouver la moyenne proportionnelle entre les côtez du Rectangle donné.

Ou entre les deux lignes qui font l'aire donnée; comme si l'aire est supposée de 20 toises, ou pieds, ou poudes, entre 1 & 20, ou 2 & 10, ou 4 & 5.

II. PROBLEME.

AVANT le côté d'un Rectangle, trouver quel doit être l'autre, afin qu'il soit égal à un Rectangle donné. XLII.

Prendre le côté donné pour premier terme d'une Proportion, les deux côtez du Rectangle donné pour 2.^e & 3.^e. Le côté que l'on cherche se trouvera en trouvant une 4.^e proportionnelle, par X. 34.

III. PROBLEME.

TROUVER un Quarré égal à deux ou plusieurs Quarrez donnez. XLIII.

Soient les Quarrez donnez bb , cc , dd . Mettant b & c

à angle droit, le

Quarré de l'hypotenuse de cet angle

droit que je

nomme f , sera égal

à $bb + cc$. Et

mettant de nou-


veau f & d à angle droit, le

Quarré de l'hypotenuse de cet angle

sera égal à $ff + dd$, & par conséquent

à $bb + cc + dd$. Et on peut conduire

cela jusqu'à l'infini.



COROLLAIRE.

TROUVER le Quarré égal à plusieurs Rectangles donnez. XLIV.

II

432 NOUVEAUX ELEMENTS

Il ne faut que trouver les Quarrez égaux à chacun de ces Rectangles. Et puis on trouvera le Quarre égal à tous ces Quarrez.

IV. PROBLEME.

XLV. TROUVER un Quarre auquel un Quarre donné soit en raison donnée.

Soit le Quarre donné $b b$.

La raison donnée $m. n.$

AYANT disposé m, n, b , comme les trois premiers termes d'une Proportion, & trouvé d pour 4.^e proportionnelle, par X. 34. en sorte que


$$m. n. :: b. d.$$

Et trouvant aussi par XI. 58. la moyenne proportionnelle entre b & d , que je suppose être c : le Quarre de c satisfera au Probleme. Car puisque

$$b b. c c. :: b. d. \text{ (19. S. Art. 6.)}$$

$$\text{Or } b. d. :: m. n.$$

$$\text{Donc } b b. c c. :: m. n.$$



V. PROBLEME.

XLVI. DIVISER une ligne, en sorte que le Quarre de la plus grande portion soit égal au Rectangle de la toute & de la plus petite portion.

Ce Probleme a été résolu (XI. 62.) quand on a appris à couper une ligne en moyenne & extrême raison: c'est à dire, en sorte que la toute soit à la plus grande portion, comme la plus grande portion à la plus petite.

VI. PROBLEME.

XLVII. DIVISER une ligne en sorte que le Quarre de la

DE GEOMETRIE. LIV. XIV. 433

la plus grande portion soit au Rectangle de la toute & de la plus petite portion en raison donnée.

Soit la ligne donnée d .

La raison donnée

$m. n.$

La plus grande portion que l'on cherche, x .

Et la plus petite, qui est là même chose que $d - x$, soit appelée y .



Il n'y a qu'à trouver x ; ce qui se fera en cette manière:

1. Trouver une ligne qui soit à d , comme m est à n . Je la suppose trouvée par X . 34. & je l'appelle c .

2. Chercher la moyenne proportionnelle entre c & d . Je la suppose trouvée par XI . 58. & j'appelle p ; d'où il s'en suivra que $c d = p p$. (19. S. Art. 5.)

3. Faire un Cercle qui ait c pour diamètre, & p pour tangente. Si de l'extrémité de p qui est hors le Cercle on tire une sécante qui passe par le centre du Cercle: la partie de cette sécante qui est au dedans du Cercle étant e , celle qui est au dehors sera x . Et $d - x$ sera y . D'où il s'en suivra

4. Que $c d - c x$ sera la même chose que $c y$. Car y étant égale à $d - x$, c'est la même chose de multiplier c par $d - x$, (ce qui fait $c d - c x$), que de multiplier c par y ; ce qui fait $c y$.

Cela étant ainsi, il est facile de prouver que

$$x x . d y . : : m . n .$$

C'est à dire que le Quarré de la plus grande partie de d est au Rectanglé de d par l'autre partie que j'ay nommée y , en raison donnée.

Car p qui est tangente par la 3.^e supposition, est moyenne proportionnelle entre x & $x + c$. (25. S.)

$$\text{Donc } x . p . : : p . x + c .$$

$$\text{Donc } x x + c x = p p . \text{ (19. S. Art. 3.)}$$

Or

434 NOUVEAUX ELEMENS

Or $pp = cd$ (par la 2.^e supp.)

Donc $xx + cx = cd$.

Donc $xx = cd - cx$.

Or $cd - cx = cy$ (par la 4.^e supp.)

Donc $xx = cy$.

Or $cy. dy. :: c. d.$ (II. 58.)

Et $c. d. :: m. n.$ (par la 1.^{re} supp.)

Donc xx (égal à cy) $dy. :: m. n.$ ce qu'il falloit démontrer.

VII. PROBLEME.

XLVIII. TROUVER la racine d'un Quarré dont on ne sçait autre chose, sinon qu'étant comparé au Quarré d'une ligne donnée, & à un Rectangle d'une autre ligne donnée & de cette racine inconnue, il est

Ou { 1. Egal au Quarré plus le Rectangle.
2. Egal au Quarré moins le Rectangle.
3. Egal au Rectangle moins le Quarré.

Ainsi la racine inconnue étant nommée x ou y ;

La ligne donnée qui fait le Quarré, b ;

Et l'autre ligne donnée côté du Rectangle, d .

Le 1.^{er} Cas sera $yy = bb + yd$.

Le 2.^e Cas, $xx = bb - xd$.

Et le 3.^e { $yy = yd - bb$
 $xx = xd - bb$

CONSTRUCTION

COMMUNE

au premier & au second Cas.

DÉCRIRE un Cercle de l'intervalle de la moitié de d , élevée perpendiculairement sur l'une des extremités de b .

Et tirer de l'autre extremité de b une secante qui passant par le centre du Cercle se termine à la circonference.

Cette


DE GEOMETRIE. Liv. XIV. 435

Cette sécante entière soit

appelée y ;

Qui sera composée de sa partie hors le Cercle appelée x ,

Et du diamètre du Cercle, qui sera d par la construction.



Et b sera tangente du Cercle.

PREUVE DU PREMIER CAS.

Dans le 1.^{er} Cas, c'est y , (c'est à dire la sécante entière,) qui est la racine que l'on cherche.

Car y étant égale à $x + d$,

$$yy = yx + yd. \text{ sup. 13.}$$

$$\text{Or } bb = xy. \text{ sup. 25.}$$

Donc $yy = bb + yd$. Ce qu'il falloit démontrer.

PREUVE DU SECOND CAS.

Dans le 2.^e Cas, c'est x , (c'est à dire la partie de la sécante qui est hors le Cercle,) qui est la racine que l'on cherche.

$$\text{Car } x.b. :: b.x + d.$$

$$\text{Donc } xx + xd = bb.$$

Donc $xx = bb - xd$. Ce qu'il falloit démontrer.

CONSTRUCTION ET PREUVE DU TROISIÈME CAS.

Faisant un Cercle qui ait d pour diamètre, & b pour tangente, il faut tirer une parallèle à d de l'extrémité de b qui est hors le Cercle.

Que si cette parallèle ne coupe point le Cercle, parce que b est aussi grande ou plus grande que la moitié de d , le Probleme est impossible.

Mais si elle le coupe: tirant une tangente parallèle à b de l'autre extrémité de d , & prolongeant

T 2

jus-

436 NOUVEAUX ELEMENTS

juſqu'à cette tangente la ſecante pa-
rallele à d : cette ſecante (égale à d)
ſera compoſée de trois parties ; de
deux hors le Cercle, qui étant éga-
les, (comme il eſt aiſé de le prouver
en tirant du centre une perpendicu-
laire à cette ſecante,) chacune s'app-
ellera x , & celle de dedans le Cer-
cle plus une de dehors, c'eſt à dire
plus x , s'appellera y .



Cela étant ſuppoſé, je dis qu' x & y peuvent
l'une & l'autre ſatisfaire au Probleme.

Car $xy = bb$, par le 4.^e Theorème, 25. S.

Et d étant égale à $x+y$,

$xx + xy = xd$ } par 13. *ſup.*
Et $yy + xy = yd$ }

Donc $xx = xd - xy$ égal à bb .

Et $yy = yd - xy$ égal à bb .

Donc ſoit qu'on prenne x ou y , on ſatisfait au
P Probleme. Et le choix depend de ſçavoir d'ail-
leurs ſi la racine que l'on cherche doit être plus
petite que b , car alors c'eſt x ; au lieu que ſi elle doit
être plus grande, c'eſt y .





NOUVEAUX ELEMENS
D'E
GEOMETRIE.
LIVRE QUINZIE'ME.

DE LA MESURE
DE L'AIKE

*des Parallelogrammes, des Triangles,
& autres Polygones.*

DEFINITIONS.



QUAND on parle des côtez d'un Parallelogramme, on entend les côtez angulaires, à moins qu'on ne marque autre chose.

On peut prendre lequel on veut de ces côtez pour mesure de la longueur du Parallelogramme; & alors ce côté s'appelle la base.

Et la perpendiculaire qui mesure la distance entre la base & son côté opposé s'appelle la hauteur du Parallelogramme.

FONDEMENT DE
LA MESURE*des Parallelogrammes.*

11. Nous avons dit au commencement du Livre precedent, que dans les Parallelogrammes non rectangles, (à qui pour abregé nous donnerons simplement le nom de Parallelogrammes,) on pouvoit prendre lequel on vouloit de leurs côtez angulaires pour mesure de l'une de leurs dimensions, qui est la longueur; mais que l'autre côté angulaire ne pouvoit pas en mesurer la largeur, parce qu'étant oblique il ne mesuroit pas la distance entre les côtez opposés qui avoient été pris pour la longueur. Et ainsi au lieu de cet autre côté angulaire, il faut prendre la perpendiculaire qui mesure la distance entre le premier côté & son opposé, pour avoir l'autre dimension de ces Parallelogrammes.

Or de là il s'ensuit que le Rectangle de la base & de cette perpendiculaire appelée la hauteur du Parallelogramme, est égal à ce Parallelogramme: puisqu'il n'a que deux dimensions, longueur & largeur: la longueur de l'un est égale à la longueur de l'autre, en ce qu'ils ont tous deux une base égale: & que la largeur de l'un est égale à la largeur de l'autre, puisqu'elle est mesurée par une perpendiculaire égale dans l'un & dans l'autre; quoy qu'en l'un elle soit l'un des côtez de la figure, sçavoir dans le Rectangle, & que dans l'autre elle n'y soit pas marquée.

Cela pourroit suffire pour ceux qui cherchent plutôt à s'assurer de la vérité, qu'à en pouvoir convaincre les autres.

Néanmoins pour plus grande certitude, on peut employer deux voyes pour prouver cette proposition :

tion : l'une nouvelle appelée la *Geometrie des Indivisibles* : & l'autre ancienne & plus commune. Nous expliquerons l'une & l'autre.

NOUVELLE METHODE
APPELEE
LA GEOMETRIE
DES INDIVISIBLES.

Quoy que les Geometres conviennent que la ligne n'est pas composée de points, ny la surface de lignes, ny le solide de surfaces : néanmoins on a trouvé depuis peu de temps un art de démontrer une infinité de choses, en considérant les surfaces comme si elles étoient composées de lignes, & les solides de surfaces.

III.

Je n'ay rien veu de ce qui en a été écrit : mais voici ce qui m'en est venu dans l'Esprit, en ne m'arrêtant maintenant qu'à ce qui regarde les surfaces.

Le fondement de cette nouvelle Geometrie est de prendre pour l'aire d'une surface la somme des lignes qui la remplissent ; de sorte que deux surfaces sont estimées égales, quand l'une & l'autre est remplie par une somme égale de lignes égales ; soit que chacune de celles d'une somme soit égale à chacune de celles de l'autre somme ; soit qu'il se fasse une compensation ; en sorte par exemple, que deux d'une somme qui pourront être inégales entr'elles, soient égales à deux prises ensemble de l'autre somme qui seront égales entr'elles.

Mais pour ne pas donner lieu à beaucoup de paralogismes où l'on tombe aisément en se servant de cette methode, si on n'y prend bien garde, il faut remarquer,

1. Qu'afin que des lignes soient censées remplir un espace, il faut qu'elles soient toutes parallèles entr'elles ; soit qu'elles soient droites, pour rem-

plir un espace rectiligne: soit qu'elles soient circulaires, pour remplir des Cercles ou des portions de Cercles. Il est facile d'en voir la raison. Et ainsi il faut bien prendre garde de ne pas employer pour cela des lignes qui ne seroient pas paralleles en l'une ou l'autre de ces deux manieres.

2. Afin qu'une somme de lignes soit censée égale à une autre somme de lignes, il ne faut pas s'imaginer qu'on puisse dire le nombre qu'en contient chaque espace, (car il n'y a point de si petit espace qui n'en contienne un nombre infini:), mais ce qui fait qu'on appelle ces sommes égales, c'est que toutes les lignes d'un côté & d'autre coupent perpendiculairement deux lignes égales. Par exemple si la ligne *b* est égale à la ligne *m*, le nombre infini des lignes qui peuvent couper perpendiculairement *b*, en tous ses points, est censé égal au nombre infini de celles qui peuvent aussi couper perpendiculairement *m*; étant visible qu'il n'y a point de raison pourquoy on en puisse faire passer davantage par l'une que par l'autre. Car



les aliquotes pareilles de l'une & de l'autre étant toujours égales juques à l'infini: on pourra toujours de part & d'autre titer par tous les points de ces divisions autant de lignes paralleles entr'elles, & qui contiendront toujours de part & d'autre un espace parallele égal. Et c'est proprement de là que depend la verité de cette nouvelle methode, (& non que le continu soit composé d'indivisibles;) ce qui l'a fait mêmes appeller par quelques-uns, *la Geometrie de l'infini*.

Il faut donc bien prendre garde que les lignes, par le rapport desquelles on dit qu'une somme de ces lignes paralleles qui remplissent un espace, est égale


DE GEOMETRIE. Liv. XV. 44

égale à une autre somme, les coupent perpendiculairement. Et c'est où il y a plus de danger de se tromper. Sur ces fondemens voicy les Theorèmes que l'on établit.

I. THEORÉME.

Tous les Parallelogrammes de base égale & de même hauteur sont égaux entr'eux. IV.

Soient divers Parallelogrammes, comme A, E, I,



enfermez dans le même espace parallele, (comme ils le peuvent être, puisqu'ils sont supposés de même hauteur,) & ayant tous les bases égales. Il est clair que toutes les paralleles qui peuvent remplir cet espace, rempliront tous ces Parallelogrammes; & qu'ainsi ils seront tous remplis d'une somme égale de lignes, cette somme étant mesurée dans tous par la perpendiculaire qui mesure la hauteur de ces Rectangles, qui est la même en tous, puisqu'ils sont de même hauteur.

De plus, toutes ces lignes étant paralleles à la base dans tous ces Rectangles, sont égales en tous; puisqu'elles sont en tous égales à la base, & que les bases sont supposées égales.

Donc il y a partout somme égale de lignes égales.

Donc ils sont tous égaux, selon le fondement de la Geometrie des indivisibles.

II. THEORÉME.

Tous les Parallelogrammes de même hauteur sont entr'eux comme leurs bases. V.


T 5

C'est.

442. NOUVEAUX ELEMENS

C'est une suite du precedent.

Soient les Parallelogrammes A, E, entre mêmes paralleles, & qui ayent des bases in-



égales. En quelques aliquotes que je divise la base d'A : en tirant des paralleles au côté par tous les points de la division, il y aura dans A autant de Parallelogrammes égaux entr'eux, que cette base aura de parties égales ; de sorte que si elle avoit été divisée en 7 parties, dont j'appelleray chacune x , il y aura dans A 7 Parallelogrammes qui auront chacun x pour base.

Que si appliquant x à la base d'E, il se trouve qu'il y soit trois fois, ou sans reste, ou avec reste : tirant encore de tous les points de la division, des lignes paralleles au côté d'E, il est visible qu'il y aura dans E autant de Parallelogrammes qui auront x pour base, qu' x se fera trouvée dans la base d'E. Et si ç'a été sans reste, ces trois Parallelogrammes rempliront E sans reste : & si avec reste, il restera aussi un Parallelogramme qui aura ce reste pour base.


Or les Parallelogrammes qui dans E ont x pour base, sont égaux à ceux qui dans A ont aussi x pour base ; par le precedent Theorème.

Donc, par la definition de l'égalité des raisons, A est à E en même raison que la base d'A à la base d'E ; puisqu'autant que les aliquotes quelconques de la base d'A sont contenuës dans la base d'E, les aliquotes pareilles d'A sont contenuës dans E : si sans reste, sans reste ; si avec reste, avec reste.

III. THEOREME.

- VI. LES Triangles de même hauteur & de même base sont égaux. Car étant mis entre les mêmes paralleles, comme devant, & ayant tous b pour base,

se, toutes les lignes parallèles qui rempliront cet espace, rempliront ces Triangles; & de chacune de ces li-



gnes tirées tout le long de l'espace d'un point quelconque de la perpendiculaire $m x$, ce qui sera enfermé dans chaque Triangle sera toujours égal, comme il a été prouvé XIII. 25. & X. 21. quoy que toujours de plus petit en plus petit montant vers le sommet.

Donc une somme égale de lignes égales chacune à chacune de chaque Triangle, remplit tous ces Triangles.

Donc ces Triangles sont égaux.

IV. THEOREME.

Les Triangles de même hauteur sont entr'eux comme les bases.

VII.

C'est la même chose que le 2.^e Theorème, & qui se prouve de la même sorte; excepté qu'on emploie icy au lieu de Parallelogrammes des Triangles qui ont x pour base, & qui aboutissent de part & d'autre au sommet de chaque Triangle dont ils sont parties. Or ces Triangles qui ont x pour base dans l'un & dans l'autre Triangle, sont aussi de même hauteur dans l'un & dans l'autre; & par conséquent ils sont égaux. Ensuite dequoy il ne faut qu'appliquer ce que nous avons dit pour la demonstration du 2.^e Theorème.

V. THEOREME.

Le Cercle est égal au Triangle rectanglé, qui a pour côtéz de son angle droit le rayon du Cercle, & une ligne égale à la circonference du Cercle.

VIII.

T 6

Soit.



Soit le Cercle d ; le rayon $d b$; la tangente $b c$ égale à la circonférence; & l'hypoténuse $d e$.

Si on tire de tous les points du rayon, des circonférences concentriques au Cercle, elles rempliront tout le Cercle, & elles seront parallèles entr'elles, en la manière que les circonférences le peuvent être, & coupées perpendiculairement par le rayon. VII. 41 & 44.)

Si on tire aussi de tous ces mêmes points du rayon par lesquels auront passé ces circonférences, des parallèles à $b c$, jusques en $d e$: ces parallèles rempliront le Triangle. Et ainsi la somme de ces circonférences & de ces parallèles sera égale, étant déterminée de part & d'autre par les points du même rayon; étant clair que l'on ne sçaurait tirer une circonférence par aucun point, qu'on ne tire aussi une parallèle à $b c$ par ce même point, & au contraire.

Or la circonférence & la parallèle tirées du même point sont égales, comme on peut voir en examinant laquelle on voudra: par exemple celle du point b . Car

$$b d : d f :: \begin{cases} \text{circonf. } b. \text{circonf. } f. & (\text{XII. 28.}) \\ b c. & f g. & (\text{X. 20.}) \end{cases}$$

Donc circonf. b . circonf. f . : $b c$. $f g$.

Donc *alternando*, circonf. b . $b c$. : circonf. f . $f g$.

Or par l'hypothèse la circonférence b , qui est celle du Cercle, est égale au côté $b c$ du Triangle.

Donc la circonférence passant par le point f , est égale à $f g$, parallèle à $b c$. Le reste s'ensuit.

AVR-

AVERTISSEMENT.

Je n'en dirai pas davantage de cette nouvelle méthode. Il est aisé de juger que ces 5 Théorèmes sont de suffisans fondemens pour mesurer sans peine toutes les figures rectilignes, & en trouver les égalitez & les rapports: sur tout en y joignant les principes qui ont été établis dans les 3 premiers Livres.

ix.

METHODE COMMUNE.

LEMME OU AXIOME.

DEUX Triangles tout-égaux sont égaux. C'est à dire que lorsque les angles d'un Triangle sont égaux à ceux de l'autre, chacun à chacun, & les côtez égaux aussi chacun à chacun, ces deux Triangles comprennent un espace égal; en quoi consiste ce qu'on appelle égalité dans les figures.

x.

Cela est clair de soi-même, étant visible que deux Triangles de cette sorte ne different que de position.

PROPOSITION

FONDAMENTALE

de la mesure des Parallelogrammes
& des Triangles.

Tout Parallelogramme est égal au Rectangle de sa hauteur & de sa base.

xi.


Soit le Parallelogramme $ebdf$. Tirant ses perpendiculaires bm & cn sur la base df , prolongée autant qu'il est nécessaire: je dis que le Rectangle $ebmn$, qui est le Rectangle de la base & de la hauteur de $ebdf$, est égal à $ebdf$.



T 7

Car

Car bc étant égale tant à df qu'à mn , d est égale à m . Donc ôtant m commune de l'une & de l'autre : dm demeurera égale à fn . Et ainsi bd étant égale à cf , & bm à cn , les Triangles bdm & cnf sont égaux par le Lemme precedent. Et ainsi ajoutant à l'un & à l'autre le Trapèze commun $cbmf$: $cbdf$ sera égal $cbmn$. Ce qu'il falloit démontrer.



I. COROLLAIRE.

- XII. LES Parallelogrammes de même hauteur & de base égale sont égaux.

Car ils ont tous pour leur mesure commune le même Rectangle de cette hauteur & de cette base.

II. COROLLAIRE.

- XIII. LES Parallelogrammes de même hauteur sont comme leurs bases ; de base égale, sont comme leurs hauteurs.

Car chacun est égal au Rectangle de sa base & de sa hauteur. Or les Rectangles de même hauteur sont entr'eux comme leurs bases. XIV. 14. Il en faut donc dire de même des Parallelogrammes qui leur sont égaux.

On peut aussi prouver ce 1.^e Corollaire par le premier, de la même façon qu'on a déjà fait en démontrant le 1.^e Theorème de la premiere methode.

III. COROLLAIRE.

- XIV. LA raison de deux Parallelogrammes quelconques est toujours composée de la raison de la hauteur à la hauteur, & de la base à la base.

Car les Parallelogrammes sont toujours entr'eux comme les Rectangles de leur hauteur & de leur base.

IV. Co-

IV. COROLLAIRE GENERAL.

Tout ce qui a été dit de la raison des Rectangles par la comparaison de leurs côtes angulaires, est vray des Parallelogrammes, en comparant la hauteur à la hauteur, & la base à la base. Cela est clair par la raison du precedent Corollaire. xvi.


DES PARALLELOGRAMMES
EQUIANGLES.

THEOREME GENERAL.

Les Parallelogrammes équiangles sont entr'eux en raison composée de leurs côtes angulaires, de même que s'ils étoient rectangles. xvi.

Car tous les Parallelogrammes sont entr'eux en raison composée de celle de la base à la base, & de la hauteur à la hauteur:

Or quand ils sont équiangles, la raison des côtes obliques sur la base de chacun est la même que celle de la hauteur à la hauteur. Parce que les lignes également inclinées sont en même raison que leurs perpendiculaires qui mesurent cette hauteur. X. 12.



Exemple. Soient $b c$ & $m n$ deux Parallelogrammes équiangles, dont les hauteurs soient f & p .

Par les precedens Corollaires,

$$b c. m n. :: c. n. \cdot f. p.$$

$$\text{Or } f. p. :: b. m. \text{ X. 12.}$$

Donc $b c. m n. :: c. n. \cdot b. m.$ Ce qu'il falloit demontrer.

Co-

COROLLAIRE GENERAL.


XVII. Tout ce qui a été dit de la raison des Rectangles entr'eux par la comparaison de leurs côtez angulaires, est vray aussi des autres Parallelogrammes équiangles par la même comparaison de leurs côtez angulaires.

C'est à dire par exemple, que s'ils sont semblables, le grand côté du premier étant au grand côté du second, comme le petit côté du premier au petit côté du second: ils sont en raison doublée de leurs côtez homologues.

Si leurs côtez sont reciproques, (c'est à dire, si le grand côté du premier est au grand côté du second, comme le petit côté du second est au petit côté du premier,) ils sont égaux. Et ainsi de tout le reste.

COROLLAIRE PARTICULIER.

XVIII. Lorsque deux lignes paralleles chacune aux côtez angulaires d'un Parallelogramme se coupent en un même point de la diagonale, il se fait 4 Parallelogrammes, dont les deux qui ne sont point coupez par la diagonale, comme A & E, sont égaux.



Car ils sont équiangles, puisqu'il y a un angle de l'un qui est opposé au sommet à un angle de l'autre.

Et il est visible par XIII. 50. que le grand côté d'A est au grand côté d'E, comme le petit côté d'E est au petit côté d'A. Donc $A = E$.

Je sçai bien que cela se prouve ordinairement d'une autre maniere plus palpable; qui est que la diagonale partage par la moitié tant le Parallelogramme total, que chacun de ceux qui sont autour de cette diagonale. Donc la moitié du total dans laquelle est A étant égale à la moitié dans laquelle

quelle est E, & ôtant de chacune de ces deux moitiés deux Triangles égaux, les deux Parallelogrammes qui demeureront seront égaux.

DES PARALLELOGRAMMES SEMBLABLES.

I. THEORÉME.

Deux Parallelogrammes semblables, (c'est à dire qui étant équiangles ont leurs côtes proportionels,) sont en raison doublée de leurs côtes homologues, comme il vient d'être dit *sup.* 17. xix.

II. THEORÉME.

Les côtes homologues de deux Parallelogrammes semblables, étant en même raison que les côtes homologues de deux autres Parallelogrammes semblables entr'eux, ces 4 Parallelogrammes sont proportionels. xx.

Soient les deux premiers semblables A & E, & les deux derniers I & O. Si la raison d'entre les côtes d'A & E est x. y. & de même entre les côtes d'I & O: je dis, que

$$A. E. :: I. O.$$

$$\text{Car } \left. \begin{array}{l} A. E. \\ I. O. \end{array} \right\} :: x x. y y.$$

DES TRIANGLES.

LEMME.

Tout Triangle est la moitié d'un Paralleogramme de même base & de même hauteur. xxi.

Soit le Triangle *bcd*. Si de *b* on tire *bf* égale & parallele à la base *cd*, & que du point *f* on tire *fd*: je dis 1. que *bcdf* est un Parallelogramme. Car *cd* & *bf* sont paralleles



&c.

450 NOUVEAUX ELEMENS

& égales par la construction ; & par conséquent be & fd sont aussi parallèles & égales , par VI. 28.

Et par conséquent bd , qui est la diagonale de ce Parallelogramme , le divise en deux Triangles égaux bcd & bfd . Donc bcd est la moitié de ce Parallelogramme.

Or il est visible que ce Triangle & ce Parallelogramme sont de même hauteur , puisqu'ils sont enfermés entre les mêmes parallèles bf & cd , & qu'ils ont la même base , sçavoir cd .

Donc tout Triangle est la moitié d'un Parallelogramme de même base & de même hauteur.

THEOREME GENERAL.

- XXII. Tout Triangle est égal au Rectangle de la moitié de sa base , & de toute sa hauteur , ou de la moitié de sa hauteur & de toute sa base.

Car il est la moitié d'un Parallelogramme de sa base & de sa hauteur. Or ce Parallelogramme est égal au Rectangle de sa base & de sa hauteur.

Donc prenant la moitié de la base & toute la hauteur , ou la moitié de la hauteur & toute la base , on a un Rectangle qui vaut la moitié du Rectangle de toute la base & de toute la hauteur. Donc on a un Rectangle égal au Triangle.

I. COROLLAIRE.

- XXIII. Les Triangles de même hauteur & de base égale , sont égaux.

Car ils sont tous égaux au même Rectangle , qui est celui de la moitié de leur base & de toute leur hauteur.

II. COROLLAIRE.

- XXIV. Les Triangles de même hauteur sont comme leurs bases , & d'égale base comme leurs hauteurs.

Car ils sont tous égaux à des Rectangles , qui étant de

DE GEOMETRIE. Liv. XV. 451

de même hauteur sont comme leurs bases, & d'égalé base comme leurs hauteurs.

On peut aussi prouver ce second Corollaire par le premier, de la même façon qu'on a démontré le 4.^e Theorème de la première méthode.

III. COROLLAIRE.

La raison de deux Triangles quelconques est toujours composée de la raison de la hauteur à la hauteur, & de la base à la base. Car ces Triangles sont toujours entr'eux comme les Rectangles de la moitié de leur base & de toute leur hauteur, qui ont entr'eux cette raison composée. xxv.

IV. COROLLAIRE GENERAL.

Tout ce qui a été dit de la raison des Rectangles par la comparaison de leurs côtes, est vray des Triangles par la comparaison de la hauteur à la hauteur, & de la base à la base. xxvi.

DES TRIANGLES

EQUIANGLES

ou semblables.

I. THEOREME.

Tous les Triangles équiangles & par conséquent semblables, sont en raison doublée de la raison de leurs côtes homologues. xxvii.

Car par les Corollaires précédens, les Triangles sont entr'eux en raison composée de la raison de la base à la base, & de la hauteur à la hauteur.

Or quand ils sont équiangles, les côtes sur la base de part & d'autre sont chacun à chacun en même raison que les perpendiculaires du sommet à la base qui en mesurent la hauteur. X. 12.

Et par conséquent ils sont en raison composée de celle de la base à la base, & d'un côté à un côté.


Or

452 NOUVEAUX ELEMENTS.

Or étant équiangles, la base est à la base comme chacun des côtez à chacun des côtez.

Et par conséquent leur raison est composée de deux raisons égales ; ce qui s'appelle raison doublée.

Exemple. Soient deux Triangles semblables bcd & mno , dont bf & mp mesurent les hauteurs.



$$bcd. mno. :: cd. no. + bf. mp.$$

$$\text{Or } bc.mn.$$

$$b d. m o. \} :: b f. m p. (X. 18.)$$

$$c d. n o.$$

Donc tous les côtez ayant la même raison, chacun à chacun, & avec les perpendiculaires : la raison de ces Triangles bcd & mno ne peut être composée de la raison des bases cd & no , & de celle des hauteurs bf , mp , qu'ils ne soient en raison doublée de l'une de ces raisons, puisqu'elles sont égales ; & par conséquent aussi de la raison des autres côtez homologues, qui est la même.

II. THEOREME.

XXVIII. Si les côtez homologues de deux Triangles semblables sont en même raison que les côtez homologues de deux autres Triangles semblables entr'eux, ces 4 Triangles sont proportionels. C'est la même chose que ce qu'on a démontré des Parallelogrammes. *sup. 20.*

DES FIGURES SEMBLABLES.

I. THEOREME.

Deux figures semblables quelconques sont en raison doublée de leurs côtes homologues. XXIX.

Car par XIII. 26. elles peuvent être partagées chacune en autant de Triangles, tels que ceux d'une part étant semblables à ceux de l'autre, chacun à chacun, les côtes homologues de deux semblables seront en même raison que ceux de deux autres quelconques semblables.

Ainsi supposant qu'elles soient partagées chacune en 4 Triangles qui soient

A. E. I. O.

a. e. i. o.

Par le précédent Theorème A. a. :: E. e.

e. :: I. i. :: O. o.

Donc par

II. § 2. A →

E → I → O.

a → e → i → o. :: A. a.

C'est à dire que la plus grande des figures semblables qui comprend ces 4 Triangles A. E. I. O. sera à la plus petite qui comprend les Triangles a. e. i. o. comme l'un de ces Triangles est à son semblable.

Or ces Triangles semblables sont entr'eux en raison doublée de leurs bases, 27. Sup. & les bases de ces deux Triangles semblables sont côtes homologues de ces deux figures, (comme on a vu XIII. 26.)

Donc ces figures semblables sont en raison doublée de leurs côtes homologues.

COROL.



COROLLAIRE.

XXX. Les figures semblables sont entr'elles comme les Quarrez de leurs côtez homologues.

Car, par le Theorème precedent, les figures semblables sont entr'elles en raison doublée de leurs côtez homologues.

Or les Quarrez de ces côtez homologues sont aussi entr'eux en raison doublée de ces côtez qui sont leurs racines. Donc &c.

II. THEOREME.

XXXI. Si l'on construit sur l'hypotenuse & sur les deux côtez d'un angle droit des figures semblables quelconques : celle qui sera construite sur l'hypotenuse sera égale aux deux qui seront construites sur les côtez.

Soit b le grand côté de l'angle droit, le petit c , l'hypotenuse h .

La figure construite sur b soit nommée A ; sur c , E ; & sur h , I .

Par le Corollaire precedent, *alternando*,

$$A. bb. :: E. cc. :: I. hh.$$

$$\text{Donc } A + E, bb + cc. :: I. hh. \text{ (par II. 52.)}$$

Donc *alternando*,

$$A + E. I. :: bb + cc. hh.$$

$$\text{Or } bb + cc = hh. \text{ par XIV. 26.}$$

$$\text{Donc } A + E = I. \text{ Ce qu'il falloit demontrer.}$$



AVERTISSEMENT.

XXXII. On voit par là que cette proposition quoi que plus generale que celle des Quarrez, n'a dû être traitée qu'après celle des Quarrez; parce que le Quarré est

DE GEOMETRIE. LIV. XV. 455
*est la vraie & naturelle mesure de la dimension
des autres figures planes.*

DES FIGURES RÉGULIÈRES.

I. THEORÉME.

Tout Polygone est égal au Rectangle du rayon **XXXIII.**
droit, (qui est la perpendicu-
laire du centre à l'un des côtez)
& de la moitié de son perime-
tre : ou au Triangle qui a pour
hauteur ce rayon droit, & pour
base ce perimetre.



Car tout Polygone regulier comprend autant de
Triangles tout-égaux qu'il a de côrez, lesquels
ont tous pour mesure de leur hauteur la perpendi-
culaire du centre au côté qui leur sert de base.

Donc chaque Triangle est égal au Rectangle de ce
rayon droit qui est leur hauteur, & de la moitié de
la base. 22. *sup.*

Or toutes ces moitez des bases de ces Triangles
prises ensemble font la moitié du perimetre, puis-
que toutes les bases font tout le perimetre.

Donc le Rectangle de cette perpendiculaire &
de la moitié du perimetre est égal à tous ces Trian-
gles, & par consequent au Polygone.

Et c'est la même chose du Triangle qui a pour
hauteur cette perpendiculaire, & pour base tout
le perimetre, puisqu'il est égal à ce Rectangle.
22. *sup.* Outre qu'il est aisé de prouver qu'il est
égal à tous les Triangles que contient le Polygo-
ne, étant de même hauteur que chacun, & sa
base étant égale à toutes les bases des autres prises
ensemble.

II. THEO-

II. THEOREME.

XXXIV. PAR l'analogie du Cercle à un Polygone d'une infinité de côtes, le Cercle est égal au Rectangle du rayon & de la moitié de la circonférence : ou au Triangle qui a pour hauteur le rayon, & pour base toute la circonférence.

Nous l'avons prouvé par la premiere methode, qui est la Geometrie des indivisibles. On le peut aussi prouver par la voye d'Archimede, en montrant que le Rectangle du rayon & de la moitié de la circonférence est plus grand que tout Polygone inscrit au Cercle, & plus petit que tout circonscrit.

Il est plus grand que tout inscrit, parce que l'inscrit, par le Theoreme precedent, est égal au Rectangle de la perpendiculaire du centre au côté & de la moitié du perimetre. Or cette perpendiculaire est plus petite que le rayon du Cercle, puis qu'elle est terminée dans le Cercle, & le perimetre du Polygone inscrit est plus petit que la circonférence qui le comprend, par la maxime d'Archimede. V. 6.

Donc le Rectangle du rayon du Cercle & de la moitié de la circonférence est plus grand que tout Polygone inscrit.

Et il est plus petit que tout Polygone circonscrit, parce que le Polygone circonscrit est égal au Rectangle du rayon du Cercle, (qui est alors la même chose que la perpendiculaire au côté,) & de la moitié de son perimetre, lequel perimetre est plus grand que la circonférence du Cercle, puisqu'il la comprend, selon la même maxime d'Archimede. Donc &c.

III. THEOREME.

XXXV. LES figures regulieres de même espee sont entr'elles en raison doublée de celle de leurs rayons droits. Car

DE GEOMETRIE. Liv. XV. 457

Car elles sont égales chacune au Rectangle du rayon droit, & de la moitié du perimetre. Or le rayon droit est au rayon droit comme le perimetre au perimetre, par XII. 26. Donc ces Rectangles (auxquels ces figures regulieres sont égales) étant semblables, sont entr'eux en raison doublée de celle du rayon droit, qui est l'un de leurs côtez. (29. *sup.*)

I. COROLLAIRE.

Les Cercles sont entr'eux en raison doublée de celle de leurs rayons, ou de leurs diametres, ce qui est la même chose. XXXVI.

II. COROLLAIRE.

Les Cercles sont entr'eux comme les Quarrez de leurs diametres. Car les uns & les autres sont en raison doublée de celle de leurs diametres. XXXVII.

IV. THEOREME.

Les Triangles semblables inscrits en des Cercles sont entr'eux en raison doublée des diametres de ces Cercles: ou, ce qui est la même chose, comme les Cercles, ou comme les Quarrez des diametres. XXXVIII.

Car les cordes de divers Cercles qui soutiennent les angles inscrits égaux, sont entr'elles comme les diametres, par X. 25 & 26.

Donc les côtez de ces Triangles semblables qui soutiennent les angles égaux, (qui sont ceux qu'on appelle côtez homologues,) sont entr'eux comme les diametres.

Or ces Triangles étant semblables, sont en raison doublée de leurs côtez homologues. (27. *sup.*)

Donc ils sont aussi en raison doublée de ces diametres.

Donc ils sont aussi entr'eux comme les Cercles & comme les Quarrez des diametres.

V

V. THEO-

V. THEOREME.

XXXIX. LES figures semblables inscrites dans les Cercles sont entr'elles en raison doublée des diametres.

Car comme il a été prouvé S. 29. & XIII. 26. ces figures semblables se peuvent résoudre en Triangles semblables, chacun d'une figure à chacun de l'autre, qui seront tous inscrits dans le Cercle.

Donc tous les Triangles d'une figure sont à tous ceux de l'autre, (& par conséquent une figure est à l'autre,) comme un des Triangles d'une figure à un semblable de l'autre. Or par le Theorème précédent ces deux Triangles semblables sont entr'eux en raison doublée des diametres. Donc les figures semblables inscrites dans les Cercles sont entr'elles en raison doublée des diametres. Donc aussi comme les Cercles. 36. *sup.* Donc aussi comme les Quarrez des diametres. 37. *sup.*

I. PROBLEME.

XL. DECRIRE sur un côté donné le Parallelogramme égal & équiangle à un Parallelogramme donné.


Soit le Parallelogramme donné $b c d f$. Soit continuée $c d$ jusques à g , en sorte que $d g$ soit égale au côté donné.

Soit aussi continuée $b f$ jusques à ce que $f q$ soit égale à $d g$. Soit menée de q par d une indéfinie.

Soit prolongée $b c$, jusqu'à ce qu'elle rencontre en r cette indéfinie.

Soit prolongée $q g$ jusques en k , en sorte que $q k$ soit égale à $b r$.

Joignant



DE GEOMETRIE. LIV. XV. 459

Joignant les points $r k$, & prolongeant fd jusques en b , où elle rencontre k :

Le Parallelogramme $dbkg$ sera égal & équianglé au donné $bcdf$. (18. *Sup.*)

II. PROBLEME.

FAIRE une figure égale à une donnée, qui ait moins d'un côté que la donnée. C'est à dire que si la donnée en a 6, on en cherche une qui n'en ait que 5, & si elle en a 5, on en cherche une qui n'en ait que 4 : de sorte que par là on pourra venir jusqu'au Triangle. XLI.

Soit proposé de réduire l'Hexagone $bcdfgh$ en un Pentagone qui luy soit égal.

Ayant prolongé fg , je tire la ligne bg .

Puis de h je tire sur fg prolongée l parallèle à bg .

Et de b je tire bl . Je dis que le Pentagone $bcdf l$ est égal à l'Hexagone donné.

Car les Triangles $h l b$ & $h l g$ sont égaux, parce qu'ils sont sur la même base & entre mêmes parallèles. (6. *sup.*)


Donc ôtant $h l o$ commun à l'un & à l'autre : $h o b$ demeurera égal à $l g o$, & tout le reste est commun à l'Hexagone & au Pentagone.

On réduira de même le Pentagone $bcdf l$ à un Trapèze.

Ayant mené la ligne bf : mener de l sur df prolongée, lm parallèle à bf .

Puis tirer bm .


On prouvera de la même manière que l'on vient de faire



faire; que le Tra-
pèze $b c d m$ sera
égal au Pentagone
 $b c d f l$.

Que si de b on
tire une ligne à d ,

Et de f sur $f d$
prolongée de ce
coté là, $c n$ paral-
le à $b d$:



En tirant $b n$, le Triangle $b m n$ sera égal tant au
Trapèze $b c d m$, qu'au Pentagone $b c d f l$. Et ainsi
l'Hexagone aura été réduit en un Pentagone, & le
Pentagone en un Trapèze, & le Trapèze en un Trian-
gle:

AVERTISSEMENT ET CONCLUSION.


XLII.

Je laisse d'autres Problemes qui sont très faciles à
résoudre par les principes qui ont été établis. Outre que
n'ayant entrepris ces Elements que pour donner un essai
de la vraie methode qui doit traiter les choses simples
avant les composées, & les générales avant les par-
ticulières: je pense avoir satisfait à ce dessein, &
avoir montré que les Geometres ont eu tort d'avoir ne-
gligé cet ordre de la Nature, en s'imaginant qu'ils n'a-
voient autre chose à observer, sinon que les proposi-
tions précédentes servoient à la preuve des suivantes:
au lieu qu'il est clair, ce me semble, par cet essai, que
les elements de Geometrie étant réduits selon l'ordre
naturel, peuvent être aussi solidement démontrés,
& sans comparaison plus aisez à concevoir & à
retenir.

F I N.

SOLU-

SOLUTION
D'UN DES PLUS CELEBRES
ET DES PLUS DIFFICILES
PROBLEMES
D'ARITHMETIQUE,
APPELLE' COMMUNE'MENT
LES QUARREZ
MAGIQUES.





SOLUTION
D'UN DES PLUS CELEBRES
ET DES PLUS DIFFICILES
PROBLEMES
D'ARITHMETIQUE,
APPELLE' COMMUNE'MENT
LES QUARREZ
MAGIQUES.

§. 1. *Ce que c'est que ce Probleme.*



YANT un Quarré de cellules pair ou impair :

Et l'ayant rempli de chiffres ou selon l'ordre naturel des nombres 1. 2. 3. 4. &c.

Ou de quelqu'autre progression arithmetique que ce soit , comme 2. 5. 8. 11. 14. &c.

Disposer tous ces chiffres dans un autre Quarré de cellules semblable à celui-là , en sorte que tous les chiffres de chaque bande soit de gauche à droit , soit de haut en bas , soit même les deux diagonales , fassent toujours la même somme.

V 4

Soient

Soient pris pour exemples les Quarrez d'11 pour les impairs, & de 12 pour les pairs, comme on les peut voir dans les figures qui sont à la fin de ce Traité.

§. 2. Considerations sur les Quarrez naturels.

- II. J'APPELLE *Quarrez naturels* ceux où les chiffres sont disposés en progression arithmétique, en commençant par les plus petits.

SUR LES QUARREZ IMPAIRS.

- III. DANS le milieu du Quarré impair il y a une cellule qui en est le centre. Le chiffre qui est dans cette cellule soit nommé *centre* & marqué par c.

- IV. DE tous les autres chiffres la moitié sont plus petits & les autres plus grands que le centre. Les uns soient appellez simplement *petits* & les autres *grands*.

- V. LES cellules autour du centre soient appellees

1.^{re} enceinte.

Autour de la premiere enceinte, 2.^{de} enceinte.

Autour de la seconde enceinte, 3.^{de} enceinte.

Et ainsi de suite.

- VI. LES enceintes 1.^{re} 3.^{de} 5.^{de} 7.^{de} 9.^{de} &c. soient appellees *enceintes impaires*.

Les 2.^{de} 4.^{de} 6.^{de} 8.^{de} 10.^{de} &c. *enceintes paires*.

- VII. IL est important de considerer dans chaque enceinte où sont les petits chiffres, & où sont les grands.

Les petits sont premierement dans toute la bande d'enhaut, qui est de 3 dans la 1.^{re} enceinte, de 5 dans la 2.^{de}, de 7 dans la 3.^{de} &c.

Secondement dans la bande à gauche les plus hauts

DES QUARREZ MAGIQUES. 465

hauts jusqu'à celui qui est vis-à-vis le centre *inclusivè*.

Troisièmement dans la bande à droit les plus hauts jusqu'à celui qui est vis-à-vis le centre *exclusivè*.

SUR LES QUARREZ PAIRS.

IL n'y a point de cellule qui soit au centre. VIII.
Mais on doit prendre pour centre la moitié de la somme que font le premier & le dernier chiffre.

Et cette somme entiere s'appellera 2 c.

LA moitié des bandes, sçavoir celles qui sont les plus hautes, contiennent les petits chiffres, & les plus basses les grands. IX.

LES quatre cellules du milieu font la 1.^{re} enceinte. X.

Les cellules autour de ces quatre, la 2.^{re} enceinte.

Celles autour de la seconde, la 3.^{re} enceinte.

Et ainsi de suite.

LES enceintes 1.^{re} 3.^{re} 5.^{re} 7.^{re} 9.^{re} &c. soient aussi XI.
appelées *les enceintes impaires*.

Et les 2.^{re} 4.^{re} 6.^{re} &c. *les paires*.

LES petits chiffres sont, XII.

1. Dans la bande d'enhaut de chaque enceinte.

2. Au côté gauche depuis la bande d'enhaut jusqu'à la bande où commencent les grands chiffres.

3. Et de même au côté droit.

§. 3. PREPARATION.

LE plus grand mystere de la solution de ce Probleme consiste à marquer par lettres quelques-uns des petits chiffres de chaque bande. XIII.

QUARREZ IMPAIRS.

DANS toutes les enceintes generalement mar- XIV.
quer

V 5

466 E X P L I C A T I O N

quer le coin à gauche de la bande d'enhaut par e.

Le coin à droit de la même bande par o.

Le milieu de cette bande par m.

La cellule à gauche qui est vis-à-vis le centre par a.

xv. M A R Q U E R de plus dans les enceintes paires

Deux cellules dans la bande d'enhaut également distantes, l'une d'e, l'autre d'o, par les mêmes lettres accentuées :

L'une par è.

L'autre par ô.

Et la cellule à gauche au dessous d'e par u.

Et au côté droit celle qui est au dessus de la cellule qui est vis-à-vis le centre par c.

DANS LES QUARREZ PAIRS.

xvi. N E rien marquer dans les première & seconde enceintes.

xvii. D A N S toutes les autres généralement marquer

Le coin à gauche d'enhaut par e.

A droit par o.

Le plus bas des petits nombres à droit par u.

Le plus bas des petits nombres à gauche par c.

xviii. M A R Q U E R de plus dans les enceintes impaires, à commencer par la 3.^e (qui est celle qui a 6 cellules dans la bande d'enhaut,)

4 cellules dans la bande d'enhaut, deux par { è.

{ ô.

& deux par { è.

{ ô.

selon ce qui a été dit *sup.* 15.

A gauche marquer la cellule au dessous d'e par u.

Et à droit celle au dessus d'u par c.

§. 4. MAXIMES

POUR LA DEMONSTRATION
DE L'OPERATION.

DEUX chiffres, l'un *petit*, l'autre *grand*, également distans du centre, & qui se joignent par une ligne passant par le centre, font une somme égale à deux fois le centre. XIX.

QUAND un *petit* chiffre est marqué par une lettre, son grand soit nommé (quand on le voudra exprimer) par la majuscule de la même lettre, quoi qu'elle ne soit pas marquée. XX.

Ainsi e. E. font deux fois le centre.

Et de même a. A. ou c. B. ou o. O.

SECONDE MAXIME.

QUATRE chiffres dans la même bande, dont le premier est autant distant du 2.^e que le 3.^e du 4.^e sont en proportion arithmétique. XXI.

Et par conséquent la somme des extremes est égale à la somme de ceux du milieu.

EXEMPLES.

e. d. :: d. o. Donc e. o. = d. d. XXII.

D'où il s'ensuit que partout où sont ensemble e. d. ou bien d. o. ou leurs majuscules E. O. on peut supposer, lors qu'il s'agit de trouver des égalitez avec d'autres chiffres, que c'est comme si c'étoit e. o. E. O; parce que si l'égalité s'y trouve en supposant que c'est e. o. elle ne sera pas troublée en mettant d. d. en la place de e. o; puisque les deux d'une part valent autant que les deux de l'autre.

Semblablement pour les Quarrez impairs en particulier, XXIII.

e. m. :: m. o. Donc e. o. = m. m.

Y 6

DANS

DANS LES QUARREZ PAIRS.

- XXIV. $e. a. :: 6. A.$ Donc $e. A. = a. 6.$
 Pour trouver A voyez *sup.* 20.

TROISIÈME MAXIME.

- XXV. LORSQUE 4 cellules font un Parallelogramme rectangle ou non rectangle, leurs 4 chiffres font en proportion arithmetique. Et par consequent la somme des extremes est égale à la somme de ceux du milieu.

EXEMPLES.

DANS LES QUARREZ IMPAIRS.

- XXVI. $e. m. :: a. c.$ Donc $e. c. = m. a.$
 XXVII. $m. o. :: a. c.$ Donc $m. c. = o. a.$
 XXVIII. $a. m. :: c. 6.$ Donc $a. 6. = m. c.$

DANS LES PAIRS.

- XXIX. $e. o. :: 6. a.$ Donc $e. a. = o. 6.$
 XXX. $a. 6. :: o. y.$ Donc $a. y. = 6. o.$

§. 5. *Methode pour disposer magiquement le Quarre naturel.*

- XXXI. CETTE methode consiste en fort peu de regles : les unes generales, les autres particulieres ; selon lesquelles il faut transporter les chiffres du Quarre naturel dans le magique.

PREMIERE REGLE GENERALE.

IL faut disposer les chiffres par enceintes, ceux **xxxii.**
d'une enceinte en l'enceinte semblable ; & tout le
soin qu'on doit avoir d'abord, est de sçavoir où l'on
doit mettre les petits nombres de l'enceinte, parce
que la situation des *petits* donne celle des *grands*, se-
lon les deux regles suivantes.

SECONDE REGLE GENERALE.

QUAND on a placé un *petit* chiffre dans un coin, **xxxiii.**
il faut placer son *grand* dans le coin diagonalement
opposé.

Ainsi *a* étant placé dans le coin gauche de la bande
d'en haut, il faudra mettre *A* dans le coin droit de la
bande d'embas.

TROISIÈME REGLE GENERALE.

HORS les coins, il faut placer les grands vis à **xxxiv.**
vis des petits de la bande opposée.

C'est pourquoy il faut observer de ne mettre ja-
mais deux petits en des bandes opposées vis à vis l'un
de l'autre.

COROLLAIRE DE CES REGLES.

LES chiffres étant disposez selon ces regles, **xxxv.**

Il s'ensuit, 1. Que les chiffres de deux bandes op-
posées pris ensemble, valent autant de fois *c* qu'il y
a de chiffres dans les deux bandes. Car un petit & un
grand valent deux fois *c*. Or il y a autant de *petits*
que de *grands*. Donc, &c.

IL s'ensuit, 2. Que lors qu'on a prouvé que les **xxxvi.**
chiffres d'une bande apres cette disposition valent
autant de fois le centre qu'il y a de chiffres, cette
bande est égale à son opposée.

IL s'ensuit, 3. Que quand il y a autant de petits **xxxvii.**
chiffres

chiffres dans une bande que dans l'opposée, & que la somme des uns est égale à la somme des autres, c'est une marque assurée que la bande est égale à la bande.

La preuve en est facile sans que je m'arrête à l'expliquer.

QUATRIÈME REGLE GENERALE.

XXXVIII. Il ne faut se mettre en peine d'abord que de placer les petits chiffres qui sont marquez par des lettres ; car cela fait, le reste se trouve sans peine par cette raison :

Dans la bande d'en haut, dans quelques Quarrez & quelques encintes que ce soit, outre les cellules marquées par des lettres,

Ou il ne reste rien :

Ou il reste toujours des cellules non marquées en nombre parement pair ; c'est à dire 4. 8. 12. 16. &c.

Et de plus, les chiffres de ces cellules sont toujours 4 à 4 en proportion arithmetique.

Donc prenant les extremes & les mettant dans une bande, & ceux du milieu dans l'opposée, ils ne troubleront point l'égalité qui y étoit déjà par les chiffres marquez de lettres.

XXXIX. Il en est de même des deux côtez droit & gauche. Car les petits chiffres qui restent, (s'il en reste outre les marquez,) sont toujours en nombre parement pair, 4. 8. 12. 16. &c. & de 4 en 4 en proportion arithmetique.

Donc comme ci-dessus.

Il n'y a donc plus à se mettre en peine que de disposer les lettres. Ce qui se fait par les regles particulieres.

§. 6. *Regles particulieres pour les Quarrez impairs.*

Il y a deux regles pour ces Quarrez, l'une pour les enceintes impaires, & l'autre pour les paires. XL.

Pour les enceintes impaires.

Au coin gauche de la bande d'enhaut mettre α .

Au coin droit de la même bande, m .

A la bande d'embas en quelque cellule que ce soit, hors les coins, e .

A la bande du côté d' α , o .



DEMONSTRATION.

Il est requis premierement à demontrer que dans la bande d'enhaut α . E. m . valent trois fois le centre. D'où il s'ensuivra qu'elle sera égale à la bande d'embas, par 36. *sup.*

Or (par 26.) $e. c. \equiv \alpha. m$.

Donc $e. c. E. \equiv \alpha. E. m$.

Or $e. c. E. \equiv 3 c.$ (par 20.)


Donc $\alpha. E. m. \equiv 3 c.$ Ce qu'il falloit demontrer.

REQUIS secondement à demontrer que $\alpha. o$. M. valent 3 c. D'où il s'ensuivra que cette bande sera égale à l'opposée, par 36.

Or (par 27.) $\alpha. o. \equiv m. e$.

Donc $m. c. M. \equiv \alpha. o. M$.

Or



XLI.

XLII.

Or $m. c. M. \equiv 3 c.$ (par 20.)Donc $a. o. M. \equiv 3 c.$ *Pour les enceintes paires.*

XLIII. Il suffira de les figurer tout d'un coup.



DEMONSTRATION.

XLIV. REQUIS premièrement à démontrer que la bande d'embas $M. \delta. \alpha. \delta. E. \equiv 5 c.$ C'est à dire qu'elle vaut ensemble cinq fois le centre.

Ce qui se prouve ainsi :

Par 27. $a. o. \equiv$ $m. c.$ Donc $e. \alpha. o. \equiv e. m. c.$ Donc $e. m. c. M. E. \equiv \delta. \alpha. \delta. M. E.$ (par 22.)Or $e. m. c. M. E. \equiv 5 c.$ (par 20.)Donc $M. \delta. \alpha. \delta. E. \equiv 5 c.$ Ce qu'il falloit démontrer.

XLV. REQUIS secondement à démontrer que dans la bande droite $m. O. \delta. \omega. E. \equiv 5 c.$

Ce qui se prouve ainsi :

Par 23. $e. \delta. \equiv m. m.$ 

Donc

DES QUARREZ MAGIQUES. 473

Donc $e. o. c. \equiv m. m. c.$
 Or $m. m. c. \equiv m. u. c.$
 Parce que $m. c. \equiv u. c. \text{ (par 28.)}$
 Donc $e. o. c. \equiv m. u. c.$
 Donc $a. o. c. E. O. \equiv m. u. c. E. O.$
 Or $e. o. c. E. O. \equiv 5 c. \text{ (par 10.)}$
 Donc $m. O. u. c. E. \equiv 5 c.$ Ce qu'il falloit
 démontrer.

§. 7. Pour les Quarrez pairs.

ON laisse à part les deux premières enceintes, XLVI,
 qui ont leur regle particuliere.

Pour les autres enceintes impaires.


LA disposition s'en figure ainsi :

XLVII.



DEMONSTRATION.

REQUIS 1. à démon-
 trer que les six chiffres de
 la bande d'en haut dont
 quatre sont *petits*, &
 deux *grands* qui viennent
 de α & δ qu'on a mis en
 bas, valent six fois le cen-
 tre. Ce qui se prouve
 ainsi :



XLVIII.

474 EXPLICATION

a. A. o. O. e. E. = 6 c. (par 20.)

Or ces six lettres sont égales aux six, *u. E. a.*

o. O. C.

Car ôtant les mêmes qui se trouvent de part & d'autre, sçavoir *a. o. O. E.* il ne restera d'un côté que *A. e:* & de l'autre que *u. C.*

Or (par 24.) *A. e. = u. C.*

Donc les six lettres *u. E. a. o. O. C. = 6 c.*

XLIX. REQUIS 2. à démontrer que *u. e. γ. = C. δ. δ.*

Car si cela est, les grandes seront aussi égales aux grandes, & le tout au tout, (par 37.)

Supposant donc que *δ. δ.* soient *e. o.* (*sup. 22.*) & ôtant *e* & *e* de part & d'autre, reste d'une part *u. γ.* & de l'autre *C. o.* qui font des sommes égales, (par 30.)

Donc *u. e. γ. = C. δ. δ.*

Donc la bande est égale à la bande, (par 30.)

Pour les enceintes paires.

X. LA disposition en est très facile, & se figure ainsi:



DEMONSTRATION.

LI. Elle est si facile par 22. 29. & 37. que je ne m'amuse pas à l'expliquer.

Cette enceinte se peut encore faire en transposant les coins &c.

§. 8.

§. 8. *Règle particulière pour la première & seconde enceinte des Quarrez pairs.*

Ces deux enceintes ne font autre chose que le Carré de 4 qui fait 16, dans lequel il y a deux sortes de bandes. Quatre qui font la seconde enceinte, & qu'on peut appeller les bandes

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

L I I.

extérieures. Et quatre autres qui coupent le Carré, & qu'on peut appeller *transversales*: savoir la 2.^e & la 3.^e de haut en bas.

Et la 2.^e & la 3.^e de gauche à droit.

Ce qui est cause que ces deux enceintes ne se peuvent pas disposer par les règles de autres; c'est que les 4 chiffres du milieu faisant en divers sens quatre bandes de deux chacune en ligne droite, & deux en diagonale: les bandes droites ne sçauroient faire des sommes égales, mais seulement les diagonales. L I I I.

Or ces 16 chiffres se pouvant disposer en tant de manières que cela est presque incroyable, savoir en plus de 20 millions de millions: L I V.

20:922:789:888:000.

Il n'y en a proprement que 16 qui soient magiques, c'est à dire où toutes les bandes fassent des sommes égales, (car je ne compte pas pour différentes dispositions celles qui ne viennent que de la différente situation du même Carré.)

Et voici comme on les trouve.

L V.

II

Il faut prendre toujours les chiffres 4 à 4 en cet ordre :

1. Les quatre du dedans ou intérieurs.
2. Les quatre coins extérieurs.
3. Les deux du milieu de la bande d'en haut, avec les deux du milieu de celle d'embas.
4. Les deux du milieu de la bande à gauche, avec les deux du milieu de celle à droit.

Or chacun de ces chiffres pris ainsi 4 à 4 (& qu'on nommera dans la suite par 1. 2. 3. 4.) peuvent

Ou être laissez en leur même place; ce qui se marquera par *o.*

Ou être transportez en croix S. André; ce qui se marquera par *c.*

Ou directement de gauche à droit; ce qui se marquera par *g.*

Ou directement de haut en bas; ce qui se marquera par *h.*

LVI.

SUIVANT ces remarques, & se souvenant de ce que signifient les 4 nombres (1. 2. 3. 4.) & les 4 lettres (*o. c. g. h.*) les deux Tables suivantes feront trouver sans peine les 16 dispositions magiques du Quarré de 4 : ou, ce qui est la même chose, des deux premières enceintes de tous les Quarréz pairs.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

1.	<i>o</i>	<i>o</i>	<i>o</i>	<i>o</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>
2.	<i>o</i>	<i>c</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>o</i>	<i>c</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
3.	<i>c</i>	<i>g</i>	<i>c</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>o</i>	<i>h</i>	<i>o</i>
4.	<i>c</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>c</i>	<i>g</i>	<i>o</i>	<i>o</i>	<i>g</i>

IX.

DES QUARREZ MAGIQUES. 477

IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI.

1.	<u>g</u>	<u>g</u>	<u>g</u>	<u>g</u>	<u>h</u>	<u>h</u>	<u>h</u>	<u>h</u>
2.	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>g</u>	<u>h</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>g</u>	<u>h</u>
3.	<u>h</u>	<u>o</u>	<u>h</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>g</u>	<u>c</u>	<u>g</u>
4.	<u>c</u>	<u>h</u>	<u>h</u>	<u>c</u>	<u>g</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>g</u>

De ces 16 dispositions magiques du Quarre de LVI 11, il y en a deux, ſçavoir la 1.^{re} & la 6.^{re}, où on ne change que 8 chiffres. •

Deux, ſçavoir la 11.^{re} & la 16.^{re} où on les change tous 16.

Et douze où on en change 12.

Voici un exemple de la 6.^{re} disposition, & un LVI 11, autre, de la 16.^{re} On laiſſe à trouver les autres.

<u>16</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>16</u>
<u>5</u>	<u>11</u>	<u>10</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>5</u>
<u>9</u>	<u>7</u>	<u>6</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>9</u>
<u>4</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>15</u>	<u>14</u>	<u>4</u>

DEMONSTRATION.

CHAQUE bande tant extérieure que tranſverſale du Quarre de 4, (ou du Quarre compoſé des LIX

478 E X P L I C A T I O N

des 2 premières enceintes de tous les Quarrez pairs,) est de 4 chiffres en proportion arithmétique.

Et par conséquent la somme des extremes est égale à la somme des moyens.

Soit donc, par exemple, la somme des extremes de la bande d'enhaut appelée b : la somme des moyens qui lui est égale pourra être aussi appelée b , & ainsi toute la bande sera $b+b$.

Et par la même raison la bande d'embas pourra être $f+f$.

Cela étant on peut faire ces bandes égales par deux voies.

La 1.^{re} en transposant les extremes de l'une à l'autre sans changer les moyens. Car alors l'une deviendra $f+b$;

Et l'autre $b+f$; & ainsi seront égales.

La 2.^{re} en transposant les moyens sans changer les extremes. Car alors l'une deviendra $b+f$; & l'autre $f+b$; & ainsi seront encore égales.

Il ne faut qu'appliquer cecy à chacune de ces 16 dispositions, & l'on verra que les transpositions que l'on y fait les doivent rendre magiques.

§. 9. Divers moyens de varier les Quarrez Magiques.

De ces moyens j'ometts ceux qui sont trop faciles à trouver, & je n'en marqueray que deux qui sont plus importants, & qu'on a pratiqués dans les deux exemples qu'on a donnez des Quarrez magiques.

PREMIER MOYEN.

LX. Nous avons supposé qu'on transporterait les chiffres

DES QUARREZ MAGIQUES. 479

chiffres de la premiere enceinte du Quarré naturel dans la premiere enceinte du Quarré magique ; & ceux de la 2.^e dans la 2.^e ; & de la 3.^e dans la 3.^e &c. Mais cela n'est pas nécessaire. Car pour les chiffres marquez de lettres , il suffit de ne les transporter que d'une enceinte impaire à une autre quelconque qui soit impaire , comme de la 5.^e à la 1.^{re} ; & d'une enceinte paire à une paire , comme de la 6.^e à la 4.^e

SECOND MOYEN.

Et pour tous les autres chiffres non marquez de lettres , on les peut transporter de quelque enceinte que ce soit à quelque autre enceinte que l'on voudra ; pourvu qu'on en prenne quatre ensemble qui soient en proportion arithmetique , & qu'on ait soin de mettre les extremes dans une bande , & les moyens dans la bande opposée.

LXI.

CONCLUSION.

Je pense pouvoir conclure de tout cecy , qu'il n'est pas possible de trouver une methode plus facile , plus abrégée & plus parfaite pour faire les Quarrez magiques , qui est un des plus beaux Problemes d'Arithmetique.

LXII.

Ce qu'elle a de singulier , c'est 1. qu'on n'écrit les chiffres que deux fois.

2. Qu'on ne tâtonne point , mais qu'on est toujours assuré de ce que l'on fait.

3. Que les plus grands Quarrez ne sont pas plus difficiles à faire que les plus petits.

4. Qu'on les varie autant que l'on veut.

5. Qu'on ne fait rien dont on n'ait demonstration.

6. A quoy on peut ajoûter , que cette methode

de

480 **EXPLICATION**

de est si generale , que sans y rien changer on pourroit refoudre sans aucune peine par la même voie cét autre Problème qui paroist encore plus merveilleux :

Ayant mis dans un Quarré naturel tous les nombres que l'on voudra en progression geometrique, comme 1. 2. 4. 8. 16. &c. les disposer de telle sorte dans un Quarré semblable, que tous les nombres de chaque bande multipliez les uns par les autres fassent une somme égale à celle que font les nombres de toute autre bande multipliez aussi les uns par les autres.

En voicy un exemple dans le Quarré de 3.

1	2	4	8	256	2
8	16	32	4	16	64
64	128	256	128	1	32

FIN de l'Explication des Quarréz Magiques.



114

114

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

114

QUARRÉ NATUREL DE ^{N^o 1. Pag. 480.} XI.

1 _e	2	3	4	5	6 _m	7	8	9	10	11 _o
12 _e	13 _e	14 _e	15 _e	16 _e	17 _m	18	19	20 _o	21 _o	22
23 _o	24 _o	25 _e	26	27	28 _m	29	30	31 _o	32	33
34	35	36	37 _e	38 _e	39 _m	40 _o	41 _o	42	43	44
45	46	47	48 _o	49 _e	50 _m	51 _o	52 _o	53 _o	54 _o	55 _o
56 _o	57 _o	58 _o	59 _o	60 _o	61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121

QUARRÉ MAGIQUE DE ^{N.º 2. Pag. 480.} XI.

58	26	30	95	93	97	47	42	86	69	28
35	37	12	45	84	63	82	99	88	39	87
43	100	60	119	118	73	5	2	50	22	79
90	67	7	13	102	65	108	17	115	55	32
76	74	10	98	56	121	6	24	112	48	46
31	41	51	21	11	61	111	101	71	81	91
107	70	114	68	116	1	66	54	8	52	15
103	33	113	105	20	57	14	109	9	89	19
18	44	72	3	4	49	117	120	62	78	104
16	83	110	77	38	59	40	23	34	85	106
94	96	92	27	29	25	75	80	36	53	64



THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

LIST OF VOLUMES	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

NEW YORK

1900

N.^o 3. Pag. 480.
 QUARRÉ NATUREL DE XII.

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>
<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>
<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>	<u>30</u>	<u>31</u>	<u>32</u>	<u>33</u>	<u>34</u>	<u>35</u>	<u>36</u>
<u>37</u>	<u>38</u>	<u>39</u>	<u>40</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	<u>46</u>	<u>47</u>	<u>48</u>
<u>49</u>	<u>50</u>	<u>51</u>	<u>52</u>	<u>53</u>	<u>54</u>	<u>55</u>	<u>56</u>	<u>57</u>	<u>58</u>	<u>59</u>	<u>60</u>
<u>61</u>	<u>62</u>	<u>63</u>	<u>64</u>	<u>65</u>	<u>66</u>	<u>67</u>	<u>68</u>	<u>69</u>	<u>70</u>	<u>71</u>	<u>72</u>
<u>73</u>	<u>74</u>	<u>75</u>	<u>76</u>	<u>77</u>	<u>78</u>	<u>79</u>	<u>80</u>	<u>81</u>	<u>82</u>	<u>83</u>	<u>84</u>
<u>85</u>	<u>86</u>	<u>87</u>	<u>88</u>	<u>89</u>	<u>90</u>	<u>91</u>	<u>92</u>	<u>93</u>	<u>94</u>	<u>95</u>	<u>96</u>
<u>97</u>	<u>98</u>	<u>99</u>	<u>100</u>	<u>101</u>	<u>102</u>	<u>103</u>	<u>104</u>	<u>105</u>	<u>106</u>	<u>107</u>	<u>108</u>
<u>109</u>	<u>110</u>	<u>111</u>	<u>112</u>	<u>113</u>	<u>114</u>	<u>115</u>	<u>116</u>	<u>117</u>	<u>118</u>	<u>119</u>	<u>120</u>
<u>121</u>	<u>122</u>	<u>123</u>	<u>124</u>	<u>125</u>	<u>126</u>	<u>127</u>	<u>128</u>	<u>129</u>	<u>130</u>	<u>131</u>	<u>132</u>
<u>133</u>	<u>134</u>	<u>135</u>	<u>136</u>	<u>137</u>	<u>138</u>	<u>139</u>	<u>140</u>	<u>141</u>	<u>142</u>	<u>143</u>	<u>144</u>

N.º 4. Pag. 480.

QUARRÉ MAGIQUE DE XII.

<u>118</u>	<u>28</u>	<u>116</u>	<u>39</u>	<u>94</u>	<u>30</u>	<u>31</u>	<u>99</u>	<u>58</u>	<u>112</u>	<u>32</u>	<u>111</u>
<u>17</u>	<u>52</u>	<u>24</u>	<u>109</u>	<u>104</u>	<u>69</u>	<u>45</u>	<u>101</u>	<u>97</u>	<u>60</u>	<u>64</u>	<u>128</u>
<u>127</u>	<u>57</u>	<u>92</u>	<u>8</u>	<u>11</u>	<u>54</u>	<u>55</u>	<u>136</u>	<u>135</u>	<u>89</u>	<u>88</u>	<u>18</u>
<u>126</u>	<u>40</u>	<u>2</u>	<u>26</u>	<u>130</u>	<u>23</u>	<u>71</u>	<u>123</u>	<u>62</u>	<u>143</u>	<u>105</u>	<u>19</u>
<u>20</u>	<u>13</u>	<u>5</u>	<u>59</u>	<u>144</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>133</u>	<u>86</u>	<u>140</u>	<u>132</u>	<u>125</u>
<u>63</u>	<u>120</u>	<u>65</u>	<u>14</u>	<u>61</u>	<u>79</u>	<u>78</u>	<u>72</u>	<u>131</u>	<u>80</u>	<u>25</u>	<u>82</u>
<u>75</u>	<u>108</u>	<u>77</u>	<u>129</u>	<u>73</u>	<u>67</u>	<u>66</u>	<u>84</u>	<u>16</u>	<u>68</u>	<u>37</u>	<u>70</u>
<u>38</u>	<u>49</u>	<u>142</u>	<u>124</u>	<u>12</u>	<u>138</u>	<u>139</u>	<u>1</u>	<u>21</u>	<u>3</u>	<u>96</u>	<u>107</u>
<u>95</u>	<u>103</u>	<u>141</u>	<u>83</u>	<u>15</u>	<u>122</u>	<u>74</u>	<u>22</u>	<u>119</u>	<u>4</u>	<u>42</u>	<u>50</u>
<u>47</u>	<u>102</u>	<u>56</u>	<u>137</u>	<u>134</u>	<u>91</u>	<u>90</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>53</u>	<u>43</u>	<u>98</u>
<u>110</u>	<u>81</u>	<u>121</u>	<u>36</u>	<u>41</u>	<u>76</u>	<u>100</u>	<u>44</u>	<u>48</u>	<u>85</u>	<u>93</u>	<u>35</u>
<u>34</u>	<u>117</u>	<u>29</u>	<u>106</u>	<u>51</u>	<u>115</u>	<u>114</u>	<u>46</u>	<u>87</u>	<u>32</u>	<u>112</u>	<u>27</u>

XXXIV

B

1

